



Les oiseaux rares en Normandie en 2012

Rapport du Comité d'Homologation Régional

Sébastien Provost & le CHR Normandie

Réuni le 7 décembre 2013 à Saint-Côme-du-Mont (50), le **CHR Normandie** a terminé l'examen de la 19ème circulaire, couvrant pour l'essentiel l'année 2012. Le nombre de fiches reçues est de 92 (106 en 2011). Le taux de données acceptées reste à un niveau élevé (94,6%), cela témoigne de la qualité des fiches descriptives reçues, souvent accompagnées de photos. La liste des espèces CHR mise à jour et la fiche vierge à remplir sont téléchargeables sur ce lien <http://www.gonm.org/telechargements/chr-oiseaux-rares>. Ou sur demande au secrétariat du CHR : chr.normandie@gmail.com

La dernière réunion s'est déroulée en présence des membres votants, excepté Matthieu Lorthiois (excusé) : Bruno Chevalier, Jocelyn Desmares, Jean-Pierre Marie, Benoît Lecaplain, Sébastien Provost et Gunter de Smet. Bruno et Sébastien se sont chargés de la circulation, de la communication, de la gestion et de la publication des données. Après de nombreuses années d'investissement au secrétariat du CHR, Bruno cède la main, le CHR Normandie le remercie vivement pour son travail efficace. Un nouveau membre sera élu en 2014.

Travaux du CHR :

Le CHR rappelle que son objectif est d'authentifier et de publier les observations d'oiseaux rares à l'échelle régionale, sur la base de descriptions (et/ou photos). Le comité correspond avec deux comités nationaux : le Comité d'Homologation National (CHN) et le Comité des Migrateurs Rares (CMR). Les espèces rares de niveau national sont également présentées dans ce bilan mais les décisions finales et avis relèvent du CHN.

Quatre espèces ne sont plus soumises à homologation nationale depuis le 1^{er} janvier 2013 (CHN 2012), les descriptions de ces espèces doivent désormais être adressées au CHR : le **busard pâle**, la **buse pattue**, le **goéland à ailes blanches** et l'**étourneau roselin**. Par ailleurs, La **mésange rémiz** étant un migrateur rare mais régulier en Haute-Normandie (Eure, Seine-Maritime), le CHR a décidé de ne la maintenir de la liste qu'en Basse-Normandie, région où elle est toujours rare. La **pie-grièche grise**, espèce nicheuse disparue du Calvados, demeure un migrateur occasionnel en Normandie, elle a fait son entrée sur la liste le 1^{er} janvier 2013.

Dans la majorité des cas, ce bilan reflète le statut régional des espèces mais quelques oiseaux font peu l'objet de fiches descriptives, par exemple le **cygne chanteur**, le **phalarope à bec large** ou la **guifette moustac**. Pour les deux dernières espèces, ainsi que pour le **phragmite aquatique** et le **pouillot à grands sourcils** à Chausey, des fiches globales par site peuvent être envoyées au CHR (par ex. 3 phalaropes à bec large entre le 15 octobre et 1^{er} novembre à Gatteville/50, 3 PGS entre le 1^{er} et le 15 octobre à Chausey/50).

Les faits marquants :

Une nouvelle espèce s'ajoute à la liste des oiseaux de Normandie : l'**étourneau unicolore** (donnée de 2009). Pour les espèces rares de niveau national, citons une nouvelle mention de **sarcelle à ailes vertes** dans le Calvados, deux données de **marouette de Baillon**, trois **goélands à ailes blanches** et deux **étourneaux roselin**. L'**ibis falcinelle** fait une apparition remarquable avec pas moins de sept données. Belle diversité de rapaces avec l'**élanion blanc**, la **buse pattue**, le **busard pâle** et le **vautour fauve**. Parmi les espèces visitant rarement la Normandie, notons aussi la **glaréole à collier**, le **hibou petit-duc** et le **jaseur boréal**. Le **pouillot de Bonelli** est quant à lui devenu plus rare que certains pouillots sibériens...

Liste systématique des données acceptées :

*Les espèces en **rouge** et suivies d'un astérisque sont soumises à homologation nationale (CHN) et donc occasionnelles en Normandie. L'homologation de ces espèces repose sur l'avis du CHN (chn-france.org).

Les espèces en **vert** sont considérées comme très rares en Normandie. Entre parenthèses, le premier nom est celui du découvreur et/ou rédacteur de la fiche.

Bernache du Pacifique *Branta bernicla nigricans*

1 adulte le 6 décembre sur l'herbu de Vains/50 (S. Provost).

2011 : Jusqu'à 3 adultes observés à Saint-Vaast-la-Hougue/50 entre le 18 octobre 2011 et le 1^{er} avril 2012 (A. Barrier, R. Purenne, S. Crestey). Soit 4 adultes observés en 2012 contre 7 oiseaux en 2011.

Sarcelle à ailes vertes * *Anas carolinensis*

1 mâle stationne du 8 au 22 décembre à Merville-Franceville/14 (S. Provost *et al.*). 2^{ème} mention pour la Calvados après l'oiseau de 2011.



Merville-Franceville, le 15 décembre 2012 (JP. Marie)

Pélican blanc * *Pelecanus onocrotalus*

Présence régulière de l'oiseau de Poses/76, noté par exemple le 24 octobre (*in chn-france.org*).

Ibis falcinelle *Plegadis falcinellus*



Vains le 24 avril 2012 (S. Provost)

L'année 2012 marque un net essor régional des observations d'ibis falcinelle (7 données homologuées jusqu'en 2011) : 1 stationne sur le marais de Réthoville/50 du 12 au 16 janvier (D. Hébert). 1 le 31 janvier à Merville-Franceville/14 (JP. Marie, C. Leuret). 1 à la RNN de Beauguillot/50 du 1^{er} février au 16 mars (C. Renel *et al.*). 1 le 14 février à Marcey-les-grèves/50 (R. Pilon). 1 le 20 avril à Genêts/50 puis les 24 et 27 avril à Vains (S. Provost). En période postnuptiale, 1 le 27 août à Réthoville/50 (A. Corbeau, G. Corbeau, B. Lecaplain) et 1 du 12 au 14 septembre à Neuilly-la-Forêt/14 (M. Collard).

Vautour fauve *Gyps fulvus*

1 immature en vol et posé le 18 juin 2012 à Bricqueville/14 (S. Vimard). L'observation d'un vautour est toujours un événement en Normandie !

Buse pattue * *Buteo lagopus*

1 oiseau de 2^{ème} année probable, le 20 février à Helleville/50 (E. Robbe, *in chn-france.org*).

Rappel : l'espèce reste seulement soumise à homologation régionale depuis le 1^{er} janvier 2013.

Busard pâle * *Circus macrourus*

1 le 24 septembre à Octeville-sur-Mer/76 (*in chn-france.org*).

Rappel : l'espèce reste seulement soumise à homologation régionale depuis le 1^{er} janvier 2013.

Elanion blanc *Elanus caeruleus*

1 adulte observé dans le bocage de Vains/50, entre le 28 octobre et le 23 décembre 2012 (E. Veia). Remarquable et long séjour d'un oiseau qui s'est pourtant montré à de rares occasions.

Marouette de Baillon **Porzana pusilla*

1 juvénile le 19 août au marais du grand Hazé à Briouze/14 (S. Lecocq) et 1 juvénile observé le 6 et 12 septembre à Genêts/50 (S. Provost). La dernière mention régionale datait de 2009.

Outarde barbue * *Otis tarda*

1 le 20 mai à Auderville/50 (*in chn-france.org*), il s'agit de l'oiseau observé du 18 décembre 2011 au 24 mars 2012 à Montchaton/50 (rapport 2011). Cet oiseau est en Russie, a été réintroduit dans le sud-ouest de l'Angleterre en septembre 2011, équipé d'un émetteur par le *Great Bustard Group*.

Glaréole à collier *Glareola pratincola*

1 en vol sur une mare halophile de l'herbu de Huisnes-sur-Mer/50 le 10 mai (S. Provost). C'est la 4^{ème} donnée homologuée par le CHR Normandie. La dernière donnée datait de 2007.

Bécasseau tacheté *Calidris melanotos*

1 juvénile le 27 août à Réthoville/50 (A. Corbeau, G. Corbeau, B. Lecaplain, A. Verneau). 1 juvénile du 14 au 20 septembre à Pontorson/50 (S. Provost, A. Hemon) suivi d'un autre juvénile du 7 au 9 octobre (A. Hemon, S. Provost). 1 le 24 septembre sur une mare de gabion du polder de Huisnes-sur-Mer/50 (C. Gloria). Soit 4 oiseaux observés pendant la période postnuptiale 2012 (aucun en 2011).



Pontorson, le 14 septembre 2012 (S. Provost)

Bécasseau de Temminck *Calidris temminckii*



1 sur une mare de gabion le 4 mai à Ver-sur-Mer/14 (JP. Marie, J.Jean Baptiste, O. Zuchet). 1 en marge de l'herbu de Genêts/50 le 17 mai (S. Provost). 1 adulte sur un gabion de Huisnes-sur-Mer/50 le 18 août (C. Gloria). 1 juvénile dans le havre de la Vanlée à Bricqueville-sur-Mer/50 le 7 septembre (B. Chevalier). Soit un total de 4 oiseaux en 2012, contre 7 en 2011.

Ver-sur-Mer, le 4 mai 2012 (JP. Marie)

Phalarope à bec étroit *Phalaropus lobatus*

1 oiseau de 1^{er} hiver stationne du 29 septembre au 11 octobre à Bréhal/50 (B. Chevalier, S. Provost *et al.*). 1 juvénile posé dans un pré inondé de Saint-Pair-sur-Mer/50 le 14 octobre (Y. Nadal, A. Armouet, C. Braud). Double donnée de la Manche à souligner.

Goéland à bec cerclé *Larus delawarensis*



L'oiseau habituel observé pour la première fois en 2007, est noté le 23 octobre 2011 à Blonville-sur-Mer/14 (T. le Huu Nghia) puis le 9 novembre 2012 à Houlgate/14 (L. Houssier).

(T. le Huu Nghia)

Goéland bourgmestre *Larus hyperboreus*

1 individu de 4^{ème} année le 29 mai à Barfleur/50 (F. Marchalot).

Des adultes ou quasi-adultes sont rarement rencontrés sous nos latitudes.

Goéland à ailes blanches * *Larus glaucoides*

Observations s'inscrivant dans l'afflux national de l'hiver 2011/2012, l'espèce étant par ailleurs très occasionnelle en Normandie : 1 premier hiver le 9 et 12 mars à Blonville-sur-Mer et Deauville/14 (A. Ansel, JP. Marie). 2 oiseaux de 1^{er} hiver le 15 et 20 mars à Cuves/50 (S. Provost). Enfin, 1 retrouvé mort le 9 mai à Ouistreham (R. Rundle), peut-être l'oiseau de Blonville.



Blonville, le 12 mars 2012 (JP. Marie)



Cuves, le 15 mars 2012 (S. Provost)

Rappel : l'espèce reste seulement soumise à homologation régionale depuis le 1^{er} janvier 2013.

Sterne de Dougall *Sterna dougallii*



1 adulte posé le 8 juillet sur la plage de Saint-Pair-sur-Mer/50 (M. Beauflis, R. Binard, S. Loton) et 1 les 10 et 12 juillet au même endroit (J. Jean-Baptiste, S. Provost), probablement le même oiseau.

Après la tentative de reproduction à Chausey en 2011, aucune donnée ne nous est parvenue de l'archipel en 2012.

Saint-Pair-sur-Mer, le 10 juillet 2012 (S. Provost)

Sterne caspienne *Hydroprogne caspia*



1 adulte et 1 juvénile posés à Sallenelles/14 le 21 août (JP. Marie).

2011 : 1 en pêche le 2 septembre à Honfleur/14 (F. Marchalot).

Sallenelles, le 21 août 2012 (JP. Marie)

Guifette moustac *Chlidonias hybrida*

4 adultes le 24 mai à la tourbières de Baupthe/50 (B. Chevalier).

Cette guifette a fait son retour sur la liste CHR en 2011. Après une belle série d'observations en 2011 (15 oiseaux), l'année 2012 a été plus pauvre.

Mergule nain *Alle alle*

1 oiseau stationne sur le littoral de Bricqueville-sur-Mer/50 le 1^{er} janvier 2012 (B. Chevalier).

La dernière mention régionale homologuée remontait à 2007.

Macareux moine *Fratercula arctica*

Depuis la plage de Merville-Franceville/14, 1 le 1^{er} décembre et 1 le 30 décembre (JP. Marie).

2011 : 5 en vol près de l'île Saint-Marcouf/50 le 20 février (R. Purenne, F. Jeanne).

2009 : 2 posés au large de Jobourg/50 le 16 juillet (R. Purenne, F. Gally).

Alcidé toujours rare et « imprévisible » sur le littoral normand.

Hibou petit-duc *Otus scops*

2011 : 1 chanteur le 23 avril à Avranches/50 (F. Sébire). Espèce particulièrement occasionnelle.

Guêpier d'Europe *Merops apiaster*

2011 : 1 en vol vers le nord-est le 19 mai à Blonville-sur-Mer/14 (F. Marchalot).

La dernière mention homologuée en Normandie datait de 2009.

Alouette haussecol *Eremophila alpestris*

1 le 18 décembre sur la vasière de Huisnes-sur-Mer/50 (S. Provost), seule donnée régionale en fin d'année contre un total de 6 oiseaux observés en 2011.

En France, quelques dizaines à une centaine d'oiseaux sont observés tous les ans (Zucca & le CMR, 2010).

Pipit rousseline *Anthus campestris*

L'espèce n'est plus soumise à homologation sur le site de Carolles et du cap de la Hève mais elle le reste ailleurs (sources GONm/migration.net) :



Falaises de Carolles/50 :

20 en migration du 6 au 22 septembre (S. Provost, M. Beaufils, A. Corbeau, J. Girard, B. Lecaplain *et al.*)

Carolles, septembre 2012 (S. Provost)

Pipit de Richard *Anthus richardi*

A Carolles, 6 oiseaux notés en migration active entre le 21 septembre et le 31 octobre (S. Provost, D. Guillon, M. Beaufils). 1 le 21 septembre au bec d'Andaine à Genêts/50 (S. Provost). 1 le 2 octobre sur l'herbu de Beauvoir/50 (S. Provost). 1 le 20 octobre à Lingreville/50 (B. Chevalier). 1 à la pointe de Roche Thorin à Courtils/50 le 8 novembre (S. Provost). En début d'hiver, 1 sur l'herbu de Beauvoir le 18 décembre (S. Provost, A. Hemon, C. Chapon).

Soit un total de 11 oiseaux notés en 2012 contre 15 en 2011.

Bergeronnette printanière nordique *Motacilla flava thunbergi*



Huisnes-sur-Mer, le 7 mai 2012 (S. Provost)



Ver-sur-Mer, le 4 mai 2012 (JP. Marie)

Un mâle sur une mare de chasse de Ver-sur-Mer/14 le 4 mai (JP. Marie) et 1 mâle du 5 au 7 mai sur l'herbu de Huisnes-sur-Mer/50 (C. Gloria, S. Provost). La dernière mention régionale homologuée datait de 2008.

Pie-Grièche à tête rousse *Lanius senator*

1 le 19 juin au marais de Saint-Georges-de-Behon/50 (N. Guéret). 1 femelle le 4 juillet à Pennedepie/14 (S. Akermann). Le dernier oiseau homologué dans la région datait de 2009. Pour rappel, sa cousine la pie-grièche grise est également soumise à homologation régionale.

Phragmite aquatique *Acrocephalus paludicola*

Résultats du programme ACROLA du CRBPO/Museum d'Histoire Naturelle/Centre Régional de Baguage en Normandie.



Genêts, août 2012 (E. Chabot)

81 bagués dont 73 juvéniles entre le 28 juillet et le 22 août en estuaire de Seine/76 (D. Hémerly *et al.*). 1 juvénile observé le 6 août sur l'herbu de Genêts/50 (S. Provost) et, sur ce même site, 50 oiseaux bagués dont 48 juvéniles entre le 7 et le 19 août (S. Provost, A. Corbeau, C. Beaufils, A. Hemon *et al.*), record local. Dans les marais de Carentan/50, 32 capturés dont 24 au marais du Cap (Chartier, GONm). Soit un total de 164 oiseaux en 2012, effectif comparable à celui de 2011 (170 ind.).

Rousserolle turdoïde *Acrocephalus arundinaceus*



Genêts, 17 août 2012 (S. Provost)

Au printemps, 1 chanteur le 30 avril à Sure/61 (F. Morazé), 1 chanteur le 14 mai à Vains/50 (S. Provost) et 1 entendue à Bernières-sur-Seine/27 (JP. Thorez). En période estivale, 1 juvénile bagué le 17 août à Genêts/50 (S. Provost, A. Corbeau *et al.*) et 3 juvéniles bagués entre le 17 et 21 août à Sandouville/76 (D. Hémerly *et al.*).

Remarquable année pour la rousserolle turdoïde avec 7 oiseaux. L'espèce a visité quatre départements normands, alors que la dernière mention régionale datait de 2009.

Pouillot de Bonelli *Phylloscopus bonelli*

1 mâle chante le 18 mai à Appeville-Annebault/27 (F. Jiguet), il ne sera pas recontacté par la suite. Autrefois nicheur, ce pouillot est désormais particulièrement rare en Normandie...

Pouillot véloce sibérien *Phylloscopus collybita (tristis)*

1 posé près du phare de Chausey le 22 octobre (S. Provost). La dernière mention homologuée du CHR datait de 2006.



Chausey, le 22 octobre 2012 (S. Provost)

L'identification de ce taxon fait l'objet de nombreuses discussions et remises en question depuis quelques années. Une étude génétique récente (Knijff *et al.*, 2012) a montré que des oiseaux appelés autrefois « *abietinus* de l'est » (oiseaux « gris-verdâtre ») seraient en fait des *tristis*. Certains *abietinus* seraient par ailleurs difficiles à distinguer de *collybita* sur le terrain.

En attendant d'en lire davantage sur l'évolution des connaissances sur ce sujet complexe, le CHR Normandie a décidé de maintenir sous l'appellation « pouillot véloce sibérien » tous les oiseaux présentant les caractéristiques « actuelles » de la sous-espèce *tristis* (plumage pâle, sans jaune ou presque, zone jaunâtre sur les rémiges secondaires, barre alaire pâle, parotiques roussâtres, sourcils marqué, parties nues bien noires), si possible photographiés, entendus (cri plaintif ou chant) et bien décrits. Avant l'annonce d'un pouillot véloce sibérien, il convient pour l'heure d'être prudent et de ne prendre en compte que les oiseaux les plus typés.

Pouillot à grands sourcils *Phylloscopus inornatus*

Comme en 2011, uniquement des observations dans le département de la Manche. Sur la grande île de Chausey : 2 le 10 octobre (S. Provost), 1 le 20 octobre (S. Provost) et bel effectif de 7 les 22 et 23 octobre (S. Provost). A la mare de Bouillon/Jullouville, un oiseau crie activement le 8 novembre (S. Provost, G. Caucal, C. Delanoé, D. Vigneron).



Chausey, le 10 et 22 octobre 2012 (S. Provost)

Soit 11 oiseaux, nouveau record régional après les 10 oiseaux de 2011 (dont 8 à Chausey).

Gobemouche nain *Ficedula parva*



Deux observations de juvéniles dans le bocage de la grande île de Chausey/50, le 10 octobre (S. Provost) puis le 23 octobre (S. Provost).

Une prospection plus assidue de l'île de Chausey montre que le gobemouche nain est probablement plus régulier qu'il n'y paraît (5 données régionales homologuées par le CHR avant 2012).

Chausey, le 23 octobre 2012 (S. Provost)

Rémiz penduline *Remiz pendulinus*

9 entre le 21 et le 29 février à Saint-Aubin-sur-Gaillon (D. Basley). 2 adultes et 1 jeune bagués le 9 mars à Sandouville/76 (P. Provost, D. Hémerly). 1 le 14 octobre à Bréhal/50 (Y. Nadal *et al.*).

2011 : 25 captures dont 8 adultes et 11 juvéniles entre le 4 octobre et le 13 novembre à Sandouville/76 (P. Provost *et al.*).

Pour rappel, depuis le 1^{er} janvier 2013, cette espèce reste uniquement soumise à homologation dans la région Basse-Normandie (migrateur rare mais régulier en Haute-Normandie).

Jaseur boréal *Bombycilla garrulus*

2 adultes au parc du bois Jugan à Saint-Lô/50 du 12 au 20 décembre (P. Gachet *et al.*).

2011 : 1 le 12 janvier à Villers-sur-Mer/14 (F. Marchalot).

L'année 2012 est marquée par une unique observation mais plusieurs ornithos ont eu le plaisir d'observer ces oiseaux au bois Jugan.



Saint-Lô, décembre 2012 (P. Gachet / R. Gautier)

Étourneau unicolore *Sturnus unicolor*



2009 : 1 mâle adulte du 7 au 27 septembre 2009 près du phare de Goury, à Auderville/50 (P. Legay *et al.*).

C'est la première mention régionale de cette espèce du sud. Mais attention aux pièges d'identifications car certains étourneaux sansonnets atypiques ou orientaux peuvent présenter de fortes similitudes avec cette espèce.

Goury, le 7 septembre 2009 (P. Legay)

Etourneau roselin *Pastor roseus*

1 adulte le 13 juin à la RN de Beauguillot, à Sainte-Marie-du-Mont/50 (V.Dupont, G. Paysant). 1 adulte le 29-30 juin à Auderville/50 (M. Colot).

Cet étourneau reste encore très rare en Normandie, comme dans le nord de la France, contrairement à la Bretagne ou les pays de la Loire qui sont des régions visitées chaque année par l'espèce.

Pour rappel, l'espèce reste seulement soumise à homologation régionale depuis le 1^{er} janvier 2013.

Bruant ortolan *Emberiza hortulana*

1 en migration le 9 août à Genêts/50 (S. Provost) et 4 entre le 1^{er} et le 20 septembre aux falaises de Carolles/50 (S. Provost, J. Girard, E. Chabot), contre 6 en 2011.

Canard souchet X Sarcelle à ailes bleues *Anas clypeata X Anas discors*

1 mâle le 20 avril à Pontorson/50 (S. Provost). Cet oiseau avait fréquenté les rives de la Rance quelques jours auparavant. Le CHR rappelle que les descriptions d'anatidés hybrides sont prises en compte lorsqu'au moins un des « parents » est rare à l'échelle régionale ou nationale.

Goéland brun présentant les caractéristiques du Goéland de la Baltique *Larus fuscus (fuscus)*



Un adulte photographié le 8 octobre à Saint-Pair-sur-Mer/50 (S. Provost). Cette donnée figure ici pour mémoire car face à un adulte non bagué, il demeure impossible de certifier l'appartenance subsppécifique (*fuscus/intermedius*). Néanmoins, cet oiseau présentait les caractéristiques morphologiques, la coloration et le stade de mue/usure de *fuscus*. En présence d'oiseaux bagués et certifiés *fuscus*, ce taxon reste soumis à homologation nationale.

Liste des données non homologuées :

Elanion blanc *Elanus caeruleus*

1 le 1^{er} octobre 2012 à Valframbert/61. Description trop succincte, aucun élément sur la tête et les ailes.

Faucon kobez *Falco vespertinus*

1 femelle le 13 juin 2012 à Surville/50. Description insuffisante, de plus l'oiseau photographié sur la fiche est un mâle d'épervier d'Europe *Accipiter nisus*.

Goéland bourgmestre *Larus hyperboreus*

1 le 14 janvier 2012 à Auderville/50. Les critères vont dans le bon sens mais il manque des précisions sur le bec notamment, pour exclure un goéland leucique.

Goéland de Nelson *Larus argentatus X Larus hyperboreus*

Un oiseau de 1^{er} hiver le 25 décembre 2011 à Ouistreham/14. Il manque des détails descriptifs, notamment sur l'aile.

Goéland pontique *Larus cachinnans*

-Un juvénile bagué, vu le 22 septembre 2011 Ouistreham. Cet oiseau bagué à Paczkow en Pologne est peut-être issu d'une colonie mixte goéland argenté/leucophée/ pontique car la description indique un bec fort et le CV n'exclue pas un hybride.

-Un adulte le 31 janvier à Cauvicourt/14. Pour cette espèce d'identification délicate, en particulier en fin d'hiver, il est nécessaire de décrire en détail le motif alaire et le bec, afin d'exclure un éventuel hybride voire un goéland argenté.

Remerciements : Les membres du CHR Normandie remercient vivement tous les ornithologues qui transmettent leurs fiches descriptives et photographies. Merci également à la Maison du Parc Naturel Régional des Marais du Cotentin et du Bessin de nous avoir accueilli pour la réunion annuelle

CHR Normandie

chr.normandie@gmail.com

LISTE DES ESPECES SOUMISES A HOMOLOGATION EN NORMANDIE
GONm (janvier 2014)



(en gras, les espèces à soumettre au CHN)

Plongeon à bec blanc	<i>Gavia adamsii</i>
Grèbe à bec bigarré	<i>Podylimbus podiceps</i>
Albatros à sourcils noirs	<i>Diomedea melanophris</i>
Océanite culblanc	<i>Oceanodroma leucorhoa</i>
Puffin majeur	<i>Puffinus gravis</i>
Puffin cendré	<i>Calonectris diomedea</i>
Cormoran pygmée	<i>Phalacrocorax pygmeus</i>
Pélican blanc	<i>Pelecanus onocrotalus</i>
Héron crabier	<i>Ardeola ralloides</i>
Blongios nain	<i>Ixobrychus minutes</i>
Spatule africaine	<i>Platalea alba</i>
Ibis falcinelle	<i>Plegadis falcinellus</i>
Flamant rose	<i>Phoenicopterus ruber</i>
Flamant du Chili	<i>Phoenicopterus chilensis</i>
Flamant nain	<i>Phoenicopterus minor</i>
Cygne chanteur	<i>Cygnus cygnus</i>
Cygne de Bewick	<i>Cygnus columbianus</i>
Oie à bec court	<i>Anser brachyrhynchus</i>
Oie naine	<i>Anser erythropus</i>
Oie des neiges	<i>Anser caerulescens</i>
Bernache à cou roux	<i>Branta ruficollis</i>
Bernache du pacifique	<i>Branta bernicla nigricans</i>
Canard noir	<i>Anas rubripes</i>
Canard à front blanc	<i>Anas americana</i>
Canard à faucilles	<i>Anas falcata</i>

Sarcelle à ailes bleues	<i>Anas discors</i>
Sarcelle à ailes vertes	<i>Anas carolinensis</i>
Sarcelle marbrée	<i>Marmaronetta angustirostris</i>
Fuligule nyroca	<i>Aythya nyroca</i>
Fuligule à bec cerclé	<i>Aythya collaris</i>
Eider à tête grise	<i>Somateria spectabilis</i>
Macreuse à bec jaune	<i>Melanitta americana</i>
Harelda boréale	<i>Clangula hyemalis</i>
Garrot d'islande	<i>Bucephala islandica</i>
Harle couronné	<i>Lophodytes cucullatus</i>
Erismature à tête blanche	<i>Oxyura leucocephala</i>
Erismature rousse	<i>Oxyura jamaicensis</i>
Vautour fauve	<i>Gyps fulvus</i>
Vautour moine	<i>Aegypius monachus</i>
Aigle pomarin	<i>Aquila pomarina</i>
Aigle royal	<i>Aquila chrysaetos</i>
Aigle criard	<i>Aquila clanga</i>
Aigle botté	<i>Hieraaetus pennatus</i>
Buse pattue	<i>Buteo lagopus</i>
Buse féroce	<i>Buteo rufinus</i>
Pygargue à queue blanche	<i>Haliaeetus albicilla</i>
Elanion blanc	<i>Elanus caeruleus</i>
Busard pâle	<i>Circus macrourus</i>
Circaète jean-le-blanc	<i>Circaetus gallicus</i>
Faucon gerfaut	<i>Falco rusticolus</i>
Faucon sacre	<i>Falco cherrug</i>
Faucon lanier	<i>Falco biarmicus</i>
Faucon kobez	<i>Falco vespertinus</i>
Grue demoiselle	<i>Grus virgo</i>
Marouette de baillon	<i>Porzana pusilla</i>

Marouette poussin	<i>Porzana parva</i>
Talève sultane	<i>Porphyrio porphyrio</i>
Outarde canepetière	<i>Tetrax tetrax</i>
Grande outarde	<i>Otis tarda</i>
Vanneau sociable	<i>Vanellus gregarius</i>
Gravelot kildir	<i>Charadrius vociferous</i>
Pluvier guignard	<i>Charadrius morinellus</i>
Gravelot mongol	<i>Charadrius mongolus</i>
Bécassine double	<i>Gallinago media</i>
Chevalier stagnatile	<i>Tringa stagnatilis</i>
Chevalier criard	<i>Tringa melanoleuca</i>
Chevalier à pattes jaunes	<i>Tringa flavipes</i>
Chevalier Bargette	<i>Xenus cinereus</i>
Chevalier grivelé	<i>Actitis macularia</i>
Bécassin à long bec	<i>Limnodromus scolopaceus</i>
Bécasseau de Temminck	<i>Calidris temminckii</i>
Bécasseau de baird	<i>Calidris bairdii</i>
Bécasseau tacheté	<i>Calidris melanotos</i>
Bécasseau de Bonaparte	<i>Calidris fuscicollis</i>
Bécasseau rousset	<i>Tryngites subruficollis</i>
Bécasseau falcinelle	<i>Limicola falcinellus</i>
Phalarope à bec large	<i>Phalaropus fulicarius</i>
Phalarope à bec étroit	<i>Phalaropus lobatus</i>
Phalarope de Wilson	<i>Phalaropus tricolor</i>
Glaréole à collier	<i>Glareola pratincola</i>
Labbe à longue queue	<i>Stercorarius longicaudus</i>
Mouette blanche	<i>Pagophila eburnea</i>
Goéland pontique	<i>Larus cachinnans</i>
Goéland à ailes blanches	<i>Larus glaucoides</i>
Goéland bourgmestre	<i>Larus hyperboreus</i>

Goéland à bec cerclé	<i>Larus delawarensis</i>
Mouette atricille	<i>Larus atricilla</i>
Mouette de Franklin	<i>Larus pipixcan</i>
Guifette leucoptère	<i>Chlidonias leucopterus</i>
Guifette moustac	<i>Chlidonias hybridus</i>
Sterne hansel	<i>Sterna nilotica</i>
Sterne caspienne	<i>Sterna caspia</i>
Sterne de Dougall	<i>Sterna dougallii</i>
Sterne fuligineuse	<i>Sterna fuscata</i>
Sterne inca	<i>Larosterna inca</i>
Sterne voyageuse	<i>Sterna bengalensis</i>
Sterne de Forster	<i>Sterna forsteri</i>
Mergule nain	<i>Alle alle</i>
Guillemot à miroir	<i>Cephus grylle</i>
Macareux moine	<i>Fratercula arctica</i>
Coucou-geai	<i>Clamator glandarius</i>
Coulicou à bec jaune	<i>Coccyzus americanus</i>
Harfang des neiges	<i>Nyctea scandiaca</i>
Hibou petit-duc	<i>Otus scops</i>
Martinet à ventre blanc	<i>Apus melba</i>
Guêpier d'Europe	<i>Merops apiaster</i>
Rollier d'Europe	<i>Coracias garrulus</i>
Alouette calandrelle	<i>Calandrella brachydactyla</i>
Alouette haussecol	<i>Eremophila alpestris</i>
Hirondelle de rochers	<i>Hirundo rupestris</i>
Hirondelle rousseline	<i>Hirundo daurica</i>
Pipit de richard	<i>Anthus richardi (3)</i>
Pipit de Godlewski	<i>Anthus godlewskii</i>
Pipit rousseline	<i>Anthus campestris (1)</i>
Pipit à gorge rousse	<i>Anthus cervinus</i>

Bergeronnette citrine	<i>Motacilla citreola</i>
Bergeronnette printanière d'Italie	<i>Motacilla flava cinereocapilla</i>
Bergeronnette printanière nordique	<i>Motacilla flava thunbergi</i>
Pie-grièche grise	<i>Lanius excubitor</i>
Pie-grièche à tête rousse	<i>Lanius senator</i>
Pie-grièche à poitrine rose	<i>Lanius minor</i>
Jaseur boréal	<i>Bombycilla garrulus</i>
Cingle plongeur	<i>Cinclus cinclus</i>
Accenteur alpin	<i>Prunella collaris</i>
Robin à flancs roux	<i>Tarsiger cyanurus</i>
Tarier oriental	<i>Saxicola torquatus maurus</i>
Traquet oreillard	<i>Oenanthe hispanica</i>
Traquet du désert	<i>Oenanthe deserti</i>
Merle de roche	<i>Monticola saxatilis</i>
Grive dorée	<i>Zoothera dauma</i>
Phragmite aquatique	<i>Acrocephalus paludicola</i>
Rousserolle des buissons	<i>Acrocephalus dumetorum</i>
Rousserolle isabelle	<i>Acrocephalus agricola</i>
Rousserolle turdoïde	<i>Acrocephalus arundinaceus</i>
Hypolaïs ictérine	<i>Hippolais icterina</i>
Fauvette épervière	<i>Sylvia nisoria</i>
Fauvette passerinette	<i>Sylvia cantillans</i>
Fauvette mélanocéphale	<i>Sylvia melanocephala</i>
Pouillot ibérique	<i>Phylloscopus ibericus</i>
Pouillot à grands sourcils	<i>Phylloscopus inornatus</i>
Pouillot de pallas	<i>Phylloscopus proregulus</i>
Pouillot brun	<i>Phylloscopus fuscatus</i>
Pouillot de Hume	<i>Phylloscopus humei</i>
Pouillot de Bonelli	<i>Phylloscopus bonelli</i>
Pouillot véloce sibérien	<i>Phylloscopus collybita tristis</i>

Gobemouche à collier	<i>Ficedula albicollis</i>
Gobemouche nain	<i>Ficedula parva</i>
Rémiz penduline	<i>Remiz pendulinus</i> (2)
Tichodrome échelette	<i>Tichodroma muraria</i>
Bruant ortolan	<i>Emberiza hortulana</i> (3)
Bruant fou	<i>Emberiza cia</i>
Bruant mélanocéphale	<i>Emberiza melanocephala</i>
Bruant nain	<i>Emberiza pusilla</i>
Bruant à calotte blanche	<i>Emberiza leucocephalos</i>
Bruant à couronne blanche	<i>Zonotrichia leucophrys</i>
Linotte à bec jaune	<i>Carduelis flavirostris</i>
Roselin cramoisi	<i>Carpodacus erythrinus</i>
Roselin githagine	<i>Rhodopechys githaginea</i>
Sizerin blanchâtre	<i>Carduelis hornemanni</i>
Moineau espagnol	<i>Passer hispaniolensis</i>
Etourneau roselin	<i>Sturnus roseus</i>
Etourneau unicolore	<i>Sturnus unicolor</i>
Cassenoix moucheté	<i>Nucifraga caryocatactes</i>
Crave à bec rouge	<i>Pyrrhonorax pyrrhonorax</i>
Corneille mantelée	<i>Corvus cornix</i>

Et toutes autres espèces plus rares ne figurant pas encore sur la liste des oiseaux de Normandie.

(1) sauf pour les falaises de Carolles et le cap de la Hève.

(2) sauf la Haute-Normandie depuis le 1er janvier 2013

(3) une fiche globale saisonnière pour les sites de Carolles et du cap de la Hève

Comité d'Homologation Régional

Fiche descriptive pour l'observation d'une espèce occasionnelle en Normandie

à retourner à : Sébastien Provost – Le Pratey C – 50400 Granville

chr.normandie@gmail.com

Espèce proposée

Nom français :

Nom scientifique :

Nombre d'oiseaux :

Sexe :

Age :

Date(s) d'observation(s) :

Durée des observations :

Localité (Commune / Lieu-dit / département) :

Rédacteur de la fiche (Nom / adresse postale / courriel) :

Autres observateurs :

Qui l'a trouvé :

Qui l'a identifié :

Distance d'observation :

Matériel optique utilisé :

L'oiseau a-t-il été photographié :

Par qui :

L'oiseau a-t-il été capturé :

Par qui :

L'oiseau a-t-il été conservé :

Où :

Conditions météorologiques :

Connaissances antérieures de l'espèce :

Connaissances d'espèces voisines :

Description de l'observation et de l'oiseau (avant recours aux guides d'identification) :

indiquer les conditions dans lesquelles l'oiseau a été observé, puis établir une description détaillée de celui-ci (silhouette, coloration du plumage partie par partie, comportement, voix...).

Joindre éventuellement une copie des notes prises sur le terrain, ainsi que tout document graphique (dessin, photo...) ou sonore.

Bibliographie :

www.chn-france.org

Provost S. & le CHR Normandie (2012). Les oiseaux rares en Normandie en 2011 (18^{ème} circulaire). Rapport du Comité d'Homologation Régional.

Provost S. (2013). Les oiseaux de la baie du Mont-Saint-Michel. Année 2012. GONm/BV/AESN.

Reeber S. & le CHN (2012). Les oiseaux rares en France en 2011. 29^{ème} rapport du Comité d'Homologation National. Ornithos 19-6 : 353-395.

Zucca M. & le CMR (2010). Les observations d'oiseaux migrateurs rares en France (année 2007). Ornithos 17-1 : pages 2-43.