



Les oiseaux rares en Normandie en 2014

Rapport du Comité d'Homologation Régional

Sébastien Provost & le CHR Normandie
(octobre 2015)

Réuni le 28 août 2015 à Caen (14), le **CHR Normandie** a terminé l'examen de la 21^{ème} circulaire, couvrant pour l'essentiel l'année 2014. Le nombre de fiches reçues est de 145 (114 en 2013), un record pour le comité régional. Les fiches descriptives reçues, souvent accompagnées de photos, sont de bonnes qualités. D'autres données régionales ne font malheureusement pas l'objet de fiche CHR, des erreurs d'identification ne sont pas exclues dans certains cas. Ces données non décrites et non circonstanciées sont commentées comme ceci dans les publications : « non soumis au CHR », et sans mention du nom de l'auteur, par souci de cohérence et de crédibilité.

La dernière réunion s'est déroulée en présence de l'ensemble des membres : Jocelyn Desmares, Benoît Lecaplain, Matthieu Lorthiois, Jean-Pierre Marie, Sébastien Provost (secrétaire), Gunter de Smet et David Vigour. La liste des espèces CHR mise à jour, la fiche type à remplir et les rapports annuels sont téléchargeables sur le lien [http://gonm.org/index.php?post/CHR-\(Comité-d-Homologation-Régional\)](http://gonm.org/index.php?post/CHR-(Comité-d-Homologation-Régional)). Ou sur demande au secrétariat du CHR : chr.normandie@gmail.com.

Les données du Comité d'Homologation National en cours d'examen (2014) et homologuées (2013) sont mentionnées en fin de rapport (Kayser, Verneau *et al.*).

Travaux du CHR :

Le CHR rappelle que son objectif est d'authentifier et de publier les observations d'oiseaux rares à l'échelle régionale, sur la base de descriptions (et/ou photos). La circulaire au format papier va désormais laisser place à des échanges par voie numérique, ce qui permettra un fonctionnement plus efficace. Depuis le 1^{er} janvier 2013, quatre espèces ont rejoint la liste du CHR et ne sont plus soumises au CHN (**busard pâle**, **buse pattue**, **goéland à ailes blanches**, **étourneau roselin**). La **pie-grièche grise** a fait son entrée et la **mésange rémiz** n'est par ailleurs maintenue sur la liste que pour les départements de la Manche, du Calvados et de l'Orne. Enfin, à partir du 1^{er} janvier 2016, le **guêpier d'Europe** ne fera plus partie des espèces soumises à homologation régionale, compte-tenu de sa régularité croissante dans la région, des cas de nidifications ponctuels récents et du peu de fiches reçues annuellement comparé aux observations réelles. Enfin, le CHR rappelle que les espèces suivantes sont parfois « oubliées » par les observateurs qui omettent de rédiger des fiches : cygne chanteur, bernache du Pacifique, macareux moine, phalarope à bec large, labbe à longue queue... Merci d'y penser !

Les faits marquants en 2014 :

L'année 2014 a eu son lot d'espèces remarquables en Normandie : le 2^{ème} **goéland d'Audouin** pour la région, 1 nouveau **puffin cendré** à Gatteville, la capture d'1 **hibou petit-duc** en estuaire de Seine, un rassemblement exceptionnel de 27 **vautours fauves** dans le nord-Cotentin ou encore l'observation d'espèces réputées rare partout en France : 1 **busard pâle**, 1 **marouette poussin**, 1 **goéland à ailes blanches** et 1 **étourneau roselin**. Plusieurs espèces du sud nous ont rendu visite : 2 **pouillots ibériques**, 1 **martinet pâle** et de nombreux **guêpiers d'Europe** (avec des cas de reproduction). Les marais de la Dives (14) confirment leur grande attractivité pour les rapaces rares puisque le **circaète Jean-le-blanc**, l'**élanion blanc** et le **faucon kobez** y ont été observés. De l'année 2014, nous retiendrons aussi le rassemblement de 7 **érismatures rousses** à Poses, 3 **cygnes de Bewick** dans l'Eure et l'effectif annuel record de 13 **goélands pontiques**. Enfin, parmi les espèces non détectées annuellement dans la région, signalons 2 mentions printanières de **pipit à gorge rousse** en baie du Mont-Saint-Michel, 1 **gobemouche nain** en période hivernale à Jullouville et deux espèces d'origine montagnarde, vues dans la Manche : 1 **tichodrome échelette** et 1 **martinet à ventre blanc**.

Liste systématique des données acceptées :

Les espèces en **vert** sont considérées comme très rares en Normandie (aucune observation certaines années). Entre parenthèses, le premier nom est celui du découvreur et/ou rédacteur de la fiche.

Cygne chanteur *Cygnus cygnus*

6 oiseaux (2 adultes et 4 juvéniles) le 3 décembre à Léry-Poses/27 (D. Basley, C. Goujon).
3 avaient été notés en 2013 en Normandie.

Cygne de Bewick *Cygnus columbianus*



3 adultes le 1^{er} janvier à Saint-Aubin-sur-Quillebeuf/27 (A. Portmann).

La dernière mention régionale homologuée datait de décembre 2010 à Picauville/50.

(A. Portmann)

Bernache du Pacifique *Branta bernicla nigricans*

1 les 25 janvier et 7 février à Vains/50 (S. Provost, C. Gloria). 1 le 29 novembre à Vains/50 (G. Duffez).
1 le 14 décembre à Saint-Pair-sur-mer/50 (S. Reyt, JM. Dramard).
Soit 3 oiseaux détectés en baie du Mont-Saint-Michel en 2014, à ajouter aux 3 adultes suivis à Saint-Vaast-La-Hougue/50 jusqu'en mars 2014 (rapport 2013), cela fait 6 individus pour la Normandie en 2014 (7 en 2013).

Erismature rousse *Oxyura jamaicensis*

Groupe de 7 dont 3 mâles adultes le 23 octobre à Poses/27 (D. Basley).
Remarquable effectif pour cette espèce allochtone de plus en plus rarement observée dans la région puisque la dernière mention homologuée date de décembre 2009 à Léry-Poses/27.


Puffin cendré *Calonectris diomedea*

1 le 18 août à Gatteville-le-Phare/50 (A. Verneau).
La sous-espèce n'a pu être précisée (*diomedea/borealis*).
Heureuse nouvelle mention en provenance du nord-Cotentin après celui d'octobre 2013.

Océanite culblanc *Oceanodroma leucorhoa*

2009 : 1 le 20 septembre à Arromanches-les-Bains/14 (J. Jean-Baptiste, F. Jeanne). 1 le 1^{er} décembre à Varaville/14 (J. Jean-Baptiste, J-P. Marie, D. Vigour).
En 2014, 1 au lac des 2 amants à Poses/27 le 23 novembre (Y. Créau, C. Goujon, D. Basley).
Donnée pour le moins inhabituelle dans l'Eure !
6 Océanites culblanc avaient été observés en Normandie en 2013.

Blongios nain *Ixobrychus minutus*



2 mâles et 1 femelle dont 1 couple nicheur entre le 22 mai et le 29 juin au moins au Val-de-Reuil/27 (C. Gérard, C. Chartier *et al.*). 1 mâle adulte chanteur et vu le 7 mars à Saint-Vigor-d'Ymonville/76 (G. de Smet).

Soit 4 oiseaux en 2014 en Normandie, un bon cru, de plus couronné par une nidification (1 ind. vu en 2013).

(C. Gérard)

Ibis falcinelle *Plegadis falcinellus*



1 le 1^{er} février à Dragey-Ronthon (J-P. Louvet). 1 du 24 février au 28 avril à Néville-sur-Mer/50 puis Réthoville/50 (A. Verneau, D. Giot, A. Livory, R. Coulomb). 1 le 1^{er} avril à Saint-Georges-de-Bohon/50 (W. Raitière). 1 oiseau bagué le 1^{er} avril à Cosqueville/50 (P. Bernardin). 1 du 30 juillet au 13 août à Saint-Côme-du-Mont/50 et Saint-Georges-de-Bohon/50 (B. Lecaplain, M. Barendse).
(P. Bernardin)

Soit 5 oiseaux en 2014, après un groupe de 10 observé en 2013 dans la Manche et 7 données en 2012. L'oiseau de Cosqueville a été bagué le 24 juillet 2013 en Espagne dans la réserve biologique de Donana. Il avait été observé auparavant en Grande-Bretagne en mai 2014, à Christchurch et Tichfield.

Gypaète barbu *Gypaetus barbatus*

Un oiseau de 2^{ème} année, équipé d'une balise argos, a traversé la Normandie (www.bartgeier.org) le 30 mai 2014, du côté de Vaudeloges/14 (*vide* E. Chabot). Cet oiseau a été élevé en captivité en Espagne et relâché en Aveyron le 6 juin 2013 (Programme Grands Causses).

Cette nouvelle donnée rappelle les aventures d'un autre jeune gypaète équipé d'une balise argos, relâché en Suisse puis ayant survolé la Normandie en juin 2011 (Rapport CHR Normandie 2011).

Vautour fauve *Gyps fulvus*

Rassemblement de 27 les 20 et 21 mai à Huberville/50 (A. Barrier, G. Lemarois, G. Tissier, T. Lemaitre) puis ce même groupe le 22 mai à Fresville/50 (J. Desmares). 2 le 22 mai à Urou-et-Crennes/61 (A. Hugues) et 1 le 24 mai à Cordebugle/14 (C. Rideau, J. Vittier).

Affluence exceptionnelle de 30 vautours fauves fin mai ! La dernière mention homologuée datait de juin 2012 à Bricqueville/14.

Circaète Jean-le-Blanc *Circaetus gallicus*

2013 : 1 immature le 22 août à Saint-Ouen-du-Mesnil/14 et Hotot-en-Auge/14 (G. de Smet *et al.*). 2 en vol le 15 septembre à Hotot-en-Auge/14 (G. de Smet).

En 2014, 1 immature (3A) le 7 septembre 2014 à Hotot-en-Auge/14 (G. de Smet *et al.*).

La région des marais de la Dives semble particulièrement propice à l'observation du Circaète...

La dernière mention homologuée par le CHR concernait une observation de juin 2011 à Sandouville/76, en estuaire de Seine.

Aigle botté *Aquila pennata*



2012 : 1 photographié 9 mai à Criquebeuf-sur-Seine/27 (C. Goujon).

La dernière donnée régionale homologuée datait de septembre 2002 à Carolles.

(C. Goujon)

Busard pâle *Circus macrourus*

1 mâle adulte le 10 octobre à Marolles/14 (C. Rideau), revu à Thiberville/14 et Cordebugle/14.

Rare mention d'un mâle adulte dans la région, la dernière donnée homologuée concernait un juvénile observé en septembre 2010 à Vains/50 (Reeber & le CHN, 2011).

Elanion blanc *Elanus caeruleus*



1 adulte posé à Hotot-en-Auge/14 le 25 septembre (JF. Lepetit) et 1 le long de l'A28, à Villers-sous-Foucarmont/76, le 19 novembre (B. Millot).

Deux nouvelles données postnuptiales après la mention hivernale du nord-Cotentin en 2013. Les observations de ce rapace en Normandie progressent lentement, mais sûrement !

(JF. Lepetit)

Faucon kobez *Falco vespertinus*

2013 : 1 juvénile à Hotot-en-Auge le 22 septembre (G. de Smet).

En 2014, 1 femelle de passage le 30 octobre à Saint-Lô (P. Gachet).

Deux observations récentes, c'est à souligner, car la dernière mention homologuée en Normandie date de mai 2007 à Chausey/50.

Marouette poussin *Porzana parva*

1 femelle le 20 avril à Cosqueville (F. Branswyck, F. Dauguet).

La dernière donnée régionale était celle d'un mâle chanteur en juin 2011 à Saint-Vigor-d'Ymonville/76, en estuaire de Seine.

Pluvier guignard *Charadrius morinellus*




1 adulte et 1 juvénile du 27 août et 30 août à Réthoville/50 (A. Verneau, A. Guérard).

Une seule donnée en période postnuptiale, comme en 2013.

(A. Verneau)

Phalarope à bec large *Phalaropus fulicarius*



1 oiseau de 1^{er} hiver dans le havre de Geffosses/50 le 14 octobre (B. Chevalier). 1 sur le lagunage de Bréhal/50 le 22 octobre (S. Provost). 1 en bord de mer à Ouistreham/14 le 6 novembre (R. et M. Rundle) et 1 le 15 novembre à Merville-Franceville (J-P. Marie).

Automne assez classique avec l'observation de 4 oiseaux pendant le passage postnuptial, contre 3 en 2014 en Normandie.

(S. Provost)

Bécasseau tacheté *Calidris melanotos*

2011 : 1 femelle adulte le 2 juin à Léry-Poses/27 (C. Goujon).

En 2014, 2 juvéniles le 7 septembre à Cosqueville/50 (A. Verneau, S. Crestey, L. Legrand).

Visiteur néarctique toujours discret. 1 seul oiseau avait été détecté en 2013 en Normandie.

Bécasseau de Temminck *Calidris temminckii*

En halte pré-nuptiale, 1 sur l'herbu de Huisnes-sur-mer/50 le 15 mai (S. Provost) et 3 adultes sur le polder de Sainte-Marie-du-Mont/50 le 18 mai (E. Martin). Puis, 1 juvénile détecté à Bréhal/50 le 9 septembre (B. Chevalier). Soit un total annuel de 5 Temminck (1 seul en 2013).

Labbe à longue queue *Stercorarius longicaudus*



1 oiseau de première année observé et photographié le 21 septembre à Gatteville-le-Phare/50 (C. Kerihuel, F. Malvaud).

6 oiseaux avaient été observés en 2013 en Normandie.

(C. Kerihuel)

Goéland d'Audouin *Larus audouinii*



Un subadulte de 3^{ème} année le 16 juin à Merville-Franceville/14 (J-P. Marie).

Ce goéland méditerranéen est exceptionnel dans le nord de la France. Il s'agit de la 2^{nde} mention régionale après celle du 3 mai 2004, également du Calvados (Dubois *et al.*, 2008).

(J-P. Marie)

A titre de comparaison, il n'existe que 6 mentions de goéland d'Audouin en Grande-Bretagne (d'après *bbrc.org.uk*).

Goéland pontique *Larus cachinnans*

2008 : 1 le 27 février à Poses/27 (C. Goujon).

2009 : 1 le 4 novembre à Poses/27 (C. Goujon).



En 2014, 1 adulte le 5 janvier à Poses/27 (A. Portmann) puis une belle affluence postnuptiale dans le Calvados : 1 oiseau de 2^{ème} année (2A) le 5 septembre à Ouistreham/14 (J-P. Marie), un 1^{ère} année bagué le 18 octobre à Merville-Franceville/14 (T. le Huu-Nghia) et un 2A bagué (XEFN) le 13 novembre à Houlgate/14 (T. le Huu-Nghia).

(T. le Huu-Nghia)

Remarquable série d'observations à Dives-sur-Mer/14 (T. le Huu-Nghia) : un 2A bagué (XKDV) du 14 septembre au 29 novembre, un 3A bagué (PKVV) le 18 octobre, un 2A non bagué le 2 novembre, un 2A et un 1A non bagués le 14 novembre puis 1 adulte non bagué le 30 novembre. En début d'hiver, observations d'oiseaux non bagués (T. le Huu-Nghia) : un 1^{er} hiver le 14 décembre, un 2^{ème} hiver le 20 décembre et un 1^{er} hiver le 30 décembre à Cabourg/14.

Pour cette espèce d'identification délicate, toutes les données soumises au CHR (concernant 13 individus) ont été homologuées. Le comité rappelle qu'il faut être particulièrement rigoureux dans la description (si possible prendre des photos), afin d'exclure un éventuel goéland leucophée ou argenté (notamment en fin d'hiver) voire un hybride.

Goéland bourgmestre *Larus hyperboreus*



2012 : 1 immature le 22 janvier au CET de Saint-Fromond/50 (E. Martin).

En 2014, un oiseau de 1^{er} hiver en vol vers l'Est le 9 janvier au polder Frémont/Roz-sur-Couesnon-Beauvoir/35-50 (K. le Rest), lors d'un petit afflux observé en Bretagne.

2 oiseaux avaient été homologués en Normandie en 2013.

(E. Martin)

Goéland à ailes blanches *Larus glaucoides*



Un 1^{er} hiver du 2 au 17 février à Port-en-Bessin/14 (A. Lepoutier, A. Chartier).

Le dernier goéland à ailes blanches régional avait été noté à Crosville-sur-Douve/50, en décembre 2012.

(A. Lepoutier)

Sterne caspienne *Hydroprogne caspia*

1 adulte le 19 avril à Ouistreham/14 (J-P. Marie) et 1 en vol le 11 octobre à Brévands/50 (M. Collard).

2 données en 2014 pour cette grande sterne, deux fois moins qu'en 2013.

Guifette moustac *Chlidonias hybrida*

2 au Val-de-Reuil/27 le 19 mai (M. Lorthiois), 4 à Barville/61 le 7 juin (S. Lecocq) et 3 le 11 juin à Pont-l'Evêque/14 (G. et E de Smet).

Total de 9 oiseaux en 2014 contre une vingtaine en Normandie en 2013 (tous dans l'Eure).

Pour rappel, cette guifette a fait son retour sur la liste du CHR en 2011.

Mergule nain *Alle alle*

1 en vol le 23 octobre à Merville-Franceville/14 (J-P. Marie).

Le dernier mergule régional avait été vu en janvier 2012 à Bricqueville-sur-Mer/50.

Macareux moine *Fratercula arctica*

1 oiseau posé à Gatteville-le-Phare/50 le 31 octobre (R. Hanotel, B. et N. Geoffroy).

La dernière observation régionale date de février 2013 à Fécamp/76.

Petit-Duc scops *Otus scops*



Remarquable capture d'un oiseau de 2^{ème} année le 4 juillet à Tancarville/76, en bordure de Seine (K. Sourdrille & G. le Guillou/RNN Estuaire de Seine).

La dernière donnée normande homologuée concernait un chanteur entendu à Avranches/50 en avril 2011.

(K. Sourdrille)

Martinet pâle *Apus pallidus*

1 le 14 novembre à Merville-Franceville/14 (J-P. Marie).

Le dernier martinet pâle homologué en Normandie était passé à Carolles/50 en octobre 2010.

Martinet à ventre blanc *Apus melba*

1 le 8 avril au Mont de Doville/50 (J. Desmares).

Encore un martinet particulièrement occasionnel dans la région puisqu'il faut remonter à mai 2000 pour obtenir la dernière mention homologuée, à Port-en-Bessin/14.

Guêpier d'Europe *Merops apiaster*

2013 : 10 en vol vers le nord-est le 1^{er} juin au Val-Saint-Père/50 (S. et G. Morvan).



En 2014, 7 de passage le 17 mai à Lion-sur-Mer/14 (B. Dumeige). Au moins 1 le 19 juin à Saint-Pierre-du-Val/27 (G. de Smet). Possible reproduction à Port-en-Bessin/14 (D. Loir, H. Szwajcer, JC. Jarry, JL. Ribot) avec la présence d'au moins 5 adultes entre le 21 juin et le 13 juillet. 3 adultes posés le 15 juillet à Jullouville/50 (T. Basset) et jusqu'à 20 perchés le 15 août à Maisons/14 (S. Loiseau, J. Girard).

Remarquable année pour le Guêpier en Normandie avec en prime quelques nidifications probables.

Vu sa régularité croissante, le CHR Normandie a pris la décision de le retirer de la liste des espèces à soumettre au CHR, à compter du 1^{er} janvier 2016.

(O. Loir)

Alouette haussecol *Eremophila alpestris*

4 à la pointe d'Agon-Coutainville/50 le 19 janvier (G. Corbeau, A. Livory *et al.*). 3 sur la vasière de Huisnes-sur-mer/50 le 22 mars (S. Provost). 2 dans le havre de Portbail/50 du 3 décembre au 27 février 2015 (D. Lemaréchal, F. Noël).

Total annuel de 9 oiseaux (30 en 2013), tous détectés dans la Manche.

Pipit rousseline *Anthus campestris*

1 en migration le 3 septembre à Sure/61 (F. Moraze) et 1 posé le 7 septembre à Bricqueville-sur-Mer/50 (B. Chevalier). Aucun détecté à Carolles ni à Sainte-Adresse à cette période.

Soit un total régional faible de 2 oiseaux en 2014, contre 15 en 2013.

Pipit de Richard *Anthus richardi*

2013 : 1 en migration le 2 octobre à Sainte-Adresse/76 (Y. Jacob).

En 2014, 1 le 14 janvier à Pontorson/50 (S. Provost). Au passage pré-nuptial, 1 le 15 avril à Oudalle/76 (G. de Smet) et 1 le 17 avril à Beauvoir/50 (S. Provost). Au passage post-nuptial, 1 le 20 octobre à Saint-Clair-de-Halouze/61 (D. Aubert), au moins 1 le 27 octobre à Réthoville/50 (R. Hanotel, B. & N. Geoffroy), 1 le 16 novembre à Ver-sur-Mer/14 et 1 à Beauvoir le 23 novembre (K. Le Rest).

Total de 7 oiseaux détectés en 2014, tous à l'unité, un automne classique. Les deux dates printanières sont comparables, on notera aussi l'absence d'observation automnale à Carolles. 13 oiseaux avaient été observés et homologués en Normandie en 2013.

Pipit à gorge rousse *Anthus cervinus*

1 le 17 avril au bec d'Andaine à Genêts/50 (S. Provost) et 1 le même jour au polder Frémont, à Beauvoir-Roz-sur-Couesnon/50-35 (S. Provost).

Il s'agit des premières mentions printanières en baie du Mont-Saint-Michel (les 3^{ème} et 4^{ème} pour la Normandie). Ce pipit est surtout détecté en période post-nuptiale, le dernier en octobre 2011 à Carolles.

Phragmite aquatique *Acrocephalus paludicola*

Résultats du programme ACROLA du CRBPO/Museum d'Histoire Naturelle/Centre Régional de Bague en Normandie.

39 bagués du 1^{er} au 29 août au Camp du Hode/76, à Sandouville et Saint-Vigor-d'ymonville (K. Sourdrille, G. Le Guillou, Y. Jacob *et al.*). 22 bagués du 1^{er} août au 4 septembre à Montmartin-en-Graignes/50 (A. Chartier *et al.*). 20 bagués du 5 au 24 août à Genêts/50 (S. Provost, J. Fournier, C. Beauvils, A. Corbeau *et al.*). 5 bagués à Saint-Hilaire-Petitville/50 entre le 5 et le 10 août (A. Chartier *et al.*). 1 adulte observé le 7 août à Genêts/50 (S. Provost). 2 bagués entre le 8 et le 19 août à Saint-Georges-de-Bohon/50 (B. Lecaplain). 1 bagué le 9 août à Saint-Arnoult/14 (B. Dumeige, E. Schmitt) et 1 jeune bagué le 1^{er} septembre à Courcelles-sur-Seine/27 (M. Lorthois, G. Corteel, B. Faucon).



Un total de 91 oiseaux en 2014, une « petite saison », également constatée dans d'autres régions, et bien en dessous de ces dernières années en Normandie, par exemple 2013 (123) et 2012 (164), avec une pression de suivi comparable.

(A. Chartier)

Rousserolle turdoïde *Acrocephalus arundinaceus*

1 juvénile capturé le 3 août à Montmartin-en-Graignes/50 (A. Chartier, F. Guillaume).

Nouvelle donnée régionale, après une année blanche et une année 2012 exceptionnelle (7 oiseaux).

Pouillot véloce sibérien *Phylloscopus collybita tristis*




1 entendu et vu le 15 novembre à Carolles/50 (S. Provost).

Une seule donnée, comme en 2012 et 2013.

Pour rappel, le CHR Normandie a décidé de maintenir sous l'appellation « pouillot véloce sibérien » tous les oiseaux présentant les caractéristiques de la sous-espèce *tristis* (plumage pâle, zone jaunâtre limitée aux rémiges secondaires, barre alaire pâle, parotiques roussâtres, sourcils marqué, parties nues bien noires), avec cri ou chant entendus, une description détaillée et si possible des photos.

(S. Provost)

Pouillot ibérique *Phylloscopus ibericus*



1 chanteur du 13 au 15 mai à Saint-Nicolas-des-bois/50 (J. Collette, A. Corbeau) et 1 chanteur du 14 au 16 mai à Louvigny/14 (B. & C Lang, J. Girard, S. Loiseau).

2 oiseaux repérés à la même période en Normandie, c'est inédit. Nos voisins bretons en ont également signalé plusieurs au même moment.

L'oiseau de la Manche a posé question en raison de son chant parfois intermédiaire entre le pouillot véloce et l'ibérique ; celui du Calvados présentait un chant typique. Le plumage de ces 2 oiseaux correspondait parfaitement à *ibericus*.

(A. Corbeau)

Un chant mixte « véloce-ibérique » peut être influencé par les pouillots environnants et ne correspond par forcément à des cas d'hybridations selon certains auteurs (G. de Smet, *comm.pers.*). Dans tous les cas, un enregistrement du chant (et si possible du cri), des photos et une bonne description sont fortement recommandés pour l'homologation de cette espèce. Ces 2 données s'ajoutent à seulement 2 mentions antérieures validées en Normandie (à Coutances et Chausey).

Pouillot à grands sourcils *Phylloscopus inornatus*

2013 : 1 le 1^{er} octobre à Fécamp/76 (Y. Jacob) et 2 le 2 octobre à Sainte-Adresse/76 (Y. Jacob, M. Simon, D. Tissier).

En 2014, 1 le 15 octobre à Paluel/76 (Y. Jacob), 1 du 16 au 18 octobre à Chausey (C. Girard *et al.*) et 1 le 24 octobre à Bréhal/50 (S. Provost).

Soit seulement 3 oiseaux cette année, contre 19 en 2013 (année record).

Gobemouche nain *Ficedula parva*

1 oiseau de 1^{er} hiver à Jullouville/50, le 26 février (S. Provost). C'est la première mention hivernale pour la région et la troisième pour la France à cette saison (Provost, 2014).

Le dernier gobemouche nain avait été noté en octobre 2013 à Chausey.

Rémiz penduline *Remiz pendulinus*



2013 : 4 individus stationnent longuement à la prairie de Caen/14 du 27 octobre au 29 mars 2014 (D. Vigour, J-P. Moulin, J. Jean-Baptiste, B. Lang *et al.*).

En 2014, 2 adultes le 5 mars à Saint-Côme-du-Mont/50 (B. Lecaplain), 1 mâle le 31 octobre à Bonneville-sur-Touques/14 (E. Schmitt) et 1 à Pontorson/50 le 27 novembre (S. Provost).

(D. Vigour)

Soit 4 oiseaux en 2014 en Basse-Normandie, contre un total de 5 en 2013.

Pour rappel, depuis le 1^{er} janvier 2013, cette espèce reste uniquement soumise à homologation dans les départements de la Manche, Orne et Calvados (migrateur rare mais régulier en Haute-Normandie).

Tichodrome échelette *Tichodroma muraria*

1 à Coutances/50 le 18 mars, contre le bâtiment des Unelles (C. Burban).

Il faut remonter à janvier 1994 pour obtenir la dernière mention homologuée, c'était à Granville/50.

Pie-grièche grise *Lanius excubitor*

1 le 27 mars à Fontenai-les-louvets/61 (S. Lecocq), 1 le 17 avril à Veulettes-sur-Mer/76 (D. Gest) et 1 en migration le 27 octobre à Carolles/50 (S. Provost, M. Carrasco).

3 données cette année (2 en 2013), pour une espèce devenue particulièrement « discrète » dans la région.

Pie-grièche à tête rousse *Lanius senator*

1 juvénile le 27 août à Beuzeville/27 (G. de Smet).

Les données postnuptiales régionales sont nettement plus exceptionnelles qu'au printemps.

2 oiseaux avaient été homologués en 2013.

Etourneau roselin *Pastor roseus*

Nouvelle et très rare observation régionale après les deux données de 2012 (premières mentions pour la Normandie) : 1 adulte le 18 juillet à Clitourps/50 (G. Pillet).

Bruant ortolan *Emberiza hortulana*

1 en migration le 24 août à Genêts (S. Provost *et al.*), au moins 1 en migration le 6 septembre à Carolles/50 (A. et C. Corbeau) et 1 en migration le 16 septembre à Saint-Pierre-du-Val/27 (G. de Smet).

Soit 3 oiseaux détectés en 2014 en Normandie, contre 2 en 2013.

Liste des données non homologuées par le CHR Normandie :

Océanite sp *Oceanodroma sp*

Comme le suggéraient les observateurs, il s'agit probablement d'une océanite culblanc mais il manque quelques critères pour en être certain.

Martinet pâle *Apus pallidus*

- 1 le 27 octobre à Saint-Jouin-Bruneval/76 : la tête et les couvertures sous-alaires font penser à un martinet pâle mais la qualité moyenne des photos et l'absence de description ne permettent pas d'écarter de manière certaine un martinet noir.
- 1 le 18 novembre à Granville/50 : cette donnée laisse supposer un martinet pâle. Cependant, sans observation détaillée aux jumelles, des critères n'ont pu être relevés pour être certain de l'identification (étendue du blanc à la gorge, motif des rémiges, silhouette,...).

Remerciements : Les membres du CHR Normandie remercient vivement tous les ornithologues qui transmettent leurs fiches descriptives et photographies, permettant ainsi d'assurer une « traçabilité » des observations d'oiseaux rares en Normandie. Merci également au bureau du GONm de nous avoir accueilli au siège régional de Caen pour la réunion annuelle.

CHR Normandie chr.normandie@gmail.com

Espèces occasionnelles signalées en Normandie en 2014, en cours d'examen au CHN :


(A paraître dans le rapport CHN publié dans *Ornithos*) :

- **Bernache à cou roux** (*Branta ruficollis*) : 1 du 21 février au 5 mars à Auderville/50.
- **Bernache à cou roux** (*Branta ruficollis*) : 1 le 23 octobre à Cricqueville-en-Bessin/14.
- **Bernache à cou roux** (*Branta ruficollis*) : 2 à Porte-Joie/27 du 3 décembre au 8 février 2015.
- **Sarcelle à ailes vertes** (*Anas carolinensis*) : 1 mâle le 22 février à Sainte-Marie-du-Mont/50.
- **Macreuse à bec jaune** (*Melanitta americana*) : 5 le 30 octobre à Auderville/50.
- **Pélican blanc** (*Pelecanus onocrotalus*) : 1 présent tout au long de l'année au lac des 2 amants à Poses/27.
- **Marouette de Baillon** (*Porzana pusilla*) : 1 juvénile capturé le 11 août à Genêts/50.
- **Marouette de Baillon** (*Porzana pusilla*) : 1 juvénile non bagué le 14 août à Genêts/50, revu le 15 août et bagué le 16 août.
- **Sterne de Forster** (*Sterne forsteri*) : 1 du 29 août au 2 septembre puis 1 du 12 novembre à 6 décembre à Saint-Pair-sur-Mer/50.
- **Vanneau sociable** (*Vanellus gregarius*) : 1 du 30 avril au 12 mai à la Cerlangue/76.
- **Guillemot à miroir** (*Cephus grylle*) : 1 adulte en vol le 15 mai à Saint-Marcouf/14.
- **Pipit de Godlewski** (*Anthus godlewski*) : Un 1^{er} hiver à Carolles du 21 novembre au 6 décembre.
- **Pipit à dos olive** (*Anthus hodgsoni*) : 1 le 25 octobre à Chausey/50.
- **Robin à flancs roux** (*Tarsiger cyanurus*) : 2 le 3 septembre à Hautot-sur-Mer/76.
- **Roselin cramoisi** (*Carpodacus erythrinus*) : 1 chanteur les 22 et 23 mai à Pont-Audemer/27 (G. & N de Smet).

Espèces occasionnelles observées en 2013 en Normandie et acceptées par le CHN :

(Kayser, Verneau & le CHN, 2015)

- **Oie à bec court** (*Anser brachyrhynchus*) : 1 du 7 au 14 décembre à Sainte-Marie-du-Mont/50 (S. Provost *et al.*).
- **Bernache à cou roux** (*Branta ruficollis*) : 1 adulte du 21 au 26 octobre à Aumeville-Lestre/50 (A. Barrier *et al.*).
- **Albatros à sourcils noirs** (*Thalassarche melanophris*) : 1 adulte le 23 mai à Langrune-sur-Mer/14 (I. Henry, C. & G. Chufresnes).
- **Buse féroce** (*Buteo rufinus*) : 1 adulte le 20 juin à Banneville-sur-Ajon/14 (D. Vigour). Première mention pour la Normandie.
- **Sterne de Forster** (*Sterna forsteri*) : 1 adulte le 13 novembre à Landemer/50 (S. Crestey), revu le 8 décembre à Réthoville/50 (A. & V. Verneau). Première mention pour la Normandie.
- **Guillemot à miroir** (*Cepphus grylle*) : 1 le 30 novembre à Gatteville-le-Phare/50 (A. Verneau, L. Legrand *et al.*).
- **Traquet du désert** (*Oenanthe deserti*) : 1 mâle les 7 et 8 décembre à Digulleville/50 (O. Aubrais, F. Noël). 3^{ème} mention pour la Normandie.
- **Rousserolle isabelle** (*Acrocephalus agricola*) : 1 de plus d'un an capturé le 10 juin au Havre/76 (D. Hemery).
- **Pélican blanc** (*Pelecanus onocrotalus*) : 1 le 31 août à Poses/27 (G. Rethore, A. Ploquin).
- **Harle couronné** (*Lophodytes cucullatus*) : 1 mâle le 17 mars à Marcey-les-Grèves/50 (S. Provost).



(S. Crestey, A. Portmann, P. Bernardin, O. Aubrais, D. Hemery)

LISTE DES ESPECES SOUMISES A HOMOLOGATION EN NORMANDIE
GONm (octobre 2015)

(en gras, les espèces soumises au CHN)

Plongeon à bec blanc	<i>Gavia adamsii</i>
Grèbe à bec bigarré	<i>Podilymbus podiceps</i>
Albatros à sourcils noirs	<i>Diomedea melanophris</i>
Océanite culblanc	<i>Oceanodroma leucorhoa</i>
Puffin majeur	<i>Puffinus gravis</i>
Puffin cendré	<i>Calonectris diomedea</i>
Cormoran pygmée	<i>Phalacrocorax pygmaeus</i>
Pélican blanc	<i>Pelecanus onocrotalus</i>
Héron crabier	<i>Ardeola ralloides</i>
Blongios nain	<i>Ixobrychus minutus</i>
Spatule africaine	<i>Platalea alba</i>
Ibis falcinelle	<i>Plegadis falcinellus</i>
Flamant rose	<i>Phoenicopterus ruber</i>
Flamant du Chili	<i>Phoenicopterus chilensis</i>
Flamant nain	<i>Phoenicopterus minor</i>
Cygne chanteur	<i>Cygnus cygnus</i>
Cygne de Bewick	<i>Cygnus columbianus</i>
Oie à bec court	<i>Anser brachyrhynchus</i>
Oie naine	<i>Anser erythropus</i>
Oie des neiges	<i>Anser caerulescens</i>
Bernache à cou roux	<i>Branta ruficollis</i>
Bernache du pacifique	<i>Branta bernicla nigricans</i>
Canard noir	<i>Anas rubripes</i>
Canard à front blanc	<i>Anas Americana</i>
Canard à faucilles	<i>Anas falcata</i>
Sarcelle à ailes bleues	<i>Anas discors</i>
Sarcelle à ailes vertes	<i>Anas carolinensis</i>

Sarcelle marbrée	<i>Marmaronetta angustirostris</i>
Fuligule nyroca	<i>Aythya nyroca</i>
Fuligule à bec cerclé	<i>Aythya collaris</i>
Eider à tête grise	<i>Somateria spectabilis</i>
Macreuse à bec jaune	<i>Melanitta Americana</i>
Harelda boréale	<i>Clangula hyemalis</i>
Garrot d'islande	<i>Bucephala islandica</i>
Harle couronné	<i>Lophodytes cucullatus</i>
Erismature à tête blanche	<i>Oxyura leucocephala</i>
Erismature rousse	<i>Oxyura jamaicensis</i>
Vautour fauve	<i>Gyps fulvus</i>
Vautour moine	<i>Aegypius monachus</i>
Aigle pomarin	<i>Aquila pomarina</i>
Aigle royal	<i>Aquila chrysaetos</i>
Aigle criard	<i>Aquila clanga</i>
Aigle botté	<i>Hieraaetus pennatus</i>
Buse pattue	<i>Buteo lagopus</i>
Buse féroce	<i>Buteo rufinus</i>
Pygargue à queue blanche	<i>Haliaeetus albicilla</i>
Elanion blanc	<i>Elanus caeruleus</i>
Busard pâle	<i>Circus macrourus</i>
Circaète jean-le-blanc	<i>Circaetus gallicus</i>
Faucon gerfaut	<i>Falco rusticolus</i>
Faucon sacre	<i>Falco cherrug</i>
Faucon lanier	<i>Falco biarmicus</i>
Faucon kobez	<i>Falco vespertinus</i>
Grue demoiselle	<i>Grus virgo</i>
Marouette de baillon	<i>Porzana pusilla</i>
Marouette poussin	<i>Porzana parva</i>
Talève sultane	<i>Porphyrio porphyrio</i>

Outarde canepetière	<i>Tetrax tetrax</i>
Grande outarde	<i>Otis tarda</i>
Vanneau sociable	<i>Vanellus gregarius</i>
Gravelot kildir	<i>Charadrius vociferus</i>
Pluvier guignard	<i>Charadrius morinellus</i>
Gravelot mongol	<i>Charadrius mongolus</i>
Bécassine double	<i>Gallinago media</i>
Chevalier stagnatile	<i>Tringa stagnatilis</i>
Chevalier criard	<i>Tringa melanoleuca</i>
Chevalier à pattes jaunes	<i>Tringa flavipes</i>
Chevalier Bargette	<i>Xenus cinereus</i>
Chevalier grivelé	<i>Actitis macularia</i>
Bécassin à long bec	<i>Limnodromus scolopaceus</i>
Bécasseau de Temminck	<i>Calidris temminckii</i>
Bécasseau de baird	<i>Calidris bairdii</i>
Bécasseau tacheté	<i>Calidris melanotos</i>
Bécasseau de Bonaparte	<i>Calidris fuscicollis</i>
Bécasseau rousset	<i>Tryngites subruficollis</i>
Bécasseau falcinelle	<i>Limicola falcinellus</i>
Phalarope à bec large	<i>Phalaropus fulicarius</i>
Phalarope à bec étroit	<i>Phalaropus lobatus</i>
Phalarope de Wilson	<i>Phalaropus tricolor</i>
Glaréole à collier	<i>Glareola pratincola</i>
Labbe à longue queue	<i>Stercorarius longicaudus</i>
Mouette blanche	<i>Pagophila eburnea</i>
Goéland pontique	<i>Larus cachinnans</i>
Goéland à ailes blanches	<i>Larus glaucoides</i>
Goéland bourgmestre	<i>Larus hyperboreus</i>
Goéland d'Audouin	<i>Ichthyæetus audouinii</i>
Goéland à bec cerclé	<i>Larus delawarensis</i>

Mouette atricille	<i>Larus atricilla</i>
Mouette de Franklin	<i>Larus pipixcan</i>
Guifette leucoptère	<i>Chlidonias leucopterus</i>
Guifette moustac	<i>Chlidonias hybridus</i>
Sterne hansel	<i>Sterna nilotica</i>
Sterne caspienne	<i>Sterna caspia</i>
Sterne de Dougall	<i>Sterna dougallii</i>
Sterne fuligineuse	<i>Sterna fuscata</i>
Sterne inca	<i>Larosterna inca</i>
Sterne voyageuse	<i>Sterna bengalensis</i>
Sterne de Forster	<i>Sterna forsteri</i>
Mergule nain	<i>Alle alle</i>
Guillemot à miroir	<i>Cephus grylle</i>
Macareux moine	<i>Fratercula arctica</i>
Coucou-geai	<i>Clamator glandarius</i>
Coulicou à bec jaune	<i>Coccyzus americanus</i>
Harfang des neiges	<i>Nyctea scandiaca</i>
Hibou petit-duc	<i>Otus scops</i>
Martinet à ventre blanc	<i>Apus melba</i>
Rollier d'Europe	<i>Coracias garrulus</i>
Alouette calandrelle	<i>Calandrella brachydactyla</i>
Alouette haussecol	<i>Eremophila alpestris</i>
Hirondelle de rochers	<i>Hirundo rupestris</i>
Hirondelle rousseline	<i>Hirundo daurica</i>
Pipit de richard	<i>Anthus richardi</i> (3)
Pipit de Godlewski	<i>Anthus godlewskii</i>
Pipit rousseline	<i>Anthus campestris</i> (1)
Pipit à gorge rousse	<i>Anthus cervinus</i>
Pipit à dos olive	<i>Anthus hodgsoni</i>
Bergeronnette citrine	<i>Motacilla citreola</i>

Bergeronnette printanière d'Italie	<i>Motacilla flava cinereocapilla</i>
Bergeronnette printanière nordique	<i>Motacilla flava thunbergi</i>
Pie-grièche grise	<i>Lanius excubitor</i>
Pie-grièche à tête rousse	<i>Lanius senator</i>
Pie-grièche à poitrine rose	<i>Lanius minor</i>
Jaseur boréal	<i>Bombycilla garrulus</i>
Cingle plongeur	<i>Cinclus cinclus</i>
Accenteur alpin	<i>Prunella collaris</i>
Robin à flancs roux	<i>Tarsiger cyanurus</i>
Tarier oriental	<i>Saxicola maurus</i>
Traquet oreillard	<i>Oenanthe hispanica</i>
Traquet du désert	<i>Oenanthe deserti</i>
Merle de roche	<i>Monticola saxatilis</i>
Grive dorée	<i>Zoothera dauma</i>
Phragmite aquatique	<i>Acrocephalus paludicola</i>
Rousserolle des buissons	<i>Acrocephalus dumetorum</i>
Rousserolle isabelle	<i>Acrocephalus agricola</i>
Rousserolle turdoïde	<i>Acrocephalus arundinaceus</i>
Hypolaïs ictérine	<i>Hippolais icterina</i>
Fauvette épervière	<i>Sylvia nisoria</i>
Fauvette passerinette	<i>Sylvia cantillans</i>
Fauvette mélanocéphale	<i>Sylvia melanocephala</i>
Pouillot ibérique	<i>Phylloscopus ibericus</i>
Pouillot à grands sourcils	<i>Phylloscopus inornatus</i>
Pouillot de pallas	<i>Phylloscopus proregulus</i>
Pouillot brun	<i>Phylloscopus fuscatus</i>
Pouillot de Hume	<i>Phylloscopus humei</i>
Pouillot de Bonelli	<i>Phylloscopus bonelli</i>
Pouillot de Sibérie	<i>Phylloscopus collybita tristis</i>
Gobemouche à collier	<i>Ficedula albicollis</i>

Gobemouche nain	<i>Ficedula parva</i>
Rémiz penduline	<i>Remiz pendulinus</i> (2)
Tichodrome échelette	<i>Tichodroma muraria</i>
Bruant ortolan	<i>Emberiza hortulana</i> (3)
Bruant fou	<i>Emberiza cia</i>
Bruant mélanocéphale	<i>Emberiza melanocephala</i>
Bruant nain	<i>Emberiza pusilla</i>
Bruant à calotte blanche	<i>Emberiza leucocephalos</i>
Bruant à couronne blanche	<i>Zonotrichia leucophrys</i>
Linotte à bec jaune	<i>Carduelis flavirostris</i>
Roselin cramoisi	<i>Carpodacus erythrinus</i>
Roselin githagine	<i>Rhodopechys githaginea</i>
Sizerin blanchâtre	<i>Carduelis hornemanni</i>
Moineau espagnol	<i>Passer hispaniolensis</i>
Etourneau roselin	<i>Sturnus roseus</i>
Etourneau unicolore	<i>Sturnus unicolor</i>
Cassenoix moucheté	<i>Nucifraga caryocatactes</i>
Crave à bec rouge	<i>Pyrrhonorax pyrrhonorax</i>
Corneille mantelée	<i>Corvus cornix</i>

Et toutes autres espèces plus rares ne figurant pas encore sur la liste des oiseaux de Normandie.

(1) sauf pour les falaises de Carolles et le cap de la Hève.

(2) sauf les départements de Seine-Maritime et Eure depuis le 1er janvier 2013.

(3) une fiche globale saisonnière pour les sites de Carolles et du cap de la Hève.

Comité d'Homologation Régional

Fiche descriptive pour l'observation d'une espèce occasionnelle en Normandie

à retourner à : Maison de l'Oiseau Migrateur, 33 bis rue de la poste 50740 Carolles

chr.normandie@gmail.com

Espèce proposée

Nom français :

Nom scientifique :

Nombre d'oiseaux :

Sexe :

Age :

Date(s) d'observation(s) :

Durée des observations :

Localité (Commune / Lieu-dit / département) :

Rédacteur de la fiche (Nom / adresse postale / courriel) :

Autres observateurs :

Qui l'a trouvé :

Qui l'a identifié :

Distance d'observation :

Matériel optique utilisé :

L'oiseau a-t-il été photographié :

Par qui :

L'oiseau a-t-il été capturé :

Par qui :

L'oiseau a-t-il été conservé :

Où :

Conditions météorologiques :

Connaissances antérieures de l'espèce :

Connaissances d'espèces voisines :

Description de l'observation et de l'oiseau (avant recours aux guides d'identification) :

indiquer les conditions dans lesquelles l'oiseau a été observé, puis établir une description détaillée de celui-ci (silhouette, coloration du plumage partie par partie, comportement, voix...).

Joindre éventuellement une copie des notes prises sur le terrain, ainsi que tout document graphique (dessin, photo...) ou sonore.

Bibliographie :

Dubois Ph.J, Le Maréchal P., Oliosio G. et Yésou P. (2008). *Nouvel inventaire des oiseaux de France*. Delachaux & Niestlé, 560 pages.

Kayser Y., Verneau A., & le CHN (2015). Les oiseaux rares en France en 2015. *Ornithos* 22-3 : 113-145.

Provost S. (2014). Un gobemouche nain *Ficedula parva* en hiver en baie du Mont-Saint-Michel (Manche). *Ornithos* 21-3, p. 162-163.

Provost S. & le CHR Normandie (2014). Les oiseaux rares en Normandie en 2013 (20^{ème} circulaire). Rapport du Comité d'Homologation Régional.

Reeber S., & le CHN (2015). Les oiseaux rares en France en 2011. *Ornithos* 18-6 : 325-367.