



Les oiseaux rares en Normandie en 2022

Rapport du Comité d'Homologation Régional

Loan DELPIT & le CHR Normandie
(Février 2024)



Photographes : Faucon kobez, L. Poulain / Moineau friquet, M. Lerenard / Cygne de Bewick, C. Gérard

Le Comité d'Homologation Régional des oiseaux rares de Normandie (CHR Normandie GONm + LPO) rappelle que son objectif est d'authentifier et de publier l'ensemble des observations d'oiseaux rares de la région pour que les bases de données utilisées pour la connaissance des espèces soient les plus propres et réalistes possible.

Depuis 2019, l'ensemble des données naturalistes est répertorié et saisi sur les portails Faune France (ou sur le site miroir équivalent de Faune Normandie) de Biovision.

Nous encourageons et incitons fortement tous les observateurs à utiliser ce portail national qui permet l'utilisation des données à une échelle régionale via les associations partenaires (GONm, LPO...), mais également à l'échelle nationale et internationale pour une meilleure connaissance et protection des espèces en France et dans le Monde.

Les fiches papiers sont toujours acceptées, mais nous incitons fortement les observateurs à saisir ces données sur Faune France/Normandie et proposons si nécessaire, avec évidemment l'accord de l'observateur, de saisir la donnée à sa place en tant que « donnée de seconde main » via le compte Faune France du CHR dédié à cela (le nom de l'observateur et/ou la donnée peuvent également être cachés si l'observateur le souhaite). Le but de cette démarche est d'utiliser au mieux ces données qui, si elles ne restent que papier (fiche) sans volonté de l'observateur de la diffuser sur Faune France, ne seront très probablement jamais valorisées.

En janvier 2023, la totalité des données soumises au CHR Normandie avant cette date a été validée, soit sur les anciennes bases locales de données du GONm et de la LPO soit sur le portail (Faune France).

Voici la liste des membres du CHR ayant exercé depuis la fusion des CHR GONm + LPO en 2019 :

Membres	2019	2020	2021	2022	2023	2024
BILLARD Martin	S	S				
CORBEAU Alexandre			S			
DELARUE Eric						
DESMARES Jocelyn						
FRODELLO Anne-Laure						
LECAPLAIN Benoit						
LEMIERE Stéphane						
MALVAUD Frédéric	S	S	S	S	S	S
MARIE Jean-Pierre						
TRIBOULIN Lionel						
VIGOUR David						
YVON Julien						
DELPIT Loan				S	S	S
GREGE Guillaume						

Nous remercions chaleureusement les membres et secrétaires qui se sont succédés afin de permettre de faire fonctionner le CHR dans de bonnes conditions et de permettre ainsi la validation des données le plus rapidement possible après l'observation.

Le CHR souhaite la bienvenue à Guillaume Grège qui arrive en remplacement de Anne-Laure Frodello ayant choisi de quitter le CHR fin 2023. Le CHR la remercie pour sa participation durant ces 5 années depuis la fusion.

- La réunion du CHR LPO & GONm qui s'est tenue le 12 janvier 2024, a permis de revoir les statuts de différentes espèces en Normandie : À compter du 1^{er} janvier 2023 l'Élanion blanc a été retiré des espèces CHR au vu de la dynamique de l'espèce dans notre région ainsi que dans les départements voisins qui laisse supposer une colonisation rapide d'une grande partie des 5 départements Normand.
- À compter du 1^{er} janvier 2024 le Cygne de Bewick, hivernant annuel depuis plusieurs années dans l'estuaire de la Seine ainsi que dans le Marais-Vernier n'est plus soumis à homologation sur ce secteur. Le secteur concerné comprend l'ensemble de l'estuaire de la Seine et du Marais-Vernier et ce jusqu'au pont de Tancarville ;
- À compter du 1^{er} janvier 2024, 2 espèces intègrent la liste du CHR suite à leur retrait de la liste du CHN : la Marouette de Baillon et l'Oie à bec court.

La liste des espèces CHR est à retrouver en fin de ce document et est toujours disponible avec les rapports annuels sur le lien (<http://www.gonm.org/index.php?post/CHR>) ou sur demande au secrétariat du CHR : chr.normandie@gmail.com

Cette liste (en fin de document) actualisée en février 2024, rassemble l'ensemble des espèces rares observées en Normandie. Pour les espèces qui sont soumises à homologation par le Comité d'Homologation National des oiseaux rares en France (CHN) ce sont les règles d'homologation propres au CHN qui font foi.

Pour toutes les autres espèces de cette liste qui sont soumises au CHR il est demandé de systématiquement y associer une description détaillée (silhouette, coloration du plumage partie par partie, comportement, voix, conditions d'observation...) et/ou de joindre, tout document graphique disponible (photos, dessins, notes de terrain...) ou sonore afin d'éliminer les autres espèces similaires. Si ce n'est pas fait, cette demande vous sera systématiquement faite par un membre du CHR.

Des règles particulières selon les espèces sont répertoriées dans cette présente liste et, à noter que pour toute première donnée régionale (hors CHN), il est demandé une photo permettant d'identifier clairement l'espèce :

- Avec l'essor grandissant des enregistrements, nous souhaitons attirer l'attention des observateurs sur les risques de cris aberrants d'espèce et/ou d'imitateurs. Nous préconisons donc un enregistrement accompagné d'une description de l'oiseau, même brève. Pour les enregistrements seuls, un minimum de **deux cris** pour un certain nombre d'espèces difficiles et aux cris monosyllabiques sont nécessaires pour une homologation certaine (cf. « règle d'homologation » par espèce de cette liste). Cela concerne : Pouillot ibérique (*Phylloscopus ibericus*), Hypolaïs icterine (*Hippolais icterina*), Gobemouche à collier (*Ficedula albicollis*), Gobemouche nain (*Ficedula parva*), Accenteur alpin (*Prunella collaris*), Pipit à gorge rousse (*Anthus cervinus*), Bruant fou (*Emberiza cia*), Bruant ortolan (*Emberiza hortulana*) et Bruant nain (*Emberiza pusilla*). Les cris sur les enregistrements étant parfois difficilement audibles, il est demandé que l'enregistrement inclut une séquence de 5 à 10 secondes avant le premier cri et après le dernier cri. De plus, il est systématiquement demandé l'enregistrement, le sonagramme peut-être un plus mais le sonagramme seul n'est pas suffisant. Ces règles sont calquées sur les demandes du CHN.
- Les règles d'identification du Pouillot de Sibérie (*phylloscopus collybita tristis*) ne changent pas. Ainsi, un enregistrement seul ne suffit pas, il faut en supplément une

description rigoureuse de l'oiseau. Cependant des photos de très bonne qualité peuvent suffire si l'ensemble des critères diagnostiques sont bien visibles.

- Concernant le Bruant ortolan, l'essor des suivis de la migration nocturne entraîne une augmentation du nombre de données pour cette espèce. Il convient toutefois d'être prudent, cette espèce pouvant être difficile à identifier. Ainsi le CHR a choisi de se fier à la bibliographie existante à ce sujet. Les critères retenus pour la validation des données de cette espèce en migration nocturne sont détaillés dans la partie dédiée à cette espèce.
- Rémiz penduline (*Remiz pendulinus*) : Sauf les départements de Seine-Maritime (76) et Eure (27) depuis le 1er janvier 2013.
- Moineau friquet (*Passer montanus*) : Sauf colonie de Pontorson et sites de nidifications connues
- Phragmite aquatique (*Acrocephalus paludicola*) : Uniquement les données hors capture/baguage
- Pipit rousseline (*Anthus campestris*) : Sauf pour les falaises de Carolles et le cap de la Hève.

Enfin, nous rappelons que les espèces suivantes sont parfois « oubliées » par les observateurs lors de la transmission des données et qu'une description (ou documents graphiques ou sonores) est nécessaire : Cygne chanteur, Bernache du Pacifique, Macareux moine, Phalarope à bec large, Moineau friquet...

Merci d'y penser !

Liste des espèces rares observées en 2022

Bernache cravant du Pacifique - *Branta bernicla nigricans* (Lawrence, 1846)

- 1 individu le 07 janvier à Saint-Vaast-la-Hougue/50 (R. Purenne). L'espèce est régulièrement observée dans ce secteur du Cotentin ;
- 1 individu du 09 au 26 janvier à Heugueville-sur-Sienne/50 (E. Lacolley & M. Leroux) ;
- 1 individu au havre de la Vanlée à Lingreville/50 et Bréhal/50 les 23 et 24 février (E. Lacolley, R. Coulomb, A. Livory & M. Leroux) ;
- 1 individu le 04 mars à Réville/50 (F. Malvaud) ;
- 1 individu à Aumeville-Lestre/50 le 08 novembre (J. Desmares) ;
- 1 individu le 14 novembre à Brévand/50 (J. Desmares).

Espèce annuelle en Normandie depuis 2008.



Bernache cravant du pacifique au havre de la Vanlée – M. Leroux

Oie de la toundra - *Anser serrirostris rossicus* (Buturlin, 1933)

- 2 individus le 05 février à Saint-Samson/14 (M. Deflandre & A. Blondel)

Seulement 2 individus observés en 2022 après les 9 individus notés en 2021. Retour à la « normale » pour le nombre d'individu observé en 2022.

Entrée récente de l'espèce au CHR suite à un nombre d'observations significativement décroissant.

Cygne de Bewick - *Cygnus columbianus* (Ord, 1815)

- 2 individus du 06 au 31 janvier au Marais-Vernier/27 (F. Prévost & G. Ranvier) ;
- 1 individu le 14 février à Sainte-Opportune-la-Mare/27 (F. Prévost) ;
- 5 individus le 28 octobre à Sainte-Opportune-la-Mare/27 (F. Prévost) ;
- 10 individus adultes entre le Marais-Vernier/27, Tancarville/76 et Quillebeuf-sur-Seine/27 du 14 au 30 décembre au moins (F. Prévost) ;
- Jusqu'à 10 individus, 5 adultes et 5 immatures à Val-de-Reuil/27 du 15 au 30 décembre au moins (L. Poulain et al.).

L'hiver 2022/2023 restera exceptionnel pour cette espèce dans la vallée de la Seine avec un minimum de 20 individus observés entre le Marais-Vernier et Val-de-Reuil. L'espèce est désormais annuelle dans l'estuaire de Seine et notamment au Marais-Vernier.



Cygnés de Bewick à Val-de-Reuil – D. Basley

Cygne chanteur - *Cygnus cygnus* (Linnaeus, 1758)

- 2 individus à Picauville/50 le 4 janvier (J. Desmares) ;
- 1 individu à Houtteville/50 le 12 janvier (J. Desmares) ;
- 1 individu en vol à Quiberville/76 puis posé à Saint-Aubin-sur-Mer/76 le 04 février (T. Domalain) ;
- 1 individu à Carquebut/50 du 06 au 14 mars (N. Fillol et al.) ;
- 1 individu à Flottemanville/50 le 26 mars (A. Barrier & J.M Joly) ;
- 2 individus en vol à Sées/61 le 10 avril (A. Decan) ;
- 1 individu à Beauvoir/50 du 18 novembre à la fin d'année (S. Provost et al.).

Nombreuses observations durant l'année 2022, principalement en ex Basse-Normandie. Notons l'absence d'observation dans la vallée de la Seine où l'espèce y est pourtant régulière.

Fuligule à bec cerclé - *Aythya collaris* (Donovan, 1809)

- Un individu de deuxième année du 9 au 16 janvier à Saint-Germain-d'Étables/76 (S. Vasseur). Cet individu présent depuis novembre 2021 a ainsi poursuivi son hivernage ;
- 1 femelle le 10 novembre à Anneville-Ambourville/76 (B. Magontier).

Espèce occasionnelle en Normandie mais les étangs de la vallée de la Varenne ont été fréquentés 2 hivers de suite après un mâle adulte en 2020.

La boucle d'Anneville-Ambourville a également déjà été fréquentée par cette espèce dans le passé.

Fuligule nyroca - *Aythya nyroca* (Güldenstädt, 1770)

- 1 individu à Val-de-Reuil/27 du 01 au 30 janvier (C. Gérard et al.) ;
- 1 individu à Gorges/50 le 14 janvier (B. Chevalier) ;
- 3 individus à Val-de-Reuil/27 le 16 avril (F. Grillot & J.S Lesaffre) ;
- 1 individu à Saint-Germain-d'Étables/76 le 13 septembre (S. Vasseur & T. Domalain).

Au moins 5 individus en 2022 soit 3 de plus qu'en 2021. Tous les individus observés étaient des mâles adultes.

Harelde boréale - *Clangula hyemalis* (Linnaeus, 1758)

- Un individu de type femelle observé le 4 novembre depuis la pointe du Roc à Granville durant un guet à la mer (C. Rivière).

Cette donnée constitue l'unique observation de cette espèce en 2022, très loin de l'année record de 2017 ayant compté 25 données.

Érismature rousse - *Oxyura jamaicensis* (J.F. Gmelin, 1789)

- Un mâle adulte du 17 au 30 mars à Val-de-Reuil/27 (C. Gérard) ;
- 2 mâles adultes du 14 au 18 juillet à Val-de-Reuil/27 (C. Gérard) ;

2 données en 2022, toutes au même endroit, dans un lieu classique pour l'espèce en Normandie.



Érismature rousse, mâle adulte à Val-de-Reuil – Christian Gérard

Martinet pâle – *Apus pallidus* (Shelley, 1870)

- 1 individu le 19 octobre à Auderville/50 (O. Zuchet) ;
- 1 individu le 23 octobre à Granville/50 (C. Rivière) ;
- 1 individu le 29 octobre à Auderville/50 (B. Perraud & S. Vasseur). Unique individu formellement identifié au sein d'un groupe de 7 martinets, possiblement tous des pâles ;
- 1 individu le 29 octobre à Genêts/50 (T. Bazatolle) ;
- 1 individu le 29 octobre à Carolles/50 (C. Rivière & S. Normant) ;
- 1 individu le 29 octobre à Cherbourg-Octeville/50 (D. Aubert) ;
- 1 individu le 30 octobre à Auderville/50 (B. Perraud) ;
- 1 individu le 30 octobre à Cherbourg-Octeville/50 (D. Aubert) ;
- 1 individu le 31 octobre à Carolles/50 (S. Provost, C. Rivière & G ; Bruneau).

Année record pour l'espèce en Normandie avec un minimum de 9 individus dont 4 sur la journée du 29 octobre. Ces données s'inscrivent dans le cadre d'un afflux sans précédent pour l'espèce en Europe de l'Ouest durant le mois d'octobre.



Martinet pâle à Carolles – Corentin Rivière

Coucou geai – *Clamator glandarius* (Linnaeus, 1758)

- 1 individu de 1^{er} été du 21 au 23 avril entre Montmartin-sur-Mer/50 et Régneville-sur-Mer/50 (B. Chevalier).

Espèce occasionnelle en Normandie, cet individu aura stationné au moins 3 jours sur la côte est de la Manche.



Coucou geai à Montmartin-sur-Mer – Maude Lerenard

Râle des genêts – *Crex crex* (Linnaeus, 1758)

- 1 individu le 10 juin à Saint-Vigor-d'Ymonville/76 (T. Domalain) ;
- 1 individu le 15 juin à Anneville-Ambourville/76 (C. Goujon).

Espèce nicheuse en très fort déclin en Normandie et en France. Deux mâles chanteurs contactés en 2022 en Seine-Maritime. Si l'estuaire de la Seine constitue probablement l'une des dernières zones où l'espèce peut être entendue annuellement, la donnée de la boucle d'Anneville-Ambourville est plus surprenante, bien que l'espèce ait fréquenté cette zone avant les années 2000.

Guignard d'Eurasie - *Charadrius morinellus* (Linnaeus, 1758)

- 1 individu le 11 septembre à Carolles/50 (S. Provost & P. Gachet) ;
- 1 individu le 11 septembre à Hauteville-sur-Mer/50 (M. Billard).

Lieux et dates classiques pour l'espèce. Notons que la donnée de Hauteville-sur-Mer concerne un individu enregistré en migration nocturne.

Bécasseau de Temminck - *Calidris temminckii* (Leisler, 1812)

- 6 individus le 27 avril à La Cerlangue/76 (T. Domalain) ;
- 1 individu le 27 avril à Sainte-Opportune-la-Mare/27 (F. Prévost) ;
- 1 individu le 06 mai à Anneville-Ambourville/76 (C. Goujon) ;
- 1 individu le 13 mai à Falaise/14 (J. Jean-Baptiste) ;
- 1 individu les 14 et 15 mai à Réthoville/50 (L. Delpit & A. Verneau) ;
- 1 individu les 24 et 25 août à Merville-Franceville-Plage/14 (J. Girard) ;
- 1 individu le 28 septembre à Merville-Franceville-Plage/14 (J. Girard).

En dehors de 2018, espèce annuelle en Normandie depuis 2006. Les dates et lieux d'observations en 2022 sont classiques pour l'espèce.

Bécasseau tacheté – *Calidris melanotos* (Vieillot, 1819)

- 1 individu du 27 au 31 août à Geffosses/50 (H. Leclerc et al.)

3^e année de présence consécutive en Normandie et 2^e année consécutive au même endroit.

Phalarope à bec étroit – *Phalaropus lobatus* (Linnaeus, 1758)

- 1 individu en plumage nuptial le 01 mai à Cosqueville/50 (J. Jean-Baptiste et al.)
- 1 individu le 25 septembre à Colleville-Montgomery/14 (J-P Marie)
- 1 individu du 06 au 09 octobre à Pontorson/50 (C. Rivière)

Avec 3 individus, l'année 2022 constitue une bonne année pour l'espèce en Normandie. On notera une donnée peu banale d'un individu en plumage nuptial.

Phalarope à bec large - *Phalaropus fulicarius* (Linnaeus, 1758)

- 1 individu le 10 janvier à Sainte-Marie-du-Mont/50 (G. Vimard)
- 1 individu du 05 au 08 octobre à Igoville/27 (L. Varinard et al.)
- 1 individu du 09 au 16 novembre à Saint-Pierre-du-Jonquet/14 (FDC 14)
- 1 individu le 11 novembre à Saint-Germain-des-Vaux/50 (L. Delpit & A. Verneau)
- 1 individu du 23 au 28 novembre à Bréhal/50 (S. Provost et al.)
- 1 à 2 individus du 26 au 28 novembre à Ouistreham/14 (J. Girard et J-P. Clave)

Notons 2 observations à l'intérieur des terres dont 1 pour le département de l'Eure. Après 2 très bonnes années pour l'espèce en Normandie (14 puis 12 individus), avec 7 individus, l'année 2023 se situe dans la moyenne pour cette espèce.



Phalarope à bec large à Igoville – D. Basley

Sterne hansel - *Gelochelidon nilotica* (Gmelin, 1789)

- 1 individu du 08 au 13 mai à Cosqueville/50 (A. Verneau)
- 2 individus le 14 mai à Saint-Jouin-Bruneval/76 (T. Domalain & L. Hue)
- 1 individu du 03 au 04 août à Champeaux/50 (M. Leroux)
- 3 individus les 12 et 13 août à Bavent/14 (M. Billard et al.)
- 2 individus le 14 août à Bénouville/14 (T. Cheyrezy)

Après un retour de l'espèce en Normandie en 2021 (après 3 années d'absence), 2022 est une année record pour l'espèce avec pas moins de 9 individus aussi bien au passage pré-nuptial que post-nuptial.



*Sterne hansel à Champeaux, individu se nourrissant de grenouilles sur une mare –
Michel Leroux*

Sterne caspienne - *Hydroprogne caspia* (Pallas, 1770)

- 2 individus le 21 avril à Gonfreville-l'Orcher/76 (O. Benoist)
- 2 individus le 26 avril observés en guet à la mer à Colleville-Montgomery/14 et Oustreham/14 (J-P. Marie) et observés posés 1 heure plus tard à Sallenelles/14 (J. Jean-Baptiste)
- 1 individu le 02 mai à Criel-sur-Mer/76 (T. Domalain)
- 1 individu les 29 et 30 mai à Gonfreville-l'Orcher/76 (O. Benoist)
- 1 individu le 10 août à Oustreham/14 (J. Girard)
- 1 individu le 04 septembre à Val-de-Reuil/27 (C. Gérard)
- 1 individu le 05 septembre à Sallenelles/14 (P. Poiré, B. Morcel & F. Prévost)
- 2 individus le 11 septembre à Sallenelles/14 (A. Coste)
- 1 individu capté en migration nocturne le 14 septembre à Feuguerolles-Bully/14 (M. Billard)
- 4 à 5 individus le 15 septembre à Val-de-Reuil/27 (C. Chartier & C. Gérard)

Espèce rare mais annuelle en Normandie. Avec un minimum de 17 individus, l'année 2022 est une très bonne année pour l'espèce en Normandie. La baie d'Orne et l'estuaire de Seine sont les sites fournissant le plus de données pour cette espèce ces dernières années.



Localisation des observations de Sterne caspienne en 2022 – source Faune-France

Guifette moustac - *Chlidonias hybrida* (Pallas, 1811)

- 2 individus le 12 avril à Heurteauville/76 (L. Triboulin)
- 1 individu le 15 mai à Pontorson/50 (F. Letellier)
- 4 individus le 15 mai à Val-de-Reuil/27 (C. Gérard)
- 2 individus le 16 mai à Sandouville/76 (T. Domalain)
- 2 individus le 18 mai à Val-de-Reuil/27 (C. Gérard & D. Basley)
- 1 individu le 23 mai à Val-de-Reuil/27 (C. Chartier)

Espèce rare mais régulière en Normandie.

Guifette leucoptère – *Chlidonias leucopterus* (Temminck, 1815)

- 1 individu de 1^{ère} année du 09 au 12 septembre à Bréhal/50 (M. Billard)

Espèce très rare en Normandie et d'apparition irrégulière. Cet individu aura pu se laisser admirer par plusieurs observateurs durant ces 4 jours de présence.

Labbe à longue queue - *Stercorarius longicaudus* (Vieillot, 1819)

- Plusieurs observations comptant à chaque fois un seul individu à Gatteville-le-Phare/50 lors de séances de guet à la mer le 16 septembre (J-P. Marie & al.), le 17 septembre (S. Bost & C. Rivière), le 18 septembre (S. Bost) et le 28 septembre (B. Duchenne)
- 1 individu posé le 25 septembre à Cosqueville/50 (A. Jenecourt & M. Romet)
- 1 individu le 25 septembre à Colleville-Montgomery/14 (J-P. Marie)

Bonne année pour l'espèce désormais annuelle en Normandie. Notons surtout une observation peu courante d'un individu posé en bordure d'une mare côtière ! En effet cette espèce pélagique est rarement observée posée sur la côte.



Labbe à longue queue posé à Cosqueville – Martin Romet

Mergule nain - *Alle alle* (Linnaeus, 1758)

- 1 individu trouvé dans un jardin le 24 novembre à La Haye-d'Ectot/50 (anonyme via B. Burnouf & J. Jean-Baptiste)

Espèce observée chaque année depuis 2014. Toutefois avec 1 seul individu l'année 2022 se situe loin derrière 2021 (7 individus). Cet individu affaibli s'est probablement réfugié dans un jardin suite à une tempête.

Macareux moine - *Fratercula arctica* (Linnaeus, 1758)

- 1 individu échoué le 17 janvier à Biville/50 (C. Canonne)
- 20 individus le 20 janvier à Heuqueville/76 (A. Larousse)
- 1 individu échoué le 20 février à Portbail/50 (E. Richard via J. Rivière)
- 5 individus le 18 octobre à Saint-Germain-des-Vaux/50 (S. Poncet & N. Bunel)

Espèce régulièrement rencontrée en guet à la mer (ou seawatch). En 2022 les tempêtes hivernales ont fait s'échouer au moins 2 individus sur les plages normandes.

Océanite culblanc - *Oceanodroma leucorhoa* (Vieillot, 1818)

- 1 individu le 09 septembre au large du Mont-Saint-Michel/50 (P. Desgué)
- 1 individu survole les observateurs le 04 novembre à Ouistreham/14 (J-P. Marie, J-P. Moulin & N. Bunel)
- 1 individu le 07 novembre à Saint-Pierre-Lès-Elbeuf/27 (A. Larousse)
- 3 individus le 30 novembre au large de Montfarville/50 (T. Domalain & W. Lefrançois)

Océanite toujours rare, mais observée annuellement depuis 2016. Notons en 2022 une observation surprenante d'un individu en pleine zone industrielle aux abords de Rouen suite à une tempête !

Puffin majeur – *Ardenna gravis* (O'Reilly, 1818)

- 1 individu le 9 septembre au large de Granville/50 (M. Billard et al.)
- 1 individu le 17 septembre à Gatteville-le-Phare/50 (A. Lebrun)
- 2 individus le 21 octobre à Carolles/50 (S. Provost)

L'année 2022 constitue une année mémorable pour l'espèce en Normandie suite à des stationnements d'effectifs records dans l'atlantique nord.



Puffin majeur au large de Granville/50 – Bernard Le Ricque

Blongios nain - *Ixobrychus minutus* (Linnaeus, 1766)

- 1 chanteur les 22 mai et 1^{er} juin à Val-de-Reuil/27 (C. Gérard)
- 2 mâles adultes le 10 juin à Val-de-Reuil/27 (C. Gérard)
- 1 individu de 1^{ère} année le 09 août à Val-de-Reuil (C. Perrier & D. Basley)

Contrairement à l'année 2021, toutes les données saisies en 2022 proviennent du secteur de Val-de-Reuil/27.

Crabier chevelu – *Ardeola ralloides* (Scopoli, 1769)

- 1 individu le 25 juin à Sainte-Opportune-la-Mare/27 (F. Prévost)
- 1 individu le 26 juin à Val-de-Reuil/27 (C. Gérard & A. Qaegebeur)

2^e année consécutive où l'espèce est observée en Normandie.

Elanion blanc - *Elanus caeruleus* (Desfontaines, 1789)

- 1 à 2 individus du 05 janvier au 12 avril entre le Marais Vernier et Bouquelon/27 (F. Prévost et al.)
- 1 individu le 14 janvier à Montmartin-en-Graignes/50 (J-M. Savigny)
- 1 individu du 22 février au 12 avril à Tosny/27 (Q. Trevel et al.)
- 1 individu le 20 mars à Tracy-sur-Mer/14 F. Leclerc)
- 1 individu le 10 avril à Criquebeuf-sur-Seine/27 (A-L. Frodello)
- 1 individu le 18 avril à Sainte-Croix-sur-Aizier/27 (J. Avenel)
- 1 individu le 04 août à Sallen/14 (B. Le Ricque)
- 1 individu le 19 août à Les Veys/50 (J. Girard)
- 1 individu le 22 septembre à Saint-Vaast-d'Équieville/76 (L. Delpit)
- 1 individu le 12 octobre à Saint-Marcouf/50 (J. Courtin)
- 1 individu le 30 octobre au 03 novembre à Criqueville-en-Bessin/14 (G. Vimard)
- 1 individu le 31 octobre à Friardel/14 (C. Oursel)
- 1 individu le 04 décembre à Brucheville/50 (M. Billard) et 1 autre individu à Sainte-Mère-Église/50 (J-M. Joly)
- 1 individu le 14 décembre à Montmerrei/61 (J. Crocis)
- 1 à 2 individus du 24 au 31 décembre à Beuzeville/27 (P. Guillaumeau et al.)
- 1 individu le 27 décembre à Saint-Vigor-d'Ymonville/76 (E. Alleaume)

Après une année 2021 déjà exceptionnelle, l'espèce poursuit sa progression dans notre région. Toutefois, aucune nidification réussie n'a pour le moment été constatée.

Les premières nidifications réussies seront observées en 2023 dans au moins 3 des 5 départements c'est pourquoi cette espèce a été retiré de la liste des espèces soumises à homologation en Normandie à compter du 01 janvier 2023.



Élanion blanc à Tosny/27– Loïc Poulain

Vautour fauve - *Gyps fulvus* (Habliz, 1783)

- 1 individu le 27 juillet à Essay/61 (D. Lechat). Cet individu fréquentait un centre d'enfouissement de déchets.

Comme en 2021, un seul individu a été observé contrairement aux années précédentes où l'espèce était principalement observée en fin de printemps.

Vautour moine - *Aegypius monachus* (Linné 1766)

- 2 individus le 11 mai à Marchainville/61 (K. Pitwon).

Observation remarquable de 2 individus pour cette espèce très rare en Normandie. Date classique de la période de dispersion des vautours.



Vautour moine à Marchainville/61 – Karl Pitwon

Circaète Jean-le-Blanc - *Circaetus gallicus* (J.F. Gmelin, 1788)

- 1 individu le 14 avril à Sandouville/14 (A. Delarue)
- 1 individu du 17 au 21 juillet à La Cerlangue/76 (O. Benoist)
- 1 individu le 26 juillet à Saint-Vigor-d'Ymonville/76 (T. Domalain)
- 1 individu les 09 et 10 août à Montmartin-en-Graignes/50 (M. Mariné)
- 1 individu le 13 août à Beaumont-le-Roger/27 (O. Douard)
- 1 individu le 28 août à Saint-Vigor-d'Ymonville/76 (D. Tessier)
- 1 individu le 18 septembre à Sainte-Opportune-la-Mare/27 (S. Vasseur & C. Goujon)

Après l'année 2020 record (4 individus) et une bonne année 2021, l'année 2022 constitue un nouveau record avec un minimum de 5 individus observés dans notre région.



Localisation des observations de Circaète en 2022 – source Faune-France

Busard pâle – *Circus macrourus* (S.G. Gmelin, 1770)

- 1 individu le 24 septembre à Colombières/14 (B. Le Ricque)
- 1 individu le 30 septembre à Genêt/50 (M. Lerenard)
- 1 individu le 01 novembre à Le Marais-la-Chapelle/14 (C. Wilkins)

Après 1 seule observation en 2021 (unique donnée depuis 2019), l'année 2022 constitue une très bonne année pour l'espèce en Normandie avec 3 individus observés, tous de première année.



Busard pâle à Colombières/14 – Bernard Le Ricque

Pygargue à queue blanche – *haliaeetus albicilla* (Linnaeus, 1758)

- 1 individu adulte le 27 juin à Lonlay-l'Abbaye/61 (C. Grirard & J. Crocis)
- 1 individu de 1^{ère} année du 11 au 31 décembre au moins à Saint-Samson/14 (D. Desvaux et al)

Deuxième année consécutive d'observation de l'espèce dans notre région. Observation peu commune d'un individu en début d'été et de nouveau un individu hivernant dans les marais de la Dives après l'hivernage de 2018.

Buse pattue - *Buteo lagopus* (Pontoppidan, 1763)

- 1 individu le 12 février à Landes-sur-Ajoncs/14 (O. Zucchet)

Deuxième année consécutive de présence de l'espèce en Normandie suite aux 2 observations de 2021.

Grand-duc d'Europe – *Bubo bubo* (Linnaeus, 1758)

Malgré la première nidification régionale de l'espèce en 2021, aucune observation en 2022 hormis un individu échappé à Vernon/27 récupéré après plusieurs jours par son propriétaire.

Pic cendré - *Picus canus* (J. F. Gmelin, 1788)

Une donnée, dans l'Orne en avril, où se concentrent les derniers bastions de l'espèce en Normandie. Le pic cendré a fait son entrée au CHR en 2019 suite à son déclin continu en Normandie depuis plusieurs décennies. L'espèce ne niche plus désormais que dans quelques forêts du Perche Ornais et notamment en forêt domaniale de Bellême.

Faucon kobez - *Falco vespertinus* (Linnaeus, 1766)

- 1 individu en migration active le 17 août au cap de la Hève à Sainte-Adresse/76 (L. Le Comte)
- 1 individu le 19 août à Neuilly-la-Forêt/14 (J. Girard)
- 1 individu du 01 au 08 septembre entre Glatigny et Surville/50 (H. Elleron)

Après une année 2021 sans observation de l'espèce, 3 individus observés en 2022, tous des individus de 1^{ère} année en migration postnuptiale.



Faucon kobez à Glatigny/50 – Frédéric Malvaud

Pie-grièche grise - *Lanius excubitor* (Linnaeus, 1758)

- 1 individu le 24 janvier à Bonneville-sur-Touques/14 (T. Le Huu Nghia)
- 1 individu le 04 février à La Lande-de-Goulth/61 (L. Six-Dugardin)

Espèce de plus en plus rare en Normandie mais toujours annuelle.

Pie-grièche à tête rousse - *Lanius senator* (Linnaeus, 1758)

- 1 individu le 03 mai à Eu/76 (S. Vincent)

Deuxième année successive de présence de l'espèce en Normandie.

Crave à bec rouge - *Pyrhocorax pyrrhocorax* (Linnaeus, 1758)

- 1 individu le 17 janvier à Jobourg/50 (F. Malvaud)

Une seule donnée en 2022 contre 3 en 2021. Celle-ci est par ailleurs toujours localisée dans la Manche probablement en lien avec la réussite du programme de réintroduction de Jersey.

Rémiz penduline – *Remiz pendulinus* (Linnaeus, 1758)

- 1 individu du 14 au 22 janvier à Sainte-Marie-du-Mont/50 (PNR & E. Potet)
- 1 individu le 27 décembre à Sallenelles/14 (N. Marmet & C. Panisse)

Au moins 2 individus en 2022, deuxième année consécutive de présence de l'espèce en Normandie. Rappelons que l'espèce est uniquement soumise à homologation dans les 3 départements de l'ancienne Basse-Normandie.

Alouette haussecol - *Eremophila alpestris* (Linnaeus, 1758)

- 1 individu du 14 janvier au 20 mars à Réthoville/50 (A. Verneau & M. Billard)
- 3 individus le 8 février à Bricqueville-sur-Mer (M. Lerenard)
- 1 individu le 02 novembre en migration à Cherbourg-en-Cotentin/50 (D. Aubert)
- 1 individu le 02 novembre à Auderville/50 (M. Naepels)
- 5 individus en migration le 11 novembre à la Poterie-cap-d'Antifer/76 (L. Ernis & F. Prevost)
- 1 individu le 30 décembre à Agon-Coutainville/50 (D. Beliarde)

Espèce régulière en Normandie, souvent en petites bandes sur le littoral. Elles sont parfois en compagnie d'autres espèces ; Bruant des neiges, Alouette des champs, etc....

Hirondelle rousseline - *Cecropis daurica* (Laxmann, 1769)

- 1 individu le 11 mai à Granville/50 (Association AVRIL)

Date classique pour l'observation de cette espèce au nord de son aire de répartition. Elle reste d'apparition irrégulière en Normandie.

Pouillot de Bonelli – *Phylloscopus bonelli* (Vieillot, 1819)

- 1 individu chanteur le 02 mai à Eu/76 (T. Domalain)
- 1 individu le 02 juillet à Canapville/61 (G. & S. Béteille & T. Bazatolle)

Espèce devenant régulière dans le sud de la région où elle pourrait bénéficier, à l'avenir, du réchauffement climatique. Si la donnée de début mai en Seine-Maritime correspond probablement à un individu migrateur, la donnée du 02 juillet pourrait correspondre à une nidification (ou tentative) locale.

Pouillot à grands sourcils - *Phylloscopus inornatus* (Blyth, 1842)

- 1 individu le 23 septembre à Carolles/50 (S. Provost)
- 1 (ou peut-être 2 ?) individus les 10 et 11 octobre à Gatteville-le-Phare/50 (L. Sallé)
- 1 individu le 12 octobre à Cherbourg-Octeville/50 (D. Aubert)
- 1 individu le 23 octobre à Beauvoir/50 (M. Lerenard)
- 1 individu le 24 octobre à Agon-Coutainville/50 (C. Lemoine)
- 1 individu le 31 octobre à Digulleville/50 (L. Delpit)
- 1 individu les 31 octobre et 01 novembre à Saint-Germain-des-Vaux/50 (B. Perraud, S. & D. Vasseur & M. Guillaume)
- 1 individu le 03 novembre à Saint-Vigor-d'Ymonville/76 (C. Goujon)

Date et lieu classique pour l'espèce avec uniquement des localités côtières. L'année 2022, contrairement à 2021, fournit de nombreuses données, à l'image du passage notable durant cet automne en France.



Pouillot à grands sourcils à Beauvoir – Maude Lerenard

Etourneau unicolore – *Sturnus unicolor* (Temminck, 1820)

- Un individu adulte observé le 12 novembre à Auderville/50 (W. Duvernoy) en compagnie d'Etourneaux sansonnets.

Une donnée en 2022 pour cette espèce très rare en Normandie mais déjà observée à cet endroit par le passé.



Etourneau unicolore à Auderville – William Duvernoy

Cinacle plongeur – *Cinclus cinclus* (Linnaeus, 1758)

- L'individu découvert en novembre 2021 au Havre/76 a effectué un hivernage complet jusqu'au 03 mars 2022 (E. Alleaume).

Remarquable hivernage de cette espèce dans un parc périurbain. La seule donnée homologuée pour l'espèce remontait à 2002 déjà en Seine-Maritime.



Cinacle plongeur au parc de Rouelles – Olivier Benoist

Moineau friquet - *Passer montanus* (Linnaeus, 1758)

- 1 individu le 10 avril à Longueville/50 (V. Labiche)
- 3 individus le 21 avril à Sainte-Adresse/76 (Q. Giquel)
- 1 individu le 24 avril à Mantilly/61 (C. Girard)
- 1 individu le 19 mai à Le Fresne-Poret/50 (P. Louvet)
- 1 individu le 22 mai à la Cerlangue/76 (X. Vergon)

5 données homologuées pour cette espèce en 2022 en dehors des bastions connus de l'espèce dans l'Orne et dans la Manche.



Moineau friquet à Pontorson - Maude Lerenard

Accenteur alpin - *Prunella collaris* (Scopoli, 1769)

- 1 individu du 03 au 29 décembre au Mont-Saint-Michel/50 (S. Provost, M. Lerenard & T. Lerenard)

Remarquable observation d'un individu en hivernage dans les ruelles du Mont-Saint-Michel. Espèce déjà hivernante à cet endroit en 2019.



Accenteur alpin au Mont-Saint-Michel - Thomas Lerenard

Bergeronnette printanière nordique – *Motacilla flava thunbergi* (Billeberg, 1829)

- 1 individu le 30 avril à Poses/27 (C. Gérard)
- 1 individu le 23 août à Eu/76 (V. Poirier)

Cette sous-espèce nordique de la Bergeronnette printanière est rare en Normandie, observée principalement durant les passages migratoires au sein des groupes de Bergeronnette printanière.



Bergeronnette printanière nordique à Poses – Christian Gérard

Pipit de Richard - *Anthus richardi* (Vieillot, 1818)

- 1 individu le 02 octobre à Vains/50 (S. Provost)
- 2 individus le 09 octobre à Saint-Jouin-Bruneval/76 (B. Perraud et al.)
- 1 individu le 12 octobre à Carolles/50 (S. Provost)
- 1 individu le 13 novembre à Carolles/50 (S. Provost)

Uniquement des données en migration cette année pour cette espèce annuelle dont l'hivernage est de plus en plus régulier. La baie du Mont-Saint-Michel s'impose une fois de plus comme le site où l'espèce est la plus régulière en Normandie, au moins en migration.

Pipit rousseline - *Anthus campestris* (Linnaeus, 1758)

Contrairement à 2021 où l'espèce avait été contactée sur plusieurs sites durant le passage postnuptial, seules 2 données en 2022 provenant du site de migration de Carolles. L'espèce n'est pas soumise à homologation sur ce site où elle est annuelle.

Pipit à gorge rousse – *Anthus cervinus* (Pallas, 1811)

- 1 individu du 10 au 19 novembre à Réthoville/50 (A. Verneau)

Une donnée en 2022, sur un site où l'espèce était attendue. Notons toutefois, la date relativement tardive pour cette espèce.

Bruant ortolan - *Emberiza hortulana* Linnaeus, 1758

- Un minimum d'environ 15 individus contactés en migration nocturne entre le 22 août et le 22 septembre à Feuguerolles-Bully/14 (M. Billard)
- 1 individu le 30 août à Vains/50 (S. Provost)
- 1 individu en migration nocturne le 31 août à Saint-Quentin-sur-le-Homme/50 (M. Lerenard)
- 1 individu le 05 septembre à Genêts/50 (S. Provost)
- 1 individu le 21 septembre à Carolles/50 (S. Provost)

Espèce rare en Normandie, le développement du suivi de la migration nocturne permet d'augmenter de manière considérable le nombre d'oiseaux détectés chaque année.

Suite au développement des suivis de la migration nocturne et de la difficulté d'identification et de la diversité des cris du Bruant ortolan en migration, le CHR rappelle qu'il demande systématiquement les éléments suivants pour statuer sur une donnée :

- L'observateur doit décrire précisément le ou les types de cris concernés ;
- Joindre l'enregistrement et si possible le sonagramme (pas le sonagramme seul).

La validation se base ensuite sur une étude récente des cris du Bruant ortolan en migration nocturne développée par Magnus Robb (<https://soundapproach.co.uk/species/ortolan-bunting/>). Ainsi une donnée pourra être validée si :

- Elle concerne un seul cri de type « Plik » considérant que les cris de ce type permettent d'identifier un ortolan avec un risque d'erreur limité ;
- Elle concerne au moins 2 cris et si possible de 2 types différents.

Les données comprenant un cri unique (hors type « Plik ») ou un seul type de cri sont à considérer avec prudence du fait du risque de confusion non négligeable avec des espèces communes en migration nocturne comme le précise bien Magnus Robb et collaborateurs, 2023 (<https://soundapproach.co.uk/species/ortolan-bunting/>)

Rappel de la taxonomie des sizerins

La taxonomie des sizerins est complexe, et évolue régulièrement. Ainsi, le CHR souhaite faire un rappel des différentes espèces et des évolutions récentes à leurs sujets. Autrefois considéré comme une seule espèce, les connaissances acquises ces dernières années ont permis de faire évoluer certaines listes taxonomiques dont celle reconnue par la Commission de l'Avifaune Française (CAF) et utilisée sur le portail Faune-France.

Ainsi, trois espèces de sizerins sont désormais reconnues en France et peuvent être observées :

- Le Sizerin cabaret (*Acanthis cabaret*), nicheur en Europe de l'ouest (dont la France), régulièrement observable en Normandie en automne/hiver ;
- Le Sizerin flammé (*Acanthis flammea*), divisé en plusieurs sous-espèces, nichant de la Scandinavie à la Sibérie orientale en passant par l'Islande et le Canada, parfois observé en France dont la présence est soumise à des afflux ;
- Le Sizerin blanchâtre (*Acanthis hornemanni*), nichant en extrême nord de la Scandinavie et de la Russie et rarissime en Europe occidentale.

Le Sizerin flammé est soumis à homologation régionale (CHR) et le Sizerin blanchâtre à homologation nationale (CHN).

Les critères d'identification de ces espèces sont particulièrement délicats, notamment entre les Sizerins cabaret et flammé. L'identification doit être réalisée après une bonne observation et reposant si possible sur des photos et des enregistrements des individus

observés. À défaut, nous invitons les observateurs à saisir leurs données sous le complexe « Sizerin flammé / cabaret ».

Toute donnée de Sizerin flammé non suffisamment détaillée fera l'objet d'une demande de compléments par le CHR. Le CHR étudiera également les données saisies dans le complexe afin d'orienter les observateurs vers l'une ou l'autre des espèces en cas de donnée avec photos.

Données refusées par le CHR

- **Erismature rousse** : du 15 au 18 septembre – Val-de-Reuil/27 - Absence de description
- **Martinet pâle** : 29 octobre – La Poterie-Cap-d'Antifer/76 - Absence de description
- **Martinet pâle** : 31 octobre – Réthoville/50 - Absence de description
- **Flamant rose** : 8 décembre – Genêts – il s'agissait d'un Flamant du chili échappé de captivité
- **Guignard d'Eurasie** : 28 août - La Poterie-Cap-d'Antifer/76 - Absence de description
- **Guifette moustac** : 18 mai – Saint-Vigor-d'Ymonville/76 - Absence de description
- **Guifette moustac** : 19 août – Heurteauville/76 - Absence de description
- **Labbe à longue queue** : 23 août - La Poterie-Cap-d'Antifer/76 - Absence de description
- **Puffin majeur** : 17 octobre – Auderville - Absence de description
- **Vautour fauve** : 6 juin – Bernière-sur-Seine/27 – description insuffisante
- **Circaète jean-le-Blanc** : 21 juin – Gonfreville-l'Orcher/76 - Absence de description
- **Corneille mantelée** : 30 janvier – Ecretteville-lès-Baons/76 - Absence de description
- **Corneille mantelée** : 16 avril – la Trinité/27 - Absence de description
- **Hypolaïs icterine** – 28 mai – Jumièges/76 - description insuffisante
- **Étourneau roselin** : 20 décembre – Saint-lô – il s'agissait d'Étourneaux sansonnets
- **Moineau friquet** : 29 janvier – Verrières/61 - Absence de description
- **Moineau friquet** : 30 janvier – Saint-Étienne-du-Rouvray/76 – Absence de description
- **Moineau friquet** : 30 janvier – Coulonges-les-sablons/61 – Absence de description
- **Moineau friquet** : 30 janvier – Percy/50 – Absence de description
- **Moineau friquet** : 30 janvier – Montreuil-l'Argillé/27 – Absence de description
- **Sizerin flammé** : 13 janvier – Soliers/14 - Absence de description
- **Sizerin flammé** : 19 octobre – Auderville/50 - Absence de description
- **Sizerin flammé** : 06 novembre – Saint-Martin-de-Fontenay/14 - Absence de description

- **Bruant ortolan** : 24 août – Feuguerolle-Bully/14 – enregistrement nocturne avec 1 seul cri
- **Bruant ortolan** : 30 août – Longues-sur-Mer/14 - Absence de description
- **Bruant nain** : 21 octobre – Oudalle/76 - description insuffisante

Remerciements : Les membres du CHR Normandie remercient vivement tous les ornithologues qui transmettent leurs données via le site Faune France/Normandie, permettant ainsi d'assurer une « traçabilité » et valorisation des observations d'oiseaux rares en Normandie. Merci également au bureau du GONm de nous avoir accueillis au siège régional de Caen pour la réunion annuelle.

Comité d'Homologation Régional de Normandie (GONm+LPO) : oiseaux rares
chr.normandie@gmail.com

LISTE DES ESPECES SOUMISES A HOMOLOGATION EN NORMANDIE

D'après la « Liste officielle des Oiseaux de France », édition 2020 (catégories A, B & C) - Commission de l'Avifaune Française (CAF) & la liste officielle du CHN (mise à jour en 2017)
<https://cdnfiles1.biolovision.net/www.faune-france.org/userfiles/FauneFrance/FFEnSavoirPlus/LOF2020.pdf>
http://www.chn-france.org/upload_content/Liste_taxons_CHN_4.pdf

Notez que toutes les autres espèces plus rares ne figurant pas encore sur la liste des oiseaux de Normandie sont aussi à soumettre au CHR

N°	Nom vernaculaire	Nom scientifique	Descripteur	Anciens noms	Catégories de la CAF	Statut CHN	Règle d'homologation	Commentaire
1	Bernache cravant du Pacifique	<i>Branta bernicla nigricans</i>	(Lawrence, 1846)	Bernache du Pacifique	A			
2	Bernache à cou roux	<i>Branta ruficollis</i>	(Pallas, 1769)		A	CHN		
3	Oie des neiges	<i>Anser caerulescens</i>	(Linnaeus, 1758)	Oie blanche	BD	CHN		Vérifier l'origine sauvage (hors catégories E)
4	Oie de la taïga	<i>Anser fabalis</i>	(Latham, 1787)	Oie de taïga (<i>Anser fabalis fabalis</i>) Oie des moissons	A	CHN		
5	Oie à bec court	<i>Anser brachyrhynchus</i>	Baillon, 1833		A			
6	Oie de la toundra	<i>Anser serrirostris rossicus</i>	Buturlin, 1933	Oie de toundra (<i>Anser fabalis rossicus</i>) Oie des moissons	A			
7	Oie rieuse du Groenland	<i>Anser albifrons flavirostris</i>	Dalgety & Scott, 1948		A	CHN		
8	Oie naine	<i>Anser erythropus</i>	(Linnaeus, 1758)		A	CHN		
9	Cygne de Bewick	<i>Cygnus columbianus</i>	(Ord, 1815)		A			
10	Cygne chanteur	<i>Cygnus cygnus</i>	(Linnaeus, 1758)	Cygne sauvage	A			
11	Sarcelle élégante	<i>Anas formosa</i>	Georgi, 1775		BD	CHN		Vérifier l'origine sauvage (hors catégories E)
12	Sarcelle à ailes bleues	<i>Anas discors</i>	Linné, 1766		A	CHN		Vérifier l'origine sauvage (hors catégories E)
13	Canard à front blanc	<i>Anas americana</i>	J.F. Gmelin, 1789	Canard d'Amérique	A	CHN		
14	Sarcelle à ailes vertes	<i>Anas carolinensis</i>	J.F. Gmelin, 1789	Sarcelle de la Caroline	A	CHN		
15	Sarcelle marbrée	<i>Marmaronetta angustirostris</i>	(Ménétries, 1832)		A	CHN		
16	Fuligule nyroca	<i>Aythya nyroca</i>	(Güldenstädt, 1770)		A			
17	Fuligule à bec cerclé	<i>Aythya collaris</i>	(Donovan, 1809)		A			
18	Fuligule à tête noire	<i>Aythya affinis</i>	(Eyton, 1838)	Petit fuligule	A	CHN		
19	Eider à tête grise	<i>Somateria spectabilis</i>	(Linnaeus, 1758)		A	CHN		
20	Macreuse à front blanc	<i>Melanitta perspicillata</i>	(Linnaeus, 1758)	Macreuse à lunette	A	CHN		

LISTE DES ESPECES SOUMISES A HOMOLOGATION EN NORMANDIE

D'après la « Liste officielle des Oiseaux de France », édition 2020 (catégories A, B & C) - Commission de l'Avifaune Française (CAF) & la liste officielle du CHN (mise à jour en 2017)
<https://cdnfiles1.biolovision.net/www.faune-france.org/userfiles/FauneFrance/FFEnSavoirPlus/LOF2020.pdf>
http://www.chn-france.org/upload_content/Liste_taxons_CHN_4.pdf

Notez que toutes les autres espèces plus rares ne figurant pas encore sur la liste des oiseaux de Normandie sont aussi à soumettre au CHR

N°	Nom vernaculaire	Nom scientifique	Descripteur	Anciens noms	Catégories de la CAF	Statut CHN	Règle d'homologation	Commentaire
21	Macreuse à bec jaune	<i>Melanitta americana</i>	(Swainson, 1832)	Macreuse d'Amérique	A	CHN		
22	Harelde boréale	<i>Clangula hyemalis</i>	(Linnaeus, 1758)	Harelde de Miquelon, Harelde kakawi	A			
23	Garrot d'islande	<i>Bucephala islandica</i>	(J.F. Gmelin, 1789)		A	CHN		
24	Erismature rousse	<i>Oxyura jamaicensis</i>	(J.F. Gmelin, 1789)		A			
25	Erismature à tête blanche	<i>Oxyura leucocephala</i>	(Scopoli, 1769)		A	CHN		
26	Martinet à ventre blanc	<i>Apus melba</i>	(Linnaeus, 1758)	Martinet alpin	A			
27	Martinet pâle	<i>Apus pallidus</i>	(Shelley, 1870)		A			
28	Outarde barbue	<i>Otis tarda</i>	Linnaeus, 1758	grande outarde	AE	CHN		E pour la Normandie : pas de données validées au CHN dans une autre catégorie
29	Outarde canepetière	<i>Tetrax tetrax</i>	(Linnaeus, 1758)		A			
30	Coucou geai	<i>Clamator glandarius</i>	(Linnaeus, 1758)		A			
31	Coulicou à bec jaune	<i>Coccyzus americanus</i>	(Linnaeus, 1758)		A	CHN		
32	Syrhapte paradoxal	<i>Syrhaptus paradoxus</i>	(Pallas, 1773)		A	CHN		1 donnée du 14 mai 1888 à Alençon
33	Râle des genêts	<i>Crex crex</i>	(Linnaeus, 1758)		A			
34	Marouette poussin	<i>Zapornia parva</i>	(Scopoli, 1769)		A			
35	Marouette de baillon	<i>Zapornia pusilla</i>	(Pallas, 1776)		A			
36	Talève sultane	<i>Porphyrio porphyrio</i>	(Linnaeus, 1758)	Poule sultane	AC			
37	Grue demoiselle	<i>Grus virgo</i>	(Linnaeus, 1758)		A	CHN		
38	Grèbe à bec bigarré	<i>Podilymbus podiceps</i>	(Linnaeus, 1758)		A	CHN		
39	Flamant rose	<i>Phoenicopterus roseus</i>	Pallas, 1811		A			
40	Flamant nain	<i>Phoenicopterus</i>	G.R. Gray, 1869		D	CHN		

LISTE DES ESPECES SOUMISES A HOMOLOGATION EN NORMANDIE

D'après la « Liste officielle des Oiseaux de France », édition 2020 (catégories A, B & C) - Commission de l'Avifaune Française (CAF) & la liste officielle du CHN (mise à jour en 2017)
<https://cdnfiles1.biolovision.net/www.faune-france.org/userfiles/FauneFrance/FFEnSavoirPlus/LOF2020.pdf>
http://www.chn-france.org/upload_content/Liste_taxons_CHN_4.pdf

Notez que toutes les autres espèces plus rares ne figurant pas encore sur la liste des oiseaux de Normandie sont aussi à soumettre au CHR

N°	Nom vernaculaire	Nom scientifique	Descripteur	Anciens noms	Catégories de la CAF	Statut CHN	Règle d'homologation	Commentaire
		<i>minor</i>						
41	Vanneau sociable	<i>Vanellus gregarius</i>	(Pallas, 1771)		A	CHN		
42	Pluvier bronzé	<i>Pluvialis dominica</i>	(Müller, PLS, 1776)		A			
43	Gravelot kildir	<i>Charadrius vociferus</i>	Linnaeus, 1758	Pluvier kildir	A	CHN		
44	Gravelot mongol	<i>Charadrius mongolus</i>	(Pallas, 1776)	Pluvier mongol	A	CHN		
45	Guignard d'Eurasie	<i>Charadrius morinellus</i>	Linnaeus, 1758	Pluvier guignard	A			
46	Bécasseau falcinelle	<i>Calidris falcinellus</i>	(Pontoppidan, 1763)		A	CHN		
47	Bécasseau de Temminck	<i>Calidris temminckii</i>	(Leisler, 1812)		A			
48	Bécasseau à cou roux	<i>Calidris ruficollis</i>	(Pallas, 1776)	Bécasseau à col roux	A	CHN		
49	Bécasseau de Baird	<i>Calidris bairdii</i>	(Coues, 1861)		A	CHN		
50	Bécasseau de Bonaparte	<i>Calidris fuscicollis</i>	(Vieillot, 1819)		A	CHN		
51	Bécasseau rousset	<i>Calidris subruficollis</i>	(Vieillot, 1819)		A	CHN		
52	Bécasseau tacheté	<i>Calidris melanotos</i>	(Vieillot, 1819)		A			
53	Bécasseau semipalmé	<i>Calidris pusilla</i>	(Linné, 1766)		A	CHN		
54	Bécassin à long bec	<i>Limnodromus scolopaceus</i>	(Say, 1823)		A	CHN		
55	Bécassine double	<i>Gallinago media</i>	(Latham, 1787)		A	CHN		
56	Chevalier bargette	<i>Xenus cinereus</i>	(Guldenstädt, 1775)	Bargette de Terek	A	CHN		
57	Phalarope de Wilson	<i>Phalaropus tricolor</i>	(Vieillot, 1819)		A	CHN		
58	Phalarope à bec étroit	<i>Phalaropus lobatus</i>	(Linnaeus, 1758)		A			
59	Phalarope à bec large	<i>Phalaropus fulicarius</i>	(Linnaeus, 1758)		A			
60	Chevalier grivelé	<i>Actitis macularius</i>	(Linnaeus, 1766)		A	CHN		
61	Chevalier à pattes jaunes	<i>Tringa flavipes</i>	(J.F. Gmelin, 1789)	Petit chevalier	A	CHN		

LISTE DES ESPECES SOUMISES A HOMOLOGATION EN NORMANDIE

D'après la « Liste officielle des Oiseaux de France », édition 2020 (catégories A, B & C) - Commission de l'Avifaune Française (CAF) & la liste officielle du CHN (mise à jour en 2017)
<https://cdnfiles1.biolovision.net/www.faune-france.org/userfiles/FauneFrance/FFEnSavoirPlus/LOF2020.pdf>
http://www.chn-france.org/upload_content/Liste_taxons_CHN_4.pdf

Notez que toutes les autres espèces plus rares ne figurant pas encore sur la liste des oiseaux de Normandie sont aussi à soumettre au CHR

N°	Nom vernaculaire	Nom scientifique	Descripteur	Anciens noms	Catégories de la CAF	Statut CHN	Règle d'homologation	Commentaire
62	Chevalier stagnatile	<i>Tringa stagnatilis</i>	(Bechstein, 1803)		A			
63	Chevalier criard	<i>Tringa melanoleuca</i>	(J.F. Gmelin, 1789)	Grand chevalier	A	CHN		
64	Courvite Isabelle	<i>Cursorius cursor</i>	(Latham, 1787)		A	CHN		
65	Glaréole à collier	<i>Glareola pratincola</i>	(Linnaeus, 1766)		A			
66	Mouette blanche	<i>Pagophila eburnea</i>	(Phipps, 1774)	Mouette ivoire , goéland sénateur	A	CHN		
67	Mouette atricille	<i>Larus atricilla</i>	Linnaeus, 1758		A	CHN		
68	Mouette de Franklin	<i>Larus pipixcan</i>	Wagler, 1831		A	CHN		
69	Goéland d'Audouin	<i>Larus audouinii</i>	Payraudeau, 1826		A			
70	Goéland à bec cerclé	<i>Larus delawarensis</i>	Ord, 1815		A	CHN		CHN depuis 2021
71	Goéland bourgmestre	<i>Larus hyperboreus</i>	Gunnerus, 1767		A			
72	Goéland à ailes blanches	<i>Larus glaucoides</i>	Meyer, 1822	Goéland arctique	A			
73	Goéland de la Baltique	<i>Larus fuscus fuscus</i>	Linnaeus, 1758		A	CHN		
74	Sterne hansel	<i>Gelochelidon nilotica</i>	(J.F. Gmelin, 1789)		A			
75	Sterne caspienne	<i>Hydroprogne caspia</i>	(Pallas, 1770)		A			
76	Sterne royale	<i>Thalasseus maxima</i>	Boddaert, 1783		A	CHN		
77	Sterne voyageuse	<i>Sterna bengalensis</i>	Lesson, 1831		A	CHN		
78	Sterne élégante	<i>Thalasseus elegans</i>	(Gambel, 1849)		A	CHN		
79	Sterne fuligineuse	<i>Onychoprion fuscatus</i>	(Linnaeus, 1766)		A	CHN		
80	Sterne de Dougall	<i>Sterna dougallii</i>	Montagu, 1813		A			
81	Sterne de Forster	<i>Sterna forsteri</i>	Nuttall, 1834		A	CHN		
82	Guifette moustac	<i>Chlidonias hybrida</i>	(Pallas, 1811)		A			
83	Guifette leucoptère	<i>Chlidonias leucopterus</i>	(Temminck, 1815)		A			

LISTE DES ESPECES SOUMISES A HOMOLOGATION EN NORMANDIE

D'après la « Liste officielle des Oiseaux de France », édition 2020 (catégories A, B & C) - Commission de l'Avifaune Française (CAF) & la liste officielle du CHN (mise à jour en 2017)
<https://cdnfiles1.biolovision.net/www.faune-france.org/userfiles/FauneFrance/FFEnSavoirPlus/LOF2020.pdf>
http://www.chn-france.org/upload_content/Liste_taxons_CHN_4.pdf

Notez que toutes les autres espèces plus rares ne figurant pas encore sur la liste des oiseaux de Normandie sont aussi à soumettre au CHR

N°	Nom vernaculaire	Nom scientifique	Descripteur	Anciens noms	Catégories de la CAF	Statut CHN	Règle d'homologation	Commentaire
84	Labbe à longue queue	<i>Stercorarius longicaudus</i>	Vieillot, 1819		A			
85	Mergule nain	<i>Alle alle</i>	(Linnaeus, 1758)		A			
86	Guillemot à miroir	<i>Cephus grylle</i>	(Linnaeus, 1758)		A	CHN		
87	Macareux moine	<i>Fratercula arctica</i>	(Linnaeus, 1758)		A			
88	Plongeon à bec blanc	<i>Gavia adamsii</i>	(Gray, 1859)		A	CHN		
89	Albatros à sourcils noirs	<i>Thalassarche melanophris</i>	Temminck, 1828		A	CHN		
90	Océanite culblanc	<i>Oceanodroma leucorhoa</i>	(Vieillot, 1818)	Pétrel tempête à culblanc, Pétrel culblanc	A			
91	Puffin cendré	<i>Calonectris borealis</i>	(Cory, 1881)		A			
92	Puffin majeur	<i>Puffinus gravis</i>	(O'Reilly, 1818)		A			
93	Puffin de macaronésie / de Boyd	<i>Puffinus baroli / boydi</i>	(Bonaparte, 1857) / Mathews, 1912		A	CHN		
94	Cormoran pygmée	<i>Phalacrocorax pygmaeus</i>	(Pallas, 1773)		A	CHN		
95	Blongios nain	<i>Ixobrychus minutus</i>	(Linnaeus, 1766)		A			
96	Crabier chevelu	<i>Ardeola ralloides</i>	(Scopoli, 1769)	Héron crabier	A			
97	Aigrette des récifs	<i>Egretta gularis</i>	(Bosc, 1792)		A	CHN		
98	Pélican blanc	<i>Pelecanus onocrotalus</i>	Linnaeus, 1758		A	CHN		
99	Gypaète barbu	<i>Gypaetus barbatus</i>	(Linnaeus, 1758)		A			
100	Vautour percnoptère	<i>Neophron percnopterus</i>	(Linnaeus, 1758)	Percnoptère d'Égypte	A			
101	Vautour fauve	<i>Gyps fulvus</i>	(Habliz, 1783)		AC			
102	Vautour moine	<i>Aegypius monachus</i>	(Linnaeus, 1766)		AC			
103	Circaète Jean-le-Blanc	<i>Circaetus gallicus</i>	(J.F. Gmelin, 1788)		A			
104	Aigle pomarin	<i>Aquila pomarina</i>	C. L. Brehm, 1831		A	CHN		

LISTE DES ESPECES SOUMISES A HOMOLOGATION EN NORMANDIE

D'après la « Liste officielle des Oiseaux de France », édition 2020 (catégories A, B & C) - Commission de l'Avifaune Française (CAF) & la liste officielle du CHN (mise à jour en 2017)
<https://cdnfiles1.biolovision.net/www.faune-france.org/userfiles/FauneFrance/FFEnSavoirPlus/LOF2020.pdf>
http://www.chn-france.org/upload_content/Liste_taxons_CHN_4.pdf

Notez que toutes les autres espèces plus rares ne figurant pas encore sur la liste des oiseaux de Normandie sont aussi à soumettre au CHR

N°	Nom vernaculaire	Nom scientifique	Descripteur	Anciens noms	Catégories de la CAF	Statut CHN	Règle d'homologation	Commentaire
105	Aigle criard	<i>Aquila clanga</i>	Pallas, 1811		A	CHN		
106	Aigle royal	<i>Aquila chrysaetos</i>	(Linnaeus, 1758)		A			
107	Aigle botté	<i>Aquila pennata</i>	(J.F. Gmelin, 1788)		A			
108	Aigle de Bonelli	<i>Aquila fasciata</i>	(Vieillot, 1822)		A			
109	Busard pâle	<i>Circus macrourus</i>	(S.G. Gmelin, 1770)		A			
110	Pygargue à queue blanche	<i>Haliaeetus albicilla</i>	(Linnaeus, 1758)		A			
111	Buse pattue	<i>Buteo lagopus</i>	(Pontoppidan, 1763)		A			
112	Buse féroce	<i>Buteo rufinus</i>	(Cretzschmar, 1829)		A	CHN		
113	Petit-duc scops	<i>Otus scops</i>	(Linnaeus, 1758)	Hibou petit-duc	A			
114	Harfang des neiges	<i>Bubo scandiacus</i>	(Linnaeus, 1758)		A	CHN		
115	Grand-Duc d'Europe	<i>Bubo bubo</i>	(Linnaeus, 1758)	Hibou grand-duc	A			
116	Chouette de Tengmalm	<i>Aegolius funereus</i>	(Linné, 1758)		A			
117	Rollier d'Europe	<i>Coracias garrulus</i>	Linnaeus, 1758		A			
118	Pic cendré	<i>Picus canus</i>	J. F. Gmelin, 1788		A			
119	Faucon crécerellette	<i>Falco naumanni</i>	Fleischer, 1818		A			
120	Faucon kobez	<i>Falco vespertinus</i>	Linnaeus, 1766		A			
121	Pie-grièche isabelle	<i>Lanius isabellinus</i>	Hemprich & Ehrenberg, 1833		A	CHN		
122	Pie-grièche à poitrine rose	<i>Lanius minor</i>	J.F. Gmelin, 1788		A	CHN		CHN depuis 2021
123	Pie-grièche grise	<i>Lanius excubitor</i>	Linnaeus, 1758		A			
124	Pie-grièche des steppes	<i>Lanius excubitor pallidirostris</i>	Cassin, 1851	(<i>Lanius meridionalis pallidirostris</i>)	A	CHN		
125	Pie-grièche à tête rousse	<i>Lanius senator</i>	Linnaeus, 1758		A			
126	Cassenoix moucheté	<i>Nucifraga</i>	(Linnaeus, 1758)		A			

LISTE DES ESPECES SOUMISES A HOMOLOGATION EN NORMANDIE

D'après la « Liste officielle des Oiseaux de France », édition 2020 (catégories A, B & C) - Commission de l'Avifaune Française (CAF) & la liste officielle du CHN (mise à jour en 2017)
<https://cdnfiles1.biolovision.net/www.faune-france.org/userfiles/FauneFrance/FFEnSavoirPlus/LOF2020.pdf>
http://www.chn-france.org/upload_content/Liste_taxons_CHN_4.pdf

Notez que toutes les autres espèces plus rares ne figurant pas encore sur la liste des oiseaux de Normandie sont aussi à soumettre au CHR

N°	Nom vernaculaire	Nom scientifique	Descripteur	Anciens noms	Catégories de la CAF	Statut CHN	Règle d'homologation	Commentaire
		<i>caryocatactes</i>						
127	Crave à bec rouge	<i>Pyrrhonorax pyrrhonorax</i>	(Linnaeus, 1758)		A			
128	Cornelle mantelée	<i>Corvus cornix</i>	Linnaeus, 1758		A			
129	Jaseur boréal	<i>Bombycilla garrulus</i>	(Linnaeus, 1758)		A			
130	Mésange boréale	<i>Poecile montanus</i>	(Conrad von Baldenstein, 1827)		A			
131	Rémiz penduline	<i>Remiz pendulinus</i>	(Linnaeus, 1758)		A			Sauf les départements de Seine-Maritime (76) et Eure (27) depuis le 1er janvier 2013.
132	Alouette haussecol	<i>Eremophila alpestris</i>	(Linnaeus, 1758)		A			
133	Alouette calandrelle	<i>Calandrella brachydactyla</i>	(Leisler, 1814)		A			
134	Hirondelle de rochers	<i>Ptyonoprogne rupestris</i>	(Scopoli, 1769)		A			
135	Hirondelle rousseline	<i>Cecropis daurica</i>	(Linné, 1771)		A			
136	Mésange à longue queue Nordique	<i>Aegithalos caudatus caudatus</i>	(Linné, 1758)		A	CHN		
137	Pouillot de Bonelli	<i>Phylloscopus bonelli</i>	(Vieillot, 1819)		A			
138	Pouillot de Hume	<i>Phylloscopus humei</i>	(Brooks, 1878)		A	CHN		
139	Pouillot à grands sourcils	<i>Phylloscopus inornatus</i>	(Blyth, 1842)		A			
140	Pouillot de Pallas	<i>Phylloscopus proregulus</i>	(Pallas, 1811)		A	CHN		
141	Pouillot brun	<i>Phylloscopus fuscatus</i>	(Blyth, 1842)		A	CHN		
142	Pouillot de Sibérie	<i>Phylloscopus collybita tristis</i>	Blyth, 1843	Pouillot véloce de Sibérie	A		Un enregistrement seul ne suffit pas, il faut une description rigoureuse de l'oiseau en plus. Des photos de très bonnes qualités seules peuvent par contre suffire si l'ensemble des critères diagnostiques sont bien visibles	
143	Pouillot ibérique	<i>Phylloscopus ibericus</i>	Ticehurst, 1937		A		2 cris sont nécessaires pour des enregistrements seuls	

LISTE DES ESPECES SOUMISES A HOMOLOGATION EN NORMANDIE

D'après la « Liste officielle des Oiseaux de France », édition 2020 (catégories A, B & C) - Commission de l'Avifaune Française (CAF) & la liste officielle du CHN (mise à jour en 2017)
<https://cdnfiles1.biolovision.net/www.faune-france.org/userfiles/FauneFrance/FFEnSavoirPlus/LOF2020.pdf>
http://www.chn-france.org/upload_content/Liste_taxons_CHN_4.pdf

Notez que toutes les autres espèces plus rares ne figurant pas encore sur la liste des oiseaux de Normandie sont aussi à soumettre au CHR

N°	Nom vernaculaire	Nom scientifique	Descripteur	Anciens noms	Catégories de la CAF	Statut CHN	Règle d'homologation	Commentaire
144	Rousserolle turdoïde	<i>Acrocephalus arundinaceus</i>	(Linnaeus, 1758)		A			
145	Phragmite aquatique	<i>Acrocephalus paludicola</i>	(Vieillot, 1817)		A			Uniquement les données hors capture/bagage
146	Rousserolle isabelle	<i>Acrocephalus agricola</i>	(Jerdon, 1845)		A	CHN		
147	Rousserolle des buissons	<i>Acrocephalus dumetorum</i>	Blyth, 1849		A	CHN		
148	Hypolaïs icterine	<i>Hippolaïs icterina</i>	(Vieillot, 1817)		A		2 cris sont nécessaires pour des enregistrements seuls	
149	Fauvette épervière	<i>Sylvia nisoria</i>	(Bechstein, 1795)		A	CHN		
150	Fauvette mélanocéphale	<i>Sylvia melanocephala</i>	(J.F. Gmelin, 1789)		A			
151	Fauvette passerinette	<i>Sylvia cantillans</i>	(Pallas, 1764)		A			
152	Tichodrome échelette	<i>Tichodroma muraria</i>	(Linnaeus, 1766)		A			
153	Etourneau roselin	<i>Pastor roseus</i>	(Linnaeus, 1758)		A			
154	Etourneau unicolore	<i>Sturnus unicolor</i>	Temminck 1820		A			
155	Grive dorée	<i>Zoothera dauma</i>	(Latham, 1790)		A	CHN		
156	Robin à flancs roux	<i>Tarsiger cyanurus</i>	(Pallas, 1773)		A	CHN		
157	Gobemouche à collier	<i>Ficedula albicollis</i>	(Temminck, 1815)		A		2 cris sont nécessaires pour des enregistrements seuls	
158	Gobemouche nain	<i>Ficedula parva</i>	(Bechstein, 1794)		A		2 cris sont nécessaires pour des enregistrements seuls	
159	Monticole de roche	<i>Monticola saxatilis</i>	(Linnaeus, 1766)	Merle de roche	A			
160	Tarier de Sibérie	<i>Saxicola maurus</i>	(Pallas, 1773)	Traquet pâtre oriental	A	CHN		
161	Traquet isabelle	<i>Oenanthe isabellina</i>	(Temminck, 1829)		A	CHN		
162	Traquet du désert	<i>Oenanthe deserti</i>	(Temminck, 1825)		A	CHN		
163	Traquet oreillard	<i>Oenanthe hispanica</i>	(Linnaeus, 1758)		A			
164	Traquet pie	<i>Oenanthe</i>	(Lepechin, 1770)		A	CHN		

LISTE DES ESPECES SOUMISES A HOMOLOGATION EN NORMANDIE

D'après la « Liste officielle des Oiseaux de France », édition 2020 (catégories A, B & C) - Commission de l'Avifaune Française (CAF) & la liste officielle du CHN (mise à jour en 2017)
<https://cdnfiles1.biolovision.net/www.faune-france.org/userfiles/FauneFrance/FFEnSavoirPlus/LOF2020.pdf>
http://www.chn-france.org/upload_content/Liste_taxons_CHN_4.pdf

Notez que toutes les autres espèces plus rares ne figurant pas encore sur la liste des oiseaux de Normandie sont aussi à soumettre au CHR

N°	Nom vernaculaire	Nom scientifique	Descripteur	Anciens noms	Catégories de la CAF	Statut CHN	Règle d'homologation	Commentaire
		<i>pleschanka</i>						
165	CinCLE plongeur	<i>Cinclus cinclus</i>	(Linnaeus, 1758)		A			
166	Moineau espagnol	<i>Passer hispaniolensis</i>	(Temminck, 1820)		A	CHN		
167	Moineau friquet	<i>Passer montanus</i>	(Linnaeus, 1758)		A			Sauf colonie de Pontorson et sites de nidifications connues
168	Accenteur alpin	<i>Prunella collaris</i>	(Scopoli, 1769)		A		2 cris sont nécessaires pour des enregistrements seuls	
169	Bergeronnette d'Italie	<i>Motacilla flava cinereocapilla</i>	Savi, 1831	Bergeronnette printanière d'Italie	A			
170	Bergeronnette des Balkans	<i>Motacilla flava feldegg</i>	Michahelles, 1830		A	CHN		
171	Bergeronnette nordique	<i>Motacilla flava thunbergi</i>	Billberg, 1828	Bergeronnette printanière nordique	A			
172	Pipit de Richard	<i>Anthus richardi</i>	Vieillot, 1818		A			
173	Pipit de Godlewski	<i>Anthus godlewskii</i>	Taczanowski, 1876		A	CHN		
174	Pipit rousseline	<i>Anthus campestris</i>	(Linnaeus, 1758)		A			Sauf pour les falaises de Carolles et le cap de la Hève.
175	Pipit à dos olive	<i>Anthus hodgsoni</i>	Richmond, 1907		A	CHN		
176	Pipit à gorge rousse	<i>Anthus cervinus</i>	(Pallas, 1811)		A		2 cris sont nécessaires pour des enregistrements seuls	
177	Roselin githagine	<i>Bucanetes githagineus</i>	(Lichtenstein, 1823)		A	CHN		
178	Roselin cramoyi	<i>Erythrura erythrura</i>	(Pallas, 1770)		A	CHN		
179	Linotte à bec jaune	<i>Carduelis flavirostris</i>	(Linnaeus, 1758)		A	CHN		
180	Sizerin flammé	<i>Acanthis flammea</i>	(Linnaeus, 1758)		A			
181	Bec-croisé perroquet	<i>Loxia pytyopsittacus</i>	Borkhausen, 1793		A	CHN		
182	Bec-croisé bifascié	<i>Loxia leucoptera</i>	Gmelin, JF, 1789		A	CHN		
183	Bruant à calotte blanche	<i>Emberiza leucocephalos</i>	S.G. Gmelin, 1771		A	CHN		

LISTE DES ESPECES SOUMISES A HOMOLOGATION EN NORMANDIE

D'après la « Liste officielle des Oiseaux de France », édition 2020 (catégories A, B & C) - Commission de l'Avifaune Française (CAF) & la liste officielle du CHN (mise à jour en 2017)
<https://cdnfiles1.biolovision.net/www.faune-france.org/userfiles/FauneFrance/FFEnSavoirPlus/LOF2020.pdf>
http://www.chn-france.org/upload_content/Liste_taxons_CHN_4.pdf

Notez que toutes les autres espèces plus rares ne figurant pas encore sur la liste des oiseaux de Normandie sont aussi à soumettre au CHR

N°	Nom vernaculaire	Nom scientifique	Descripteur	Anciens noms	Catégories de la CAF	Statut CHN	Règle d'homologation	Commentaire
184	Bruant fou	<i>Emberiza cia</i>	Linnaeus, 1766		A		2 cris sont nécessaires pour des enregistrements seuls	
185	Bruant ortolan	<i>Emberiza hortulana</i>	Linnaeus, 1758		A		2 cris sont nécessaires pour des enregistrements seuls, sauf cris de type « Plik »	
186	Bruant nain	<i>Emberiza pusilla</i>	Pallas, 1776		A		2 cris sont nécessaires pour des enregistrements seuls	
187	Bruant mélanocéphale	<i>Emberiza melanocephala</i>	Scopoli, 1769		A	CHN		
188	Bruant à couronne blanche	<i>Zonotrichia leucophrys</i>	(Forster, 1772)		A	CHN		

LISTE DES ESPECES SOUMISES A HOMOLOGATION EN NORMANDIE

D'après la « Liste officielle des Oiseaux de France », édition 2020 (catégories D & E) - Commission de l'Avifaune Française (CAF) & la liste officielle du CHN (mise à jour en 2017)
<https://cdnfiles1.biolovision.net/www.faune-france.org/userfiles/FauneFrance/FFEnSavoirPlus/LOF2020.pdf>
http://www.chn-france.org/upload_content/Liste_taxons_CHN_4.pdf

Notez que toutes les autres espèces plus rares ne figurant pas encore sur la liste des oiseaux de Normandie sont aussi à soumettre au CHR

N°	Nom vernaculaire	Nom scientifique	Descripteur	Anciens noms	Catégories de la CAF	Statut CHN
1	Bernache de Hutchins	<i>Branta hutchinsii</i>	(Richardson, 1832)		E	CHN
2	Canard à faucilles	<i>Anas falcata</i>	Georgi, 1775		D	CHN
3	Damier du Cap	<i>Daption capense</i>	(Linnaeus, 1758)		E	CHN
4	Harle couronné	<i>Lophodytes cucullatus</i>	(Linnaeus, 1758)		E	CHN
5	Roselin pourpré	<i>Carpodacus purpureus</i>	(Gmelin, 1789)	<i>Haemorhous purpureus</i>	E	CHN
6	Spatule d'Afrique	<i>Platalea alba</i>	Scopoli, 1786		E	CHN

LISTE DES HYBRIDES & TAXONS AUTRES SOUMIS A HOMOLOGATION EN NORMANDIE

N°	Nom vernaculaire	Nom scientifique	Descripteur	Anciens noms	Catégories de la CAF	Statut CHN	Commentaire
1	Pouillot de type sibérien	<i>Phylloscopus collybita tristis</i> / " <i>fulvescens</i> "					Taxons proposés par Faune-France
2	Bergeronnette de la Manche	<i>M. f. flava</i> X <i>M. f. flavissima</i>					Non encore ouvert à la saisie sur Faune-France

Mise à Jour : 01/01/2023

Contact : secrétariat du CHR Normandie (GONm+LPO) : chr.normandie@gmail.com

Ressources

Liste CAF 2020

<https://cdnfiles1.biolovision.net/www.faune-france.org/userfiles/FauneFrance/FFEnSavoirPlus/LOF2020.pdf>

Liste des oiseaux soumis au CHN 2017

http://www.chn-france.org/upload_content/Liste_taxons_CHN_4.pdf

Catégories

Catégorie A = Espèces présentes à l'état sauvage en France métropolitaine y compris la frange maritime (Zone Économique Exclusive), observées au moins une fois depuis 1950 et dont l'origine naturelle est considérée comme la plus probable au moins pour un individu

Catégorie B = Espèces observées à l'état sauvage sur la même aire géographique, mais qui n'ont pas été revues depuis 1950.

Catégorie C = Espèces introduites ou échappées de captivité en France métropolitaine depuis plusieurs années, qui ont fait souche et dont au moins une population se maintient par reproduction en milieu naturel, indépendamment d'éventuels apports supplémentaires d'origine humaine

Catégorie D = Espèces pour lesquelles il existe au moins une mention dont l'origine naturelle est possible mais cependant pas la plus probable compte tenu des informations disponibles. L'arrivée de ces espèces en France métropolitaine a pu être aidée volontairement par l'Homme ou bien il s'agit d'échappés de captivité.

Catégorie E = Espèces supposées d'origine captive, mentionnées dans la littérature comme ayant été vues dans la nature en France métropolitaine

L'objectif du CHR

Le Comité d'Homologation Régional des oiseaux rares de Normandie (CHR Normandie GONm + LPO) rappelle que son objectif est d'authentifier et de publier l'ensemble des observations d'oiseaux rares de la région pour que les bases de données utilisées pour la connaissance des espèces soient les plus propres et réalistes possible. En janvier 2022, la totalité des données soumises au CHR Normandie a été validée, soit sur les anciennes bases locales de données du GONm et de la LPO soit sur le portail (Faune France).

Depuis 2019, l'ensemble des données naturalistes est répertorié et saisi sur les portails Faune France (ou sur le site miroir équivalent de Faune Normandie) de Biolovision.

Nous encourageons et incitons fortement tous les observateurs à utiliser ce portail national qui permet l'utilisation des données à une échelle régionale via les associations partenaires (GONm, LPO...), mais également à l'échelle nationale et internationale pour une meilleure connaissance et protection des espèces en France et dans le Monde.

L'homologation au CHR

Dans cette présente liste, rassemblant l'ensemble des espèces rares observées en Normandie, les espèces qui sont soumises à homologation au Comité d'Homologation National des oiseaux rares en France (CHN) se sont les règles d'homologation propre au CHN qui font foi.

Pour toutes les autres espèces de cette liste qui sont soumise au CHR il est demandé de systématiquement y associer une description détaillée (silhouette, coloration du plumage partie par partie, comportement, voix, conditions d'observation...) et/ou de joindre, tout document graphique disponible (photos, dessins, notes de terrain...) ou sonore (enregistrement, sonagramme) afin d'éliminer les autres espèces similaires.

Des règles particulières selon les espèces sont répertoriées dans cette présente liste (les feuilles suivantes de ce document) et, à noter que pour toute première donnée régionale (hors CHN), il est demandé une photo permettant d'identifier clairement l'espèce.

Avec l'essor grandissant des enregistrements, nous souhaitons attirer l'attention des observateurs sur les risques de cris aberrants d'espèce et/ou d'imitateurs, nous préconisons donc un enregistrement accompagné d'une description de l'oiseau, même brèves. Pour les enregistrements seul, un minimum de deux cris pour un certain nombre d'espèce difficile et aux cris monosyllabique sont nécessaire pour une homologation certaine (cf. « règle d'homologation » par espèce de cette liste).