



# Les oiseaux rares en Normandie en 2017

## Rapport du Comité d'Homologation Régional

Le CHR rappelle que son objectif est d'authentifier et de publier les observations d'oiseaux rares à l'échelle régionale, sur la base de descriptions (et/ou photos). Réuni le 14 septembre 2018 à Caen (14), le **CHR Normandie** a terminé l'examen de la 24e circulaire, couvrant pour l'essentiel l'année 2017. Le nombre de fiches reçues est de 150 pour 57 espèces différentes (espèces CHN et données refusées incluses).

D'autres observations régionales ne font pas l'objet de fiche CHR, des erreurs d'identification ne sont pas exclues dans certains cas.

La dernière réunion s'est déroulée en présence des membres suivants : Alexandre Corbeau (co-secrétaire), Yvon Créau (vérificateur auprès du GONm), Jocelyn Desmares, Benoît Lecaplain (co-secrétaire), Jean-Pierre Marie, Gunter de Smet et David Vigour. Matthieu Lorthiois et Sébastien Provost n'ont pas pu être présent.

Matthieu Lorthiois quitte le CHR et Martin Billard le remplace en tant que membre. Benoît a maintenant quitté le secrétariat du CHR (tout en restant membre), nous les remercions vivement tous les deux pour leur travail effectué. Yvon Créau quitte également le CHR normand pour rejoindre le CHR ... breton. Merci pour l'aide apportée, notamment concernant l'examen des chroniques ornithologiques du GONm.

La liste des espèces CHR et la fiche type à remplir sont toujours à retrouver en fin de ce document et avec les rapports annuels, téléchargeables sur le lien (<http://www.gonm.org/index.php?post/CHR-%28Comit%C3%A9-d-Homologation-R%C3%A9gional%29>) ou sur demande au secrétariat du CHR : [chr.normandie@gmail.fr](mailto:chr.normandie@gmail.fr)

Les notes du CHR (cf. notes dans la liste des espèces soumises à homologation) :


- Beaucoup de fiches de Goéland pontique sont étudiées au CHR, cependant certain ne peuvent être identifiés de façon incontestable sans exclure un potentiel hybride. C'est pourquoi, dans ce groupe compliqué, une catégorie « pontique hybride » est ouverte à partir de l'année 2018 afin de garder une trace de ces individus.

Enfin, nous rappelons que dans les fiches transmises, il faut nécessairement une description, même succincte, qui permet d'éliminer les autres espèces similaires à celle décrite et que les espèces suivantes sont parfois « oubliées » par les observateurs dans la rédaction des fiches : cygne chanteur, bernache du Pacifique, macareux moine, phalarope à bec large...

Merci d'y penser !

Grâce à l'outil Clicnat – Faune-Normandie (<http://www.faune-normandie.org/>), la rédaction d'une fiche est plus facile et plus directe. Pour l'année 2017, ce sont 242 observations qui ont été saisies sur Faune Normandie. Un même oiseau peut avoir été noté plusieurs fois. La carte suivante montre la localisation de ces données (carte générée grâce à Clicnat et QGIS).

Notez que maintenant cet outil est remplacé par Faune France (biolovision): <https://www.faune-france.org/>. Cette base de donnée est nationale, la saisie des fiches pourra s'y faire directement ainsi que l'homologation.



**Localisation des observations (base de données clicnat)**

## Liste des espèces homologuées lors de l'année 2017

### **1. Cygne chanteur - *Cygnus cygnus* (Linnaeus, 1758)**

2 individus dont 1 adulte le 19/11 à Gatteville le phare/50 (A. Verneau).  
Effectif en baisse après 5 individus en 2016 et 7 oiseaux en 2015.

### **2. Bernache cravant du Pacifique - *Branta bernicla nigricans* (Lawrence, 1846)**

Sur l'ensemble baie de Saint Vaast/50, 1 à 2 individus du 18/11/2016 au 04/03 (R. Purenne et S. Crestey).  
1 individu le 18/01 à Beauvoir/50 (S. Provost), 1 individu juv le 20/02 à Saint Pair sur mer/50 (M. Leroux), 1 individu le 26/11 à Gatteville le phare/50 (S. Crestey) et 1 le 06/12 à Vains/50 (A. Trémion).

Pour rappel, 3 individus en 2016, espèce annuelle depuis 2008 (5 en 2015).



Samuel Crestey

### **3. Fuligule à bec cerclé - *Aythya collaris* (Donovan, 1809)**

1 individu le 11/03 à Poses/27 (Y. Carasco).  
Espèce occasionnelle en Normandie, observation d'un individu en 2016 sur le même secteur.

### **4. Fuligule nyroca - *Aythya nyroca* (Güldenstädt, 1770)**

1 femelle le 28/01 à Val de Reuil/27 (JP. Moulin).  
Une nouvelle donnée en 2017 de ce rare fuligule après la femelle de 2016 et le couple observé en 2015 (obs précédente en 2010).

## 5. Harelde boréale - *Clangula hyemalis* (Linnaeus, 1758)



Tony Le Huu Nghia

Présence continue d'individus entre le 26/01 et le 12/04 à Merville Franceville Plage/14 (synthèse Clicnat) avec un maximum de 16 individus le 26/02. Présence de 6 à 7 individus entre le 17/01 et le 15/03 à Blonville sur mer/14 (synthèse clicnat), possiblement les mêmes que ceux de Merville Franceville Plage/14.

1 individu les 10/02, 12/02, 25/02 et 15/04 à Saint Vaast La Hougue /50 (S. Josse, M. Billard, A. Verneau et L. Delpit). Et enfin 1 individu le 20/11 à Merville Franceville Plage/14 (JP. Marie).

Année record en 2017 avec au moins 18 individus après le record de 2016 avec 17 individus (1 en 2015).

## 6. Océanite culblanc - *Oceanodroma leucorhoa* (Vieillot, 1818)

6 fiches pour 7 individus, année exceptionnelle pour l'homologation de cette espèce rare !

1 individu le 6 octobre à Merville Franceville Plage/14 (M. Billard), 1 individu observé en condition exceptionnelle le 02 septembre à Ver sur mer/14 (A. Chartier), 1 individu le 13 septembre à Granville/50 (A.Trémion), 1 individu le 16 septembre au seawatch à Gatteville le Phare/50 (A.Verneau et *al.*), 2 individus le 22 octobre au seawatch à Gatteville le Phare/50 (A.Verneau et *al.*), 1 individu le 13 novembre au seawatch à Gatteville le Phare/50 (A.Verneau et J.P. Marie)

Océanite toujours rare jusqu'à cette année 2017 et non annuel (1 en 2016, aucun en 2015 et 1 en 2014).



Alain Chartier

**7. Puffin majeur – *Ardenna gravis* (O'Reilly, 1818)**

1 individu le 16 septembre à Gatteville le Phare/50 (S. Crestey, A. Guérard, L. Legrand *et al.*)

**8. Puffin cendré – *Calonectris diomedea* (Scopoli, 1769 )**

2 individus le 6 septembre à Gatteville le Phare/50 (S. Crestey et F. Malvaud)

**9. Blongios nain - *Ixobrychus minutus* (Linnaeus, 1766)**

Après un couple nicheur observé en 2014, aucun individu en 2015 et 2 mâles en 2016, 1 seul individu en 2017 : 1 le 3 juin à Val de Reuil/27 (C. Gérard)

**10. Crabier chevelu - *Ardeola ralloides* (Scopoli, 1769)**

1 individu le 21 mai à Heudreville/27 (G. et C. Caron).

Après l'année exceptionnelle en 2016, un retour à la normale pour cette espèce d'observation rare en Normandie.



Gaëlle Caron

**11. Ibis falcinelle - *Plegadis falcinellus* (Linnaeus, 1766)**

4 individus le 28/10 à Auvers/50 (J. Maroquesne), 2 le 03/12 à Pontaubault/50 (L. Heslouin) et 3 le 22/12 à Dragey-Ronthon/50 (P. Desgué)

Espèce régulière et annuelle depuis 2011 (3 en 2016, 3 en 2015, 5 en 2014).



Patrick Desgué

**12. Erismature rousse - *Oxyura jamaicensis* (J.F. Gmelin, 1789)**

1 mâle le 29 avril 2017 au Val de Reuil/27 (D.Basley) (9 oiseaux en 2016).

**13. Pygargue à queue blanche - *Haliaeetus albicilla* (Linnaeus, 1758)**

Le 22 janvier 2017, Christian Gérard découvre un adulte (+ 2 ans) à Léry-Poses/27. L'oiseau sera observé par de nombreux observateurs jusqu'au 22 février. Le 20 novembre 2017, 1 individu de premier hiver est observé par Joël Duvaleroy dans la réserve de chasse de Saint-Samson/14. Cet oiseau séjournera sur ce site jusqu'au 3 mars 2018. (1 oiseau en 2016 et 1 en 2015).



William Duvernoy

**14. Busard pâle - *Circus macrourus* (S.G. Gmelin, 1770)**

Un individu de premier hiver le 3 janvier 2017 à Beauvoir/50 (S.Provost). (2 oiseaux en 2016 et 2 en 2015).

**15. Faucon kobez - *Falco vespertinus* (Linnaeus, 1766)**

Un mâle première année, le 26 mai 2017 à Écrammeville/14 (Bernard Lericque). L'espèce est annuelle en Normandie depuis 2013.



Bernard Lericque

**16. Talève sultane -*Porphyrio porphyrio* (Linnaeus, 1758)**

Le 17 janvier, Didier Lavadoux, guide de la Baie détecte une talève dans la roselière de Genêts. Le 19 janvier puis le 20, l'oiseau sera de nouveau observé avec Sébastien Provost. Il s'agit de la seconde mention pour la Normandie (première en 1989 !).



Sébastien Provost

**17. Guignard d'Eurasie - *Charadrius morinellus* Linnaeus, 1758**

15 oiseaux en 2017 (3 en 2016, 6 en 2015). Un adulte le 6 mai 2017 à Anneville-sur-mer/50 (B. Chevalier), 12 le 7 mai 2017 à Cesseville/27 (P. Cornette), un adulte du 19 au 20 mai 2017 à Vauville (M.L. Travert), un adulte le 29 août 2017 à Gâprée/61 (F. Rose).



Marie-Léa Travert

**18. Bécasseau de Temminck - *Calidris temminckii* (Leisler, 1812)**

Petite année pour ce bécasseau annuel en Normandie, 8 oiseaux avaient été observés en 2016, 7 en 2015. Un adulte le 24 avril 2017 à Pontorson/50 (A. Hemon & B. Lecaplain).



Audrey Hemon



**19. Bécasseau tacheté - *Calidris melanotos* - (Vieillot, 1819)**

L'espèce n'avait pas été observée en Normandie depuis 2014 (2 individus), ce bécasseau a été annuel entre 2006 et 2014.

Un juvénile le 10 septembre 2017 à l'Espace naturel sensible des Ponts d'Ouve à Carentan-les-Marais/50, découvert par Guillaume Hédouin et revu le 25 septembre par William Duvernoy.



Guillaume Hédouin

**20. Phalarope à bec large - *Phalaropus fulicarius* (Linnaeus, 1758)**

Année record en Normandie (16 oiseaux) et plus particulièrement sur la côte Ouest du Cotentin (3 en 2016).

13 individus en septembre :

1 individu de premier hiver le 10 septembre 2017 à Montmartin-sur-mer/50 (R. Gillam *et al.*), 1 individu de premier hiver découvert le 10 septembre par Sébastien Provost à Bréhal/50, revu le 12 septembre par Armel Trémion, le 13 par Bruno Chevallier et les 16 et 17 septembre (2 individus) par Michel Leroux et Bruno Chevallier. 1 le 11 septembre 2017 à Vauville/50 (A. Verneau, S. Crestey). 3 à Auderville/50 le 11 et 12 septembre (A. Verneau, S. Crestey & L. Legrand) puis un oiseau, différent des trois, observé le lendemain et jusqu'au 16 septembre, 4 individus donc sur ce lieu. 2 adultes à Créances/50 et 1 adulte à Geffosses/50 le 13 septembre (B. Chevallier). 2 le 15 septembre au seawatch à Gatteville-le-Phare/50 (A. Verneau *et al.*). 1 individu premier hiver les 22 et 23 septembre 2017 à Gatteville-le-Phare/50 (C. Kérihuel)

Puis 1 individu de premier hiver le 30 octobre 2017 à Merville-Franceville/14 (JP. Marie), 1 individu du 10 au 27 octobre 2017 à Bréhal/50 (A. Trémion, M. Leroux & B. Chevallier) et 1 individu le 5 décembre 2017 à Saint-Marcouf/50 (R. Purenne & J. Jean-Baptiste).



James Jean-Baptiste

**21. Phalarope à bec étroit - *Phalaropus lobatus* (Linnaeus, 1758)**

Un adulte à une date classique pour l'espèce, le 21 août 2017 à Bréhal/50 (B.Chevalier). Il s'agit de la première mention depuis 2012.

**22. Labbe à longue queue - *Stercorarius longicaudus* Vieillot, 1819**

Deux juvéniles sont observés le 26 septembre lors d'une traversée en direction des îles de Saint-Marcouf/50 (P. Gachet, J. Jean-Baptiste, F. Letellier & R. Purenne). Aucune autre observation soumise au CHR de ce labbe en 2017 (4 oiseaux en 2016).



Philippe Gachet

**23. Mergule nain** - *Alle alle* (Linnaeus, 1758)

9 oiseaux observés lors de séances de seawatch sur un seul site : Gatteville-le-Phare/50. 1 le 11 novembre (S. Crestey, L. Legrand & A. Verneau), 4 le lendemain (JP. Marie & A. Verneau), 2 le 29 novembre (S. Crestey & F. Malvaud) et 2 le 1<sup>er</sup> décembre 2017 (S. Crestey).

Année moyenne pour cette espèce après des années records (3 oiseaux en 2016, 24 individus en 2015 et 14 en 2007).

**24. Sterne hansel** - *Gelochelidon nilotica* (J.F. Gmelin, 1789)

1 adulte le 7 mai à Quiberville/76 (Y. Carasco). L'espèce est rare en Normandie et non annuelle (2 oiseaux en 2015, 1 en 2011 puis 2 individus en 2005).

**25. Sterne caspienne** - *Hydroprogne caspia* (Pallas, 1770)


1 adulte le 11 juin à Bouafles/27, sur le plan d'eau des Mousseaux, découvert par Christian Gérard, observé le lendemain par Daniel Basley. 1 oiseau le 13 août au cap d'Antifer/76 (F. Branswyck). L'espèce est annuelle mais reste rare (1 en 2016 et 2015, 2 en 2014).



Daniel Basley

## 26. Goéland pontique - *Larus cachinnans* Pallas, 1811

Nouvelle année record avec 53 individus (32 en 2016 et 17 en 2015). Certains secteurs de Normandie sont bien fréquentés (voir carte suivante) et certains observateurs deviennent de vrais traqueurs de pontiques tels que Yann Carasco avec 20 individus et Tony Le Huu Nghia avec 18 oiseaux !



Localisation des observations en Normandie de Goéland pontique


Le premier oiseau, un adulte, est vu le 15 janvier à la carrière de Billy/14 (F. Leclerc), site bien connu pour ses rassemblements de laridés et ses goélands rares. Sur ce même lieu, Jean-Pierre Marie verra d'autres oiseaux jusqu'au 7 mars : un adulte et 2 immatures le 30 janvier, 2 oiseaux le 6 février, un adulte le 25 février et le dernier individu le 7 mars.

A Dives-sur-Mer, les goélands pontiques sont observés par Tony Le Huu Nghia entre janvier et novembre : 4 oiseaux entre janvier et mars et 4 oiseaux en octobre et novembre. Il observera également 8 oiseaux plus à l'Est à Pennedepie/14, uniquement entre août et octobre 2018. Entre le 17 septembre et le 3 décembre, 4 pontiques seront observés à Merville-Franceville-Plage (T. Le Huu Nghia & JP. Marie).

Le 11 mars, un oiseau est observé dans l'Eure à Poses par Yann Carasco. Ce même observateur aura détecté 14 oiseaux à Quiberville/76 entre le 7 mars et le 2 décembre 2017. Dans le même secteur, à Saint-Aubin-sur-Mer/76, ce sont 5 individus qui seront observés.

La donnée la plus à l'Ouest concerne un oiseau observé par James Jean-Baptiste à Port-en-Bessin/14. La donnée à la limite entre l'Orne et le Calvados (Crocly/14) provient de ce même observateur (9 décembre).

25 individus seront observés entre janvier et juin, principalement des oiseaux de premier hiver (15), quelques adultes et surtout en mars (voir graphique suivant). 28 pontiques seront identifiés entre août et décembre, surtout à partir de septembre.



Nombre d'individu observé par mois



Tony Le Huu Nghia

## 27. Goéland à ailes blanches - *Larus glaucooides* Meyer, 1822

Trois observations en 2017 (2 en 2016). Deux oiseaux de deuxième année au printemps, observés par Yann Carasco : 1 le 7 mars à Saint-Aubin-sur-Mer/76 et 1 le 28 mars à Quiberville. Le 12 décembre, François Leclerc observe un oiseau de second hiver au centre d'enfouissement technique de Billy/14. L'oiseau sera revu ensuite durant tout le mois de décembre (JP. Marie & J. Jean-Baptiste) et jusqu'au 3 février 2018. Long séjour pour cet oiseau sur un site qui accueillera en 2018 deux autres individus.



François Leclerc

**28. Goéland bourgmestre - *Larus hyperboreus* Gunnerus, 1767**

Deux oiseaux en 2017 (4 en 2016, aucun en 2015). 1 ind., probablement de 2<sup>ème</sup> année, à Gatteville-le-Phare/50 le 13 février (M. Leroux) et un oiseau de 2<sup>ème</sup> année le 21 mai à Quiberville/76 (Y. Carasco).

**29. Coucou-geai – *Clamator glandarius* (Linnaeus, 1758)**

A la demande de Sébastien Provost et avec l'accord et les informations de l'observateur, Gérard Debout, une donnée ancienne de coucou-geai a été examinée et validée. L'espèce a été observée le 30 avril 1974 dans le marais de la Claire-Douve à Dragey-Ronthon/50. Il s'agit de la seule donnée contemporaine de coucou-geai en Normandie.

**30. Grand-Duc d'Europe - *Bubo bubo* (Linnaeus, 1758)**

Mi-février, un cadavre est découvert à Saint-Germain-d'Étables/76 (Rollande & Catherine Mallet). L'oiseau est vraisemblablement mort par électrocution. Il s'agit de la seconde mention pour l'espèce après la découverte en 2015 d'un cadavre également dans ce même département. Une troisième donnée, datant de 2016, sera examinée prochainement par le CHR.

**31. Pie-grièche grise - *Lanius excubitor* Linnaeus, 1758**

2 oiseaux en 2017 (4 en 2016 et 6 en 2015). Thomas Domalain a pu observer une pie-grièche grise du 3 au 25 mars à Pommeréval/76 et Michel et Marie-Paule Delsaut au Marais Vernier/76 le 9 juillet.

**32. Pie-grièche à tête rousse - *Lanius senator* Linnaeus, 1758**

1 oiseau a été observé dans l'Orne à Sept-Forges par Christophe Girard le 9 juin 2017. 2 oiseaux avaient été identifiés en 2016, 1 en 2014 et 2 en 2013.

### 33. Corneille mantelée – *Corvus cornix* Linnaeus, 1758

Un individu a été détecté le 27 août 2017 à la mare de Tabot à Vicq-sur-Mer/50 par Alain Verneau puis revu avec Samuel Crestey le 29 août. L'oiseau est de nouveau observé le 13 novembre (JP Marie & A. Verneau) et jusqu'au 9 décembre (M. Billard, S. Poncet, J. Jean-Baptiste). L'espèce est très rare en Normandie, il s'agit seulement de la 5<sup>ème</sup> mention depuis la création du CHR. La dernière corneille mantelée avait été observée en 2011 à Vains (S. Provost).



James Jean-Baptiste

### 34. Rémiz penduline *Remiz pendulinus* (Linnaeus, 1758)

L'espèce n'est plus soumise à homologation dans les départements de l'Eure et de la Seine-Maritime, deux oiseaux avaient été observés en 2016 à Saint-Vigor d'Ymonville/76 mais aucun ailleurs en Normandie. En 2017, deux individus ont été contactés, le premier par Emmanuel Schmitt le 12 décembre à l'Espace naturel sensible des Ponts d'Ouve à Carentan-les-Marais/50, site où la rémiz a déjà été observée plusieurs fois. Le second par Jean-Pierre Marie le 27 décembre à Mondeville/14.

### 35. Alouette haussecol - *Eremophila alpestris* (Linnaeus, 1758)

Les oiseaux de Merville-Franceville-Plage/14 (voir précédent rapport CHR) ont été observés jusqu'au 10 avril avec un maximum de 4 le 25 mars (D.Lizoret). Ce petit groupe aura été observé par un grand nombre d'ornithologues (inds. découverts par T. Le Huu-Nghia, fiche de JP. Marie *et al.*).

Le groupe important (10 oiseaux) présent à Cosqueville/50 à partir d'octobre 2016 a été observé jusqu'en avril 2017 (J. Girard, S. Loiseau, JP. Marie, L. Delpit, A. Verneau, M. Billard, JP. Moulin, S. Crestey).



Jacques Rivière

Un oiseau sera observé par Alain Verneau et Anthony Guérard à Gatteville-le-Phare/50 le 25 novembre et le 19 décembre à Blainville-sur-Mer/50, ce sont 5 oiseaux qui seront découverts par Alain Livory et Roselyne Coulomb. 20 oiseaux en 2017, 16 en 2016 (record de 30 en 2013).

**36. Pouillot à grands sourcils - *Phylloscopus inornatus* (Blyth, 1842)**

Seulement 3 oiseaux en 2017 (15 en 2016, 4 en 2015). L'espèce est annuelle en Normandie, principalement en octobre. A rechercher sur la côte à l'automne. Premier oiseau capturé par Alexandre Corbeau à Merville-Franceville-Plage/14 le 14 octobre. 1 individu à Carolles/50 le 19 octobre et 1 le 27 octobre à Chausey/50, deux lieux classiques pour l'espèce observée par Sébastien Provost.



Alexandre Corbeau



**37. Pouillot ibérique** - *Phylloscopus ibericus* Ticehurst, 1937

1 mâle chanteur du 14 mai au 13 juin à Juvigny-sous-Andaines/61 (S. Lecocq), 7<sup>ème</sup> mention régionale.

**38. Pouillot de Bonelli** - *Phylloscopus bonelli* (Vieillot, 1819)

1 oiseau à Crocy/61 du 20 mai au 21 juin 2017 (J. Jean-Baptiste *et al.*). Il s'agit seulement de la seconde mention régionale contemporaine validée par le CHR (première en 2012).

**39. Tichodrome échelette** – *Tichodroma muraria* (Linnaeus, 1766)

Deux observations en 2017 concernant un site désormais presque habituel pour l'espèce : la cathédrale de Coutances. Le 11 février, Martin Billard observe un oiseau qui sera revu par de nombreux observateurs jusqu'au 14 mars. Fin décembre, c'est Dimitri Aubert qui remarque un oiseau au même endroit, il sera observé jusqu'au 17 février 2018. En 2016, le tichodrome avait également été observé sur la cathédrale de Coutances mais l'observation n'a pas été soumise à homologation. C'est également le cas pour la plumée trouvée au pied de la cathédrale de Bayeux. La dernière observation validée par le CHR date de 2014, à Coutances, cette fois ci aux Unelles.

**40. Accenteur alpin** - *Prunella collaris* (Scopoli, 1769)

Le CHR a examiné une observation d'accenteur alpin réalisé par Pascal et Sébastien Provost le 31 octobre 1998 à Chausey. Hormis les mentions signalées dans le précédent rapport et datant du XIXe siècle, il s'agit donc de la première donnée contemporaine pour cette espèce en Normandie. 1 oiseau a été détecté en 2016.

**41. Sizerin flammé (boréal)** – *Acanthis flammea* (Linnaeus, 1758)

Le sizerin flammé a fait son entrée dans la liste CHR en 2016. Il a été récemment séparé du sizerin cabaret - *Acanthis cabaret* (observé classiquement dans notre région). Une seule donnée a été examinée par le CHR pour l'année 2017, deux autres fiches transmises tardivement seront discutées dans la circulaire de 2018. 2 oiseaux ont été identifiés par Jean-Pierre Marie à Bénouville/14 le 17 décembre.



Jean-Pierre Marie

**42. Bergeronnette d'Italie - *Motacilla flava cinereocapilla* Savi, 1831**

1 mâle observé à Huisne-sur-Mer/50 par Sébastien Provost le 29 avril 2017. Cette sous-espèce de la bergeronnette printanière n'avait pas été observée en Normandie depuis 2000.



Sébastien Provost

**43. Pipit de Richard - *Anthus richardi* Vieillot, 1818**

5 oiseaux en 2017 (comme en 2016 et 2015). Le premier pipit est détecté par Sébastien Provost à Vains/50 le 8 octobre. Le site des falaises de Carolles/50 regroupe ensuite trois observations d'oiseau en migration : le 17 et 18 octobre et le 3 novembre (S. Provost & A. Trémion). Le 22 octobre, un individu est identifié par Jacques Girard sur les pelouses littorales de Criqueville-en-Bessin/14, il sera observé le lendemain au même endroit (JP. Marie & JP. Moulin). Pas d'hivernage cette année de ce passereau régulier en Normandie. Les dates de 2017 sont classiques pour un passage migratoire.

**44. Pipit rousseline - *Anthus campestris* (Linnaeus, 1758)**

1 oiseau observé à une date classique pour l'espèce, le 22 septembre à Pirou/50 (B. Chevallier).

Seule mention régionale en 2017 en dehors du site de migration de Carolles/50 où 5 oiseaux ont été notés en migration active (14 en 2016). Dans le précédent bilan CHR, il était mentionné qu'aucun oiseau n'avait été observé en migration en 2016 au cap de la Hève (Sainte-Adresse/76), en fait ce sont deux oiseaux qui ont été détectés : 1 le 7 octobre (G. de Smet) et 1 le lendemain (Y. Jacob & M. Simon).

**Fiches non homologuées :** principalement dû à des descriptions trop courtes (même après rappel) qui n'ont pas permis d'exclure des espèces voisines ou des erreurs d'identification ou bien à cause d'absence de critères fondamentaux.

**Cygne chanteur** - *Cygnus cygnus* (Linnaeus, 1758)

80-120 oiseaux en vol au dessus de Caen le 23 septembre. Description insuffisante.

**Flamant rose** - *Phoenicopterus roseus* Pallas, 1811

1 à Genêts/50 le 17 septembre. Il s'agit en fait du flamant des Caraïbes (*Phoenicopterus ruber* Linnaeus, 1758) d'origine captive.

**Elanion blanc** - *Elanus caeruleus* (Desfontaines, 1789)

1 à Brucourt/14 le 4 octobre. Absence de description.

**Pygargue à queue blanche** - *Haliaeetus albicilla* (Linnaeus, 1758)

1 à Basseneville/14 le 31 octobre. Description insuffisante.

**Circaète Jean-le-Blanc** - *Circaetus gallicus* (J.F. Gmelin, 1788)

1 le 2 mai à Saint-Denis-sur-Sarthon/61. Description trop succincte.

**Buse pattue** - *Buteo lagopus* (Pontoppidan, 1763)

1 à Donnay/14 le 9 décembre. Il manque des critères importants pour pouvoir confirmer l'espèce.

**Bécasseau tacheté** - *Calidris melanotos* - (Vieillot, 1819)

2 le 24 septembre au Val-de-Reuil/27. Description trop succincte.

**Goéland pontique** - *Larus cachinnans* Pallas, 1811

1 individu au Val-de-Reuil/27 le 18 novembre. Description trop succincte.

**Alouette haussecol** - *Eremophila alpestris* (Linnaeus, 1758)

1 à Merville-Franceville-Plage/14 le 24 novembre. Absence de description.

**Gobemouche nain** - *Ficedula parva* (Bechstein, 1794)

3 individus à Sées/61 le 25 avril. Il manque des éléments pour valider cette observation qui serait remarquable !

**Pouillot de Bonelli** - *Phylloscopus bonelli* (Vieillot, 1819)

1 à Saint-Pierre-d'Entremont/61. Description trop succincte.

**Espèces occasionnelles signalées en Normandie en 2017, validées par le CHN** (Reeber, Blanc, Jiguet et le CHN, 2018) :

**Oie à bec court** - *Anser brachyrhynchus* Baillon, 1833 : 1 à Saint-Pair-sur-Mer/50 du 13 novembre au 28 décembre (M. Leroux). 2 le 26 novembre à Merville-Franceville-Plage/14 (JP. Marie).

**Sterne élégante** - *Sterna elegans* (Gambel, 1849) : Merville-Franceville-Plage/14 le 25 juillet (W. Duvernoy, JP. Marie).

**Sterne royale** - *Sterna maxima* (Boddaert, 1783) : Saint-Pair-sur-Mer et Genêts/50 du 10 au 17 juillet (X. Corteel, S. Provost, A. Trémion *et al.*). Sous-espèce américaine *maxima*.

**Bécasseau à cou roux** - *Calidris ruficollis* (Pallas, 1776) : 1 adulte à Dragey-Ronthon/50 le 6 et 7 août (S. Provost *et al.*).

**Pie-grièche isabelle** - *Lanius isabellinus* Hemprich & Ehrenberg, 1833 : 1 juvénile à Merville-Franceville-Plage/14 le 14 octobre (JA. Lenègre *fide* J. Jean-Baptiste).

**Linotte à bec jaune** - *Carduelis flavirostris* (Linnaeus, 1758) : 1 à Vrasville/50, du 24 décembre 2016 au 17 février 2017 (A. Verneau, A. Guérard, JP. Marie *et al.*).

## 2016

**Oie à bec court** - *Anser brachyrhynchus* Baillon, 1833 : 2 le 26 novembre à Merville-Franceville-Plage/14 (JP. Marie).

**Sarcelle à ailes vertes** - *Anas carolinensis* J.F. Gmelin, 1789 : 1 à Merville-Franceville-Plage/14 le 17 mars 2016.

**Marouette de baillon** - *Zapornia pusilla* (Pallas, 1776) : 1 première année capturée le 6 août à Genêts/50 (S. Provost, H. Touzé *et al.*) et 1 autre première année le 7 et 8 septembre à Pontorson/50 (A. Hemon).

**Bécasseau de Baird** - *Calidris bairdii* (Coues, 1861) : 1 juvénile du 8 au 11 novembre à Cosqueville/50 (JF. Blanc, K. Schmale *et al.*).

**Bécasseau rousset** - *Calidris subruficollis* (Vieillot, 1819) : 1 le 11 mai à Merville Franceville Plage/14 (JP. Mouliin).

**Remerciements** : Les membres du CHR Normandie remercient vivement tous les ornithologues qui transmettent leurs fiches descriptives et photographies, permettant ainsi d'assurer une « traçabilité » des observations d'oiseaux rares en Normandie. Merci également au bureau du GONm de nous avoir accueillis au siège régional de Caen pour la réunion annuelle.

**Comité d'Homologation Régional de Normandie (GONm) :**  
[chr.normandie@gmail.com](mailto:chr.normandie@gmail.com)

**Bibliographie :**

**Reeber, S. & Blanc J.F. Jiguet F. & le CHN.** (2016). Les oiseaux rares en France en 2016 et 2017. 34<sup>ème</sup> rapport du Comité d'Homologation National. *Ornithos* 23-6 : 321-369.



Pygargue à queue blanche, Saint-Samson/14 (photo : William Duvernoy)

**LISTE DES ESPECES SOUMISES A HOMOLOGATION EN NORMANDIE (GONm)**

*D'après la « Liste officielle des Oiseaux de France », édition 2016 (catégories A, B et C) - Commission de l'Avifaune Française (CAF)*

*Notez que toutes les autres espèces plus rares ne figurant pas encore sur la liste des oiseaux de Normandie sont aussi à soumettre au CHR*

Nom vernaculaire	Nom scientifique	Descripteur	Anciens noms	Catégories de la CAF
Cygne de Bewick	<i>Cygnus columbianus</i>	(Ord, 1815)		A
Cygne chanteur	<i>Cygnus cygnus</i>	(Linnaeus, 1758)	Cygne sauvage	A
<b>Oie à bec court</b>	<b><i>Anser brachyrhynchus</i></b>	<b>Baillon, 1833</b>		<b>A</b>
<b>Oie naine</b>	<b><i>Anser erythropus</i></b>	<b>(Linnaeus, 1758)</b>		<b>A</b>
<b>Oie des neiges</b>	<b><i>Anser caerulescens</i></b>	<b>(Linnaeus, 1758)</b>	<b>Oie blanche, Grande oie des neiges</b>	<b>BD</b>
Bernache cravant du Pacifique	<i>Branta bernicla nigricans</i>	(Lawrence, 1846)	Bernache du Pacifique	A
<b>Bernache à cou roux</b>	<b><i>Branta ruficollis</i></b>	<b>(Pallas, 1769)</b>		<b>A</b>
<b>Canard à front blanc</b>	<b><i>Anas americana</i></b>	<b>J.F. Gmelin, 1789</b>	<b>Canard d'Amérique</b>	<b>A</b>
<b>Sarcelle à ailes vertes</b>	<b><i>Anas carolinensis</i></b>	<b>J.F. Gmelin, 1789</b>	<b>Sarcelle de la Caroline</b>	<b>A</b>
<b>Canard noir</b>	<b><i>Anas rubripes</i></b>	<b>Brewster, 1902</b>		<b>A</b>
<b>Sarcelle à ailes bleues</b>	<b><i>Anas discors</i></b>	<b>Linnaeus, 1766</b>		<b>A</b>
<b>Sarcelle marbrée</b>	<b><i>Marmaronetta angustirostris</i></b>	<b>(Ménétries, 1832)</b>		<b>A</b>
Fuligule à bec cerclé	<i>Aythya collaris</i>	(Donovan, 1809)		A
Fuligule nyroca	<i>Aythya nyroca</i>	(Güldenstädt, 1770)		A
<b>Eider à tête grise</b>	<b><i>Somateria spectabilis</i></b>	<b>(Linnaeus, 1758)</b>		<b>A</b>
Harelde boréale	<i>Clangula hyemalis</i>	(Linnaeus, 1758)	Harelde de Miquelon, Harelde kakawi	A
<b>Macreuse à bec jaune</b>	<b><i>Melanitta americana</i></b>	<b>(Swainson, 1832)</b>	<b>Macreuse d'Amérique</b>	<b>A</b>
<b>Garrot d'islande</b>	<b><i>Bucephala islandica</i></b>	<b>(J.F. Gmelin, 1789)</b>		<b>A</b>
Erismature rousse	<i>Oxyura jamaicensis</i>	(J.F. Gmelin, 1789)		A
<b>Erismature à tête blanche</b>	<b><i>Oxyura leucocephala</i></b>	<b>(Scopoli, 1769)</b>		<b>A</b>
<b>Plongeon à bec blanc</b>	<b><i>Gavia adamsii</i></b>	<b>(Gray, 1859)</b>		<b>A</b>
<b>Albatros à sourcils noirs</b>	<b><i>Thalassarche melanophris</i></b>	<b>Temminck, 1828</b>		<b>A</b>
Puffin cendré	<i>Calonectris borealis</i>	(Cory, 1881)		A
Puffin majeur	<i>Puffinus gravis</i>	(O'Reilly, 1818)		A
Océanite culblanc	<i>Oceanodroma leucorhoa</i>	(Vieillot, 1818)	Pétrel tempête à culblanc	A
<b>Cormoran pygmée</b>	<b><i>Phalacrocorax pygmaeus</i></b>	<b>(Pallas, 1773)</b>		<b>A</b>
<b>Pélican blanc</b>	<b><i>Pelecanus onocrotalus</i></b>	<b>Linnaeus, 1758</b>		<b>A</b>
Blongios nain	<i>Ixobrychus minutus</i>	(Linnaeus, 1766)		A
Crabier chevelu	<i>Ardeola ralloides</i>	(Scopoli, 1769)	Héron crabier	A
Ibis falcinelle	<i>Plegadis falcinellus</i>	(Linnaeus, 1766)		A
Flamant rose	<i>Phoenicopterus roseus</i>	Pallas, 1811		A
<b>Grèbe à bec bigarré</b>	<b><i>Podilymbus podiceps</i></b>	<b>(Linnaeus, 1758)</b>		<b>A</b>
Elanion blanc	<i>Elanus caeruleus</i>	(Desfontaines, 1789)	Elanion blanc	A
Pygargue à queue blanche	<i>Haliaeetus albicilla</i>	(Linnaeus, 1758)		A
Gypaète barbu	<i>Gypaetus barbatus</i>	(Linnaeus, 1758)		A
Vautour fauve	<i>Gyps fulvus</i>	(Habliz, 1783)		A
Vautour moine	<i>Aegypius monachus</i>	(Linnaeus, 1766)		A
Circaète Jean-le-Blanc	<i>Circaetus gallicus</i>	(J.F. Gmelin, 1788)		A
Busard pâle	<i>Circus macrourus</i>	(S.G. Gmelin, 1770)		A
<b>Buse féroce</b>	<b><i>Buteo rufinus</i></b>	<b>(Cretzschmar, 1829)</b>		<b>A</b>
Buse pattue	<i>Buteo lagopus</i>	(Pontoppidan, 1763)		A
<b>Aigle criard</b>	<b><i>Aquila clanga</i></b>	<b>(Pallas, 1811)</b>		<b>A</b>
<b>Aigle pomarin</b>	<b><i>Aquila pomarina</i></b>	<b>(Brehm, 1831)</b>		<b>A</b>
Aigle botté	<i>Aquila pennata</i>	(J.F. Gmelin, 1788)		A
Aigle royal	<i>Aquila chrysaetos</i>	(Linnaeus, 1758)		A
Marouette poussin	<i>Zapornia parva</i>	(Scopoli, 1769)		A
<b>Marouette de baillon</b>	<b><i>Zapornia pusilla</i></b>	<b>(Pallas, 1776)</b>		<b>A</b>
Talève sultane	<i>Porphyrio porphyrio</i>	(Linnaeus, 1758)		AC
<b>Grue demoiselle</b>	<b><i>Grus virgo</i></b>	<b>(Linnaeus, 1758)</b>		<b>A</b>
Outarde canepetière	<i>Tetrax tetrax</i>	(Linnaeus, 1758)		A
<b>Outarde Barbue</b>	<b><i>Otis tarda</i></b>	<b>Linnaeus, 1758</b>	<b>Grande outarde</b>	<b>A</b>
Guignard d'Eurasie	<i>Charadrius morinellus</i>	Linnaeus, 1758	Pluvier guignard	A
<b>Gravelot kildir</b>	<b><i>Charadrius vociferus</i></b>	<b>Linnaeus, 1758</b>		<b>A</b>
<b>Vanneau sociable</b>	<b><i>Vanellus gregarius</i></b>	<b>(Pallas, 1777)</b>		<b>A</b>

<b>Gravelot mongol</b>	<i>Charadrius mongolus</i>	<b>Pallas, 1776</b>		<b>A</b>
<b>Bécasseau falcinelle</b>	<i>Calidris falcinellus</i>	<b>(Pontoppidan, 1763)</b>		<b>A</b>
<b>Bécasseau à cou roux</b>	<i>Calidris ruficollis</i>	<b>(Pallas, 1776)</b>	<b>Bécasseau à col roux</b>	<b>A</b>
Bécasseau de Temminck	<i>Calidris temminckii</i>	(Leisler, 1812)		A
<b>Bécasseau de Baird</b>	<i>Calidris bairdii</i>	<b>(Coues, 1861)</b>		<b>A</b>
<b>Bécasseau de Bonaparte</b>	<i>Calidris fuscicollis</i>	<b>(Vieillot, 1819)</b>		<b>A</b>
<b>Bécasseau rousset</b>	<i>Calidris subruficollis</i>	<b>(Vieillot, 1819)</b>		<b>A</b>
Bécasseau tacheté	<i>Calidris melanotos</i>	(Vieillot, 1819)		A
<b>Bécasseau semipalmé</b>	<i>Calidris pusilla</i>	<b>(Linnaeus, 1766)</b>		<b>A</b>
<b>Phalarope de Wilson</b>	<i>Phalaropus tricolor</i>	<b>(Vieillot, 1819)</b>		<b>A</b>
Phalarope à bec étroit	<i>Phalaropus lobatus</i>	(Linnaeus, 1758)		A
Phalarope à bec large	<i>Phalaropus fulicarius</i>	(Linnaeus, 1758)		A
<b>Chevalier bargette</b>	<i>Xenus cinereus</i>	<b>(Guldenstädt, 1775)</b>		<b>A</b>
<b>Chevalier grivelé</b>	<i>Actitis macularius</i>	<b>(Linnaeus, 1766)</b>		<b>A</b>
<b>Chevalier criard</b>	<i>Tringa melanoleuca</i>	<b>(J.F. Gmelin, 1789)</b>	<b>Grand chevalier à pattes jaunes</b>	<b>A</b>
<b>Chevalier à pattes jaunes</b>	<i>Tringa flavipes</i>	<b>(J.F. Gmelin, 1789)</b>	<b>Petit chevalier à pattes jaunes</b>	<b>A</b>
Chevalier stagnatile	<i>Tringa stagnatilis</i>	(Bechstein, 1803)		A
<b>Bécassin à long bec</b>	<i>Limnodromus scolopaceus</i>	<b>(Say, 1823)</b>		<b>A</b>
<b>Bécassine double</b>	<i>Gallinago media</i>	<b>(Latham, 1787)</b>		<b>A</b>
Glaréole à collier	<i>Glareola pratincola</i>	(Linnaeus, 1766)		A
Labbe à longue queue	<i>Stercorarius longicaudus</i>	Vieillot, 1819		A
Macareux moine	<i>Fratercula arctica</i>	(Linnaeus, 1758)		A
<b>Guillemot à miroir</b>	<i>Cephus grylle</i>	<b>(Linnaeus, 1758)</b>		<b>A</b>
Mergule nain	<i>Alle alle</i>	(Linnaeus, 1758)		A
<b>Sterne fuligineuse</b>	<i>Onychoprion fuscatus</i>	<b>(Linnaeus, 1766)</b>		<b>A</b>
Sterne hansel	<i>Gelochelidon nilotica</i>	(J.F. Gmelin, 1789)		A
Sterne caspienne	<i>Hydroprogne caspia</i>	(Pallas, 1770)		A
Guifette moustac	<i>Chlidonias hybrida</i>	(Pallas, 1811)		A
Guifette leucoptère	<i>Chlidonias leucopterus</i>	(Temminck, 1815)		A
<b>Sterne élégante</b>	<i>Sterna elegans</i>	<b>Gambel, 1849)</b>		<b>A</b>
<b>Sterne voyageuse</b>	<i>Sterna bengalensis</i>	<b>(Lesson, 1831)</b>		<b>A</b>
<b>Sterne de Forster</b>	<i>Sterna forsteri</i>	<b>Nuttall, 1834</b>		<b>A</b>
Sterne de Dougall	<i>Sterna dougallii</i>	Montagu, 1813		A
<b>Mouette blanche</b>	<i>Pagophila eburnea</i>	<b>(Phipps, 1774)</b>		<b>A</b>
<b>Mouette atricille</b>	<i>Larus atricilla</i>	<b>(Linnaeus, 1758)</b>		<b>A</b>
<b>Mouette de Franklin</b>	<i>Larus pipixcan</i>	<b>(Wagler, 1831)</b>		<b>A</b>
Goéland d'Audouin	<i>Larus audouinii</i>	(Payraudeau, 1826)		A
Goéland à bec cerclé	<i>Larus delawarensis</i>	Ord, 1815		A
Goéland pontique	<i>Larus cachinnans</i>	Pallas, 1811		A
Goéland à ailes blanches	<i>Larus glaucooides</i>	Meyer, 1822	Goéland arctique	A
Goéland bourgmestre	<i>Larus hyperboreus</i>	Gunnerus, 1767		A
Coucou-geai	<i>Clamator glandarius</i>	(Linnaeus, 1758)		A
<b>Coulicou à bec jaune</b>	<i>Coccyzus americanus</i>	<b>(Linnaeus, 1758)</b>		<b>A</b>
Petit-duc scops	<i>Otus scops</i>	(Linnaeus, 1758)	Coucou petit-duc	A
<b>Harfang des neiges</b>	<i>Bubo scandiacus</i>	<b>(Linnaeus, 1758)</b>		<b>A</b>
Grand-Duc d'Europe	<i>Bubo bubo</i>	(Linnaeus, 1758)	Hibou grand-duc	A
Martinet à ventre blanc	<i>Apus melba</i>	(Linnaeus, 1758)	Martinet alpin	A
Rollier d'Europe	<i>Coracias garrulus</i>	Linnaeus, 1758		A
Faucon kobez	<i>Falco vespertinus</i>	Linnaeus, 1766		A
<b>Faucon lanier</b>	<i>Falco biarmicus</i>	<b>Temminck, 1825</b>		<b>A</b>
<b>Faucon sacre</b>	<i>Falco cherrug</i>	<b>Gray, 1834</b>		<b>A</b>
<b>Faucon gerfaut</b>	<i>Falco rusticolus</i>	<b>Linnaeus, 1758</b>		<b>A</b>
Pie-grièche à poitrine rose	<i>Lanius minor</i>	J.F. Gmelin, 1788		A
Pie-grièche grise	<i>Lanius excubitor</i>	Linnaeus, 1758		A
Pie-grièche à tête rousse	<i>Lanius senator</i>	Linnaeus, 1758		A
Crave à bec rouge	<i>Pyrhocorax pyrrhocorax</i>	(Linnaeus, 1758)		A
Cassenoix moucheté	<i>Nucifraga caryocatactes</i>	(Linnaeus, 1758)		A
Corneille mantelée	<i>Corvus cornix</i>	Linnaeus, 1758		A
Rémiz penduline (2)	<i>Remiz pendulinus</i>	(Linnaeus, 1758)		A
Alouette haussecol	<i>Eremophila alpestris</i>	(Linnaeus, 1758)		A
Alouette calandrelle	<i>Calandrella brachydactyla</i>	Leisler, 1814		A
Hirondelle de rochers	<i>Ptyonoprogne rupestris</i>	(Scopoli, 1769)		A

Hirondelle rousseline	<i>Cecropis daurica</i>	(Laxmann, 1769)		A
<b>Pouillot de Pallas</b>	<b><i>Phylloscopus proregulus</i></b>	<b>(Pallas, 1811)</b>		<b>A</b>
Pouillot à grands sourcils	<i>Phylloscopus inornatus</i>	(Blyth, 1842)		A
<b>Pouillot de Hume</b>	<b><i>Phylloscopus humei</i></b>	<b>(Brooks, 1878)</b>		<b>A</b>
<b>Pouillot brun</b>	<b><i>Phylloscopus fuscatus</i></b>	<b>(Blyth, 1842)</b>		<b>A</b>
Pouillot de Bonelli	<i>Phylloscopus bonelli</i>	(Vieillot, 1819)		A
Pouillot de Sibérie (4)	<i>Phylloscopus collybita tristis</i>	Blyth, 1843	Pouillot véloce de Sibérie	A
Pouillot ibérique	<i>Phylloscopus ibericus</i>	Ticehurst, 1937		A
<b>Fauvette épervière</b>	<b><i>Sylvia nisoria</i></b>	<b>(Bechstein, 1792)</b>		<b>A</b>
Fauvette mélanocéphale	<i>Sylvia melanocephala</i>	(J.F. Gmelin, 1789)		A
Fauvette passerinette	<i>Sylvia cantillans</i>	(Pallas, 1764)		A
Hypolaïs ictérine	<i>Hippolaïs icterina</i>	(Vieillot, 1817)		A
Phragmite aquatique (5)	<i>Acrocephalus paludicola</i>	(Vieillot, 1817)		A
<b>Rousserolle isabelle</b>	<b><i>Acrocephalus agricola</i></b>	<b>(Jerdon, 1845)</b>		<b>A</b>
<b>Rousserolle des buissons</b>	<b><i>Acrocephalus dumetorum</i></b>	<b>Blyth, 1849</b>		<b>A</b>
Rousserolle turdoïde	<i>Acrocephalus arundinaceus</i>	(Linnaeus, 1758)		A
Jaseur boréal	<i>Bombycilla garrulus</i>	(Linnaeus, 1758)		A
Tichodrome échelette	<i>Tichodroma muraria</i>	(Linnaeus, 1766)		A
Etourneau unicolore	<i>Sturnus unicolor</i>	Temminck 1820		A
Etourneau roselin	<i>Pastor roseus</i>	(Linnaeus, 1758)		A
Cingle plongeur	<i>Cinclus cinclus</i>	(Linnaeus, 1758)		A
<b>Grive dorée</b>	<b><i>Zoothera dauma</i></b>	<b>(Latham, 1790)</b>		<b>A</b>
<b>Robin à flancs roux</b>	<b><i>Tarsiger cyanurus</i></b>	<b>(Pallas, 1773)</b>		<b>A</b>
Gobemouche nain	<i>Ficedula parva</i>	(Bechstein, 1794)		A
Gobemouche à collier	<i>Ficedula albicollis</i>	(Temminck, 1815)		A
Monticole de roche	<i>Monticola saxatilis</i>	(Linnaeus, 1766)	Merle de roche	A
<b>Tarier de Sibérie</b>	<b><i>Saxicola maurus</i></b>	<b>(Pallas, 1773)</b>		<b>A</b>
Traquet oreillard	<i>Oenanthe hispanica</i>	(Linnaeus, 1758)		A
<b>Traquet du désert</b>	<b><i>Oenanthe deserti</i></b>	<b>(Temminck, 1825)</b>		<b>A</b>
Accenteur alpin	<i>Prunella collaris</i>	(Scopoli, 1769)		A
<b>Moineau espagnol</b>	<b><i>Passer hispaniolensis</i></b>	<b>(Temminck, 1820)</b>		<b>A</b>
Bergeronnette nordique	<i>Motacilla flava thunbergi</i>	Billberg, 1828	Bergeronnette printanière nordique	A
Bergeronnette d'Italie	<i>Motacilla flava cinereocapilla</i>	Savi, 1831	Bergeronnette printanière d'Italie	A
<b>Bergeronnette citrine</b>	<b><i>Motacilla citreola</i></b>	<b>Pallas, 1776</b>		<b>A</b>
Pipit de Richard (3)	<i>Anthus richardi</i>	Vieillot, 1818		A
<b>Pipit de Godlewski</b>	<b><i>Anthus godlewskii</i></b>	<b>Taczanowski, 1876</b>		<b>A</b>
Pipit rousseline (1)	<i>Anthus campestris</i>	(Linnaeus, 1758)		A
<b>Pipit à dos olive</b>	<b><i>Anthus hodgsoni</i></b>	<b>Richmond, 1907</b>		<b>A</b>
Pipit à gorge rousse	<i>Anthus cervinus</i>	(Pallas, 1811)		A
<b>Roselin cramoisi</b>	<b><i>Erythrina erythrina</i></b>	<b>(Pallas, 1770)</b>		<b>A</b>
<b>Roselin githagine</b>	<b><i>Bucanetes githagineus</i></b>	<b>(Lichtenstein, 1823)</b>		<b>A</b>
<b>Linotte à bec jaune</b>	<b><i>Carduelis flavirostris</i></b>	<b>(Linnaeus, 1758)</b>		<b>A</b>
Sizerin flammé	<i>Acanthis flammea</i>	(Linnaeus, 1758)	Sizerin flammé boréal	A
<b>Sizerin blanchâtre</b>	<b><i>Acanthis hornemanni</i></b>	<b>(Holboell, 1843)</b>		<b>A</b>
<b>Bruant à couronne blanche</b>	<b><i>Zonotrichia leucophrys</i></b>	<b>(Forster, 1772)</b>		<b>A</b>
<b>Bruant mélanocéphale</b>	<b><i>Emberiza melanocephala</i></b>	<b>Scopoli, 1769</b>		<b>A</b>
Bruant fou	<i>Emberiza cia</i>	Linnaeus, 1766		A
Bruant ortolan (3)	<i>Emberiza hortulana</i>	Linnaeus, 1758		A
<b>Bruant à calotte blanche</b>	<b><i>Emberiza leucocephalos</i></b>	<b>S.G. Gmelin, 1771</b>		<b>A</b>
<b>Bruant nain</b>	<b><i>Emberiza pusilla</i></b>	<b>Pallas, 1776</b>		<b>A</b>

**Mise à Jour : 02/2019**

*en gras, les espèces soumises au CHN et en gris les sous-espèces)*

(1) sauf pour les falaises de Carolles et le cap de la Hève.

(2) sauf les départements de Seine-Maritime (76) et Eure (27) depuis le 1er janvier 2013.

(3) une fiche globale saisonnière pour les sites de Carolles et du cap de la Hève.

(4) avec enregistrement du cris et/ou chant

(5) uniquement les données hors capture/baguage

**Catégorie A** = Espèces présentes à l'état sauvage en France métropolitaine y compris la frange maritime (Zone Économique Exclusive), observées au moins une fois depuis 1950 et dont l'origine naturelle est considérée comme la plus probable au moins pour un individu

**Catégorie B** = Espèces observées à l'état sauvage sur la même aire géographique, mais qui n'ont pas été revues depuis 1950.

**Catégorie C** = Espèces introduites ou échappées de captivité en France métropolitaine depuis plusieurs années, qui ont fait souche et dont au moins une population se maintient par reproduction en milieu naturel, indépendamment d'éventuels apports supplémentaires d'origine humaine

**LISTE DES ESPÈCES SOUMISES À HOMOLOGATION EN NORMANDIE (GONm)**

*D'après la « Liste officielle des Oiseaux de France », édition 2016 (catégories D et E) - Commission de l'Avifaune Française (CAF)*

*Notez que toutes les autres espèces plus rares ne figurant pas encore sur la liste des oiseaux de Normandie sont aussi à soumettre au CHR*

Nom vernaculaire	Nom scientifique	Descripteur	Anciens noms	Catégories de la CAF
Canard à faucilles	<i>Anas falcata</i>	Georgi, 1775		D
Arlequin plongeur	<i>Histrionicus histrionicus</i>	(Linnaeus, 1758)	Canard arlequin, Garrot Arlequin	D
Pélican frisé	<i>Pelecanus crispus</i>	Bruch, 1832		D
Flamant nain	<i>Phoenicopterus minor</i>	G.R. Gray, 1869		D
Vanneau éperonné	<i>Vanellus spinosus</i>	(Linnaeus, 1758)		D
Tourterelle maillée	<i>Streptopelia senegalensis</i>	(Linnaeus 1766)		D
Corbeau familier	<i>Corvus splendens</i>	Vieillot, 1817		D
Carouge à tête jaune	<i>Xanthocephalus xanthocephalus</i>	(Bonaparte, 1826)		D
Bernache de Hutchins	<i>Branta hutchinsii</i>	(Richardson, 1832)		E
Sarcelle cannelle	<i>Anas cyanoptera</i>	Vieillot, 1816		E
Fuligule à dos blanc	<i>Aythya valisineria</i>	(Wilson, 1814)		E
Harle couronné	<i>Lophodytes cucullatus</i>	(Linnaeus, 1758)		E
Albatros hurleur	<i>Diomedea exulans</i>	Linnaeus, 1758		E
Damier du Cap	<i>Daption capense</i>	(Linnaeus, 1758)		E
Pélican gris	<i>Pelecanus rufescens</i>	Gmelin, 1789		E
Spatule d'Afrique	<i>Platalea alba</i>	Scopoli, 1786		E
Buse de Swainson	<i>Buteo swainsoni</i>	Bonaparte, 1838		E
Vautour de Rüppell	<i>Gyps rueppelli</i>	(Brehm, 1852)		E
Talève à tête grise	<i>Porphyrio porphyrio poliocephalus</i>	(Latham, 1801)	Talève sultane à tête grise	E
Pluvian fluviatile	<i>Pluvianus aegyptius</i>	(Linnaeus 1758)		E
Faucon de l'Amour	<i>Falco amurensis</i>	Radde, 1863		E
Faucon de Barbarie	<i>Falco pelegrinoides</i>	Temminck, 1829		E
Corbeau familier	<i>Corvus splendens</i>	Vieillot, 1817		E
Calliope sibérienne	<i>Luscinia calliope</i>	(Pallas, 1776)		E
Gobemouche narcisse	<i>Ficedula narcissina</i>	Temminck, 1836		E
Etourneau soyeux	<i>Sturnus sericeus</i>	J.F. Gmelin, 1789	<i>Spodiopsar sericeus</i>	E
Roselin de Lichtenstein	<i>Rhodopechys obsoleta</i>	(Lichtenstein, 1823)	<i>Rhodospiza obsoleta</i>	E
Roselin pourpre	<i>Carpodacus purpureus</i>	(Gmelin, 1789)	<i>Haemorhous purpureus</i>	E
Bruant élégant	<i>Emberiza elegans</i>	Temminck, 1836		E

*en gras, les espèces soumises au CHN (toutes celles des catégories D et E)*

**Catégorie D** = Espèces pour lesquelles il existe au moins une mention dont l'origine naturelle est possible, mais cependant pas la plus probable compte tenu des informations disponibles. L'arrivée de ces espèces en France métropolitaine a pu être aidée volontairement par l'Homme ou bien il s'agit d'échappés de captivité.

**Catégorie E** = Espèces supposées d'origine captive, mentionnées dans la littérature comme ayant été vues dans la nature en France métropolitaine



## Comité d'Homologation Régional

Fiche descriptive pour l'observation d'une espèce occasionnelle en Normandie  
à retourner à : [chr.normandie@gmail.com](mailto:chr.normandie@gmail.com)

### Espèce proposée

**Nom français :**

**Nom scientifique :**

**Nombre d'oiseaux :**

**Sexe :**

**Age :**

**Date(s) d'observation(s) :**

**Localité (Commune (département) / Lieu-dit) :**

**Rédacteur de la fiche (Prénom NOM / adresse courriel ou postale) :**

**Autres observateurs :**

**Durée des observations :**

**Qui l'a trouvé :**

**Qui l'a identifié :**

**Matériel optique utilisé :**

**Distance d'observation :**

**L'oiseau a-t-il été photographié :**

**Par qui :**

**L'oiseau a-t-il été capturé :**

**Par qui :**

**L'oiseau a-t-il été conservé :**

**Où :**

**Conditions météorologiques :**

**Connaissances antérieures de l'espèce :**

**Connaissances d'espèces voisines :**

**Description de l'observation et de l'oiseau (avant recours aux guides d'identification) :**

***indiquer les conditions dans lesquelles l'oiseau a été observé, puis établir une description détaillée de celui-ci (silhouette, coloration du plumage partie par partie, comportement, voix...). Joindre éventuellement une copie des notes prises sur le terrain, ainsi que tout autre document utile : dessin, photo, vidéo, enregistrement...***