



# Les oiseaux rares en Normandie en 2021

Rapport du Comité d'Homologation Régional

Loan DELPIT & le CHR Normandie  
(Février 2023)



Photographies : Tichodrome, C. Wilkins / Marouette poussin, L. Poulain / Phalarope à bec large, J. Courfin

Le Comité d'Homologation Régional des oiseaux rares de Normandie (CHR Normandie GONm + LPO) rappelle que son objectif est d'authentifier et de publier l'ensemble des observations d'oiseaux rares de la région pour que les bases de données utilisées pour la connaissance des espèces soient les plus propres et réalistes possible.

Depuis 2019, l'ensemble des données naturalistes est répertorié et saisi sur les portails Faune France (ou sur le site miroir équivalent de Faune Normandie) de BioloVision.

Nous encourageons et incitons fortement tous les observateurs à utiliser ce portail national qui permet l'utilisation des données à une échelle régionale via les associations partenaires (GONm, LPO...), mais également à l'échelle nationale et internationale pour une meilleure connaissance et protection des espèces en France et dans le Monde.

Les fiches papiers sont toujours acceptées, mais nous insistons fortement les observateurs à saisir ces données sur Faune France/Normandie et proposons si nécessaire, avec évidemment l'accord de l'observateur, de saisir la donnée à sa place en tant que « donnée de seconde main » via le compte Faune France du CHR dédié à cela (le nom de l'observateur et/ou la donnée peuvent également être cachés si l'observateur le souhaite). Le but de cette démarche est d'utiliser au mieux ces données qui, si elles ne restent que papier (fiche) sans volonté de l'observateur de la diffuser sur Faune France, ne seront très probablement jamais valorisées.

En janvier 2023, la totalité des données soumises au CHR Normandie avant cette date a été validée, soit sur les anciennes bases locales de données du GONm et de la LPO soit sur le portail (Faune France).

Voici la liste des membres du CHR ayant exercé depuis la fusion des CHR GONm + LPO en 2019 :

<b>Membres</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
BILLARD Martin	S	S			
CORBEAU Alexandre			S		
DELARUE Eric					
DESMARES Jocelyn					
FRODELLO Anne-Laure					
LECAPLAIN Benoît					
LEMIERE Stéphane					
MALVAUD Frédéric	S	S	S	S	S
MARIE Jean-Pierre					
TRIBOULIN Lionel					
VIGOUR David					
YVON Julien					
DELPIT Loan				S	S

Nous remercions chaleureusement les membres et secrétaires qui se sont succédé afin de permettre de faire fonctionner le CHR dans de bonnes conditions et de permettre ainsi la validation des données le plus rapidement possible après l'observation.

En 2023, plusieurs décisions ont été entérinées :

La réunion du CHR LPO & GONm qui s'est tenue le 03 février 2023, a permis de revoir les statuts de différentes espèces en Normandie.

Ainsi, l'Élanion blanc, n'est plus soumis à homologation en Normandie à compter du 01 janvier 2023. Les observations de cette espèce se multiplient en Normandie ces dernières années en lien avec les augmentations continues des effectifs nicheurs dans l'Ouest de la France. Aucune reproduction n'a pour le moment été confirmée en Normandie mais les récentes nidifications proches (Mayenne, Ille-et-Vilaine) peuvent laisser penser que la première nidification arrivera prochainement. C'est pourquoi le CHR a décidé de retirer cette espèce de sa liste.

La liste des espèces CHR est à retrouver en fin de ce document et est toujours disponible avec les rapports annuels sur le lien (<http://www.gonm.org/index.php?post/CHR>) ou sur demande au secrétariat du CHR : [chr.normandie@gmail.fr](mailto:chr.normandie@gmail.fr)

Cette liste (en fin de document) actualisée en février 2023, rassemble l'ensemble des espèces rares observées en Normandie. Pour les espèces qui sont soumises à homologation au Comité d'Homologation National des oiseaux rares en France (CHN) ce sont les règles d'homologation propres au CHN qui font foi.

Pour toutes les autres espèces de cette liste qui sont soumises au CHR il est demandé de systématiquement y associer une description détaillée (silhouette, coloration du plumage partie par partie, comportement, voix, conditions d'observation...) et/ou de joindre, tout document graphique disponible (photos, dessins, notes de terrain...) ou sonore afin d'éliminer les autres espèces similaires. Si ce n'est pas fait, cette demande vous sera systématiquement faite par un membre du CHR.

Des règles particulières selon les espèces sont répertoriées dans cette présente liste et, à noter que pour toute première donnée régionale (hors CHN), il est demandé une photo permettant d'identifier clairement l'espèce :

- Avec l'essor grandissant des enregistrements, nous souhaitons attirer l'attention des observateurs sur les risques de cris aberrants d'espèce et/ou d'imitateurs. Nous préconisons donc un enregistrement accompagné d'une description de l'oiseau, même brève. Pour les enregistrements seuls, un minimum de **deux cris** pour un

certain nombre d'espèces difficiles et aux cris monosyllabiques sont nécessaires pour une homologation certaine (cf. « règle d'homologation » par espèce de cette liste). Cela concerne : Pouillot ibérique (*Phylloscopus ibericus*), Hypolaïs icterine (*Hippolais icterina*), Gobemouche à collier (*Ficedula albicollis*), Gobemouche nain (*Ficedula parva*), Accenteur alpin (*Prunella collaris*), Pipit à gorge rousse (*Anthus cervinus*), Bruant fou (*Emberiza cia*), Bruant ortolan (*Emberiza hortulana*) et Bruant nain (*Emberiza pusilla*). Les cris sur les enregistrements étant parfois difficilement audibles, il est demandé que l'enregistrement inclut une séquence de 5 à 10 secondes avant le premier cri et après le dernier cri. De plus, il est systématiquement demandé l'enregistrement, le sonagramme peut-être un plus mais le sonagramme seul n'est pas suffisant. Ces règles sont calquées sur les demandes du CHN

- Les règles d'identification du Pouillot de Sibérie (*phylloscopus collybita tristis*) ne changent pas. Ainsi, un enregistrement seul ne suffit pas, il faut en supplément une description rigoureuse de l'oiseau. Cependant des photos de très bonne qualité peuvent suffire si l'ensemble des critères diagnostiques sont bien visibles.
- Concernant le Bruant ortolan, l'essor des suivis de la migration nocturne entraîne une augmentation du nombre de données pour cette espèce. Il convient toutefois d'être prudent, cette espèce pouvant être difficile à identifier. Ainsi le CHR a choisi de se fier à la bibliographie existante à ce sujet. Les critères retenus pour la validation des données de cette espèce en migration nocturne sont détaillés dans la partie dédiée à cette espèce.
- Rémiz penduline (*Remiz pendulinus*) : Sauf les départements de Seine-Maritime (76) et Eure (27) depuis le 1er janvier 2013.
- Moineau friquet (*Passer montanus*) : Sauf colonie de Pontorson et sites de nidifications connues
- Phragmite aquatique (*Acrocephalus paludicola*) : Uniquement les données hors capture/baguage
- Pipit rousseline (*Anthus campestris*) : Sauf pour les falaises de Carolles et le cap de la Hève.

Enfin, nous rappelons que les espèces suivantes sont parfois « oubliées » par les observateurs lors de la transmission des données et qu'une description (ou documents graphiques ou sonores) est nécessaire : cygne chanteur, bernache du Pacifique, macareux moine, phalarope à bec large, Moineau friquet...

Merci d'y penser !

# Liste des espèces rares observées en 2021

## Bernache cravant du Pacifique - *Branta bernicla nigricans* (Lawrence, 1846)

- 1 individu le 14 janvier à Saint-Vaast-la-Hougue/50 (R. Purenne) puis au même endroit le 3 mars (F. Malvaud). Cet oiseau, déjà noté en 2020 a donc poursuivi son hivernage jusqu'au mois de mars.
- 1 individu du 26 novembre au 13 décembre à Vains/50 (S. Provost & al.) et 1 individu à Heugueville-sur-Sienne/50 le 7 décembre par le même observateur.

Espèce annuelle en Normandie depuis 2008.

## Oie de la toundra - *Anser serrirostris rossicus* (Buturlin, 1933)

- 2 individus du 26 février au 19 mars à Genêts/50 (S. Provost & C. Rivière)
- 1 individu du 20 novembre au 19 décembre sur le marais de Réthoville/50 (J. Mézier & G. Bruneau)
- 2 individus le 18 décembre à Merville-Franceville-Plage/14 (A. Blondel)
- 2 individus du 21 au 29 décembre au moins sur les polders de la réserve de Beauguillot à Sainte-Marie-du-Mont/50 (S. Provost et al.)
- 2 individus le 23 décembre à La Cerlangue/76 (T. Domalain)

Belle année pour cette espèce avec 5 données (pour un total de 9 individus) contre 1 en 2019 et 3 en 2020.

Entrée récente de l'espèce au CHR suite à un nombre d'observations de plus en plus décroissant.

## Cygne de Bewick - *Cygnus columbianus* (Ord, 1815)

- L'hivernage des 11 individus au Marais vernier/27 débuté en 2020 se poursuit mais un adulte est retrouvé mort. Les 10 individus sont notés du 1<sup>er</sup> janvier au 30 janvier (F. Prevost & al.) puis la troupe semble se disperser, 6 individus sont observés le 4 février (F. Prevost) puis 1, 2, 3 ou 5 individus du 9 février au 25 mars (F. Prevost & al.).

- 2 individus sont observés à Pirou/50 (F. Malvaud & al.) du 25 janvier au 1<sup>er</sup> février.
- 1 individu le 20 février à Tancarville/76 (S. Daunis) puis 4 individus au même endroit du 5 au 7 mars (L. Ernis & al.).
- 2 individus à La Cerlangue /76 du 23 décembre au 30 décembre (F. Prevost & al.).

L'hiver 2020/2021 restera exceptionnel pour cette espèce dans le Marais-Vernier et l'estuaire de la Seine avec un minimum de 11 oiseaux dont un portant une bague autour du cou.



*Cygnés de Bewick à Pirou - Jean-Pierre Marie*

## Cygne chanteur - *Cygnus cygnus* (Linnaeus, 1758)

- 4 puis jusqu'à 8 individus du 15 janvier au 25 mars à Saint-Vigor-d'Ymonville/76 (F. Simon et al.)
- 3 individus sur la réserve et les polders de la réserve de Beauguillot à Sainte-Marie-de-Mont/50 du 21 au 23 novembre (T. Domalain)
- 5 individus le 14 décembre à Sandouville/76 (T. Domalain)

L'espèce fait son retour après une année d'absence en 2020, les localités sont classiques pour l'espèce avec une majorité des observations dans les prairies humides de l'estuaire de Seine.

## Fuligule à bec cerclé - *Aythya collaris* (Donovan, 1809)

- Une femelle baguée, du 12 au 14 août à Auvers/50 (F. Malvaud). Cet oiseau portait une bague d'élevage signifiant une origine captive.
- Un individu de première année du 7 novembre au 31 décembre au moins à Saint-Germain-d'Étables/76 (S. Vasseur)

Espèce occasionnelle en Normandie mais les étangs de la vallée de la Varenne ont été fréquentés 2 hivers de suite après un mâle adulte en 2020.

La donnée d'un oiseau issu de captivité démontre qu'il est toujours important de bien détailler le plumage ainsi que de vérifier l'absence de bague afin d'écartier au maximum cette possibilité pour les anatidés.

## Fuligule nyroca - *Aythya nyroca* (Güldenstädt, 1770)

- Un mâle adulte du 21 septembre au 31 décembre au moins sur la réserve ornithologique de la grande Noé à Val-de-Reuil/27 (C. Gérard), individu rejoint par un immature du 20 au 21 novembre (M. Billard)

2 individus en 2021, effectif et localité classique pour cette espèce en Normandie.

## Harelde boréale - *Clangula hyemalis* (Linnaeus, 1758)

- La femelle de première année ayant débuté son hivernage en 2020 sur la réserve du Gros banc à Merville-Franceville-Plage/14 sera revue régulièrement jusqu'au 24 février 2021 soit au moins 92 jours de présence.
- Tout comme l'individu du Calvados, la femelle ayant débuté son hivernage en décembre 2020 à Montfarville/50 sera observée jusqu'au 8 mars.
- Une femelle de première année observée à Bréhal/50 du 26 octobre au 10 décembre (M. Leroux)

Loin de l'année record de 2017 (25), l'année de 2021 restera mémorable par la longueur des séjours des 3 oiseaux dont 2 ayant effectué un hivernage complet durant l'hiver 2020-2021.



*Harelda boréale à Bréhal – Michel Leroux*

### Erismature rousse - *Oxyura jamaicensis* (J.F. Gmelin, 1789)

- Un mâle adulte le 24 mars à Val-de-Reuil/27 (L. Poulain).

Une seule donnée en 2021 dans un lieu classique pour l'espèce en Normandie.

### Marouette poussin - *Zapornia parva* (Scopoli, 1769)

- 1 individu les 08 et 09 avril à Val-de-Reuil/27 (L. Poulain et W. Duvernoy)
- 1 individu de première année le 10 septembre à Saint-Opportune-la-Mare/27 (F. Prévost).

Espèce occasionnelle en Normandie dont il s'agit de la 2<sup>e</sup> année de présence consécutive.





*Marouette poussin à Val-de-Reuil – William Duvernoy*

## Guignard d'Eurasie - *Charadrius morinellus* (Linnaeus, 1758)

- 14 individus sur l'aéroport de Maupertus à Gonneville/50 le 27 avril (L. Legrand)
- 1 individu sur l'aéroport de Maupertus à Gonneville/50 le 09 mai (S. Crestey)
- 1 individu le 02 septembre à Carolles/50 (S. Provost)
- 1 individu observé durant une séance de seawatch le 17 septembre à Colleville-Montgomery/14 (JP. Marie).

Lieux et dates classiques pour l'espèce mais l'année 2021 aura vu un effectif record de 14 individus en halte migratoire durant la période prénuptiale.

## Bécasseau de Temminck - *Calidris temminckii* (Leisler, 1812)

- 1 puis 2 individus observé les 28 et 29 avril à Genêts/50 (C. Rivière)
- 1 individu du 28 avril au 6 mai à Sainte-Opportune-la-Mare/27 (F. Prévost), individu rejoint par 4 autres oiseaux le 6 mai (F. Prévost)
- 2 individus le 29 avril à Courtils/50 (S. Provost)
- 1 individu le 02 mai à Falaise/14 (M. Billard)
- 1 individu les 04 et 05 mai à Val-de-Reuil/27 (C. Gérard).

En dehors de 2018, espèce annuelle en Normandie depuis 2006. Les dates et lieux d'observations en 2021 sont classiques pour l'espèce.



*Bécasseau de temminck à Falaise – Xavier Herrier*

### Bécasseau tacheté – *Calidris melanotos* (Vieillot, 1819)

- 1 individu le 11 septembre à Merville-Franceville-Plage/14 (J-P Marie)
- 1 individu les 13 et 14 septembre à Cosqueville/50 (A. Guérard)
- 1 individu (le même ?) le 13 octobre à Cosqueville également (J-F Lepetit)

2<sup>e</sup> année de présence consécutive en Normandie après l'observation d'un individu en 2020 en Seine-Maritime.

### Phalarope à bec large - *Phalaropus fulicarius* (Linnaeus, 1758)

- 2 individus en guet à la mer à Colleville-Montgomery/14, 1 le 5 octobre et 1 le 6 octobre (J-P Marie)
- 1 individu en guet à la mer le 4 novembre à Gatteville-le-Phare/50 (J-P Marie)
- 1 individu puis 3 individus du 4 au 13 novembre à Cosqueville/50 (J-P Marie et al.)
- 1 individu le 4 novembre à Pirou/50 (Anonyme par A. Cordonnier)
- 1 individu le 7 novembre à Dieppe/76 (T. Domalain et al.)
- 1 individu le 7 novembre à Ver-sur-mer le 07/11 (P. Ollivier)
- 1 individu à Colleville-Montgomery/14 le 22 novembre (J-P Marie)
- 1 individu à Merville-Franceville-Plage/14 le 10 décembre (P. Desgué, B. Morcel)

- 1 individu à Lingreville/50 le 28 décembre (P. Villaespesa)

Les dates et les lieux d'observation ne sont pas étonnants pour l'espèce, après une année 2020 exceptionnelle (14 individus), l'année 2021 enregistre un minimum de 12 individus et se classe dans les très bonnes années pour l'espèce dans notre région.



*Phalarope à bec large à Cosqueville - Jean Courtin*

## Goéland bourgmestre - *Larus hyperboreus* (Gunnerus, 1767)

- Un individu de premier hiver du 6 au 27 mars à Billy/14 (F. Leclerc)

Une donnée en 2021 d'un oiseau de premier hiver fréquentant le CET de Billy. Année normale en terme de nombre de données pour cette espèce en Normandie.

## Goéland à ailes blanches - *Larus glaucoides* (Meyer, 1822)

- 1 individu le 7 février à Dives-sur-Mer/14 (A. Mondin)

Espèce annuelle depuis 2014 et déjà observée à cet endroit par le passé.



Goéland à ailes blanches à Dives-sur-Mer - Alexandre Mondin

### Sterne hansel - *Gelochelidon nilotica* (Gmelin, 1789)

- 2 individus le 20 juin 2021 à Sainte-Marie-du-Mont/50 sur la réserve de Beauguillot (N. Fillol)
- 4 individus le 29 juillet 2021 à Gonfreville-l'Orcher/76 (O. Douard)

L'espèce fait son retour après 3 années sans observation en Normandie.

### Sterne caspienne - *Hydroprogne caspia* (Pallas, 1770)

- Un individu les 11 et 25 avril à Saint-Opportune-la-Mare/27 (F. Prévost)
- Un individu le 22 avril à Merville-Franceville-Plage (A. Blondel, A. Duchesney) puis un autre individu le 29 mai (J. Jean-Baptiste)
- Un individu le 8 septembre à Carolles/50 (L. Manceau)
- 2 individus (1 adulte et 1 juvénile) enregistrés en migration nocturne le 9 octobre à Feuguerolles-Bully/14 (M. Billard)

Espèce rare mais annuelle en Normandie. La baie d'Orne et l'estuaire de Seine sont les sites fournissant le plus de données pour cette espèce ces dernières années.

## Sterne de Dougall - *Sterna dougallii* (Montagu, 1813)

- Entre 2 et 6 individus observés entre le 9 et le 23 juin dans l'archipel de Chausey/50 (S. Provost, C. Rivière)

L'espèce devient annuelle en Normandie avec des tentatives de reproductions et stationnement d'oiseaux chaque année à Chausey/50.

## Guifette moustac - *Chlidonias hybrida* (Pallas, 1811)

- 1 individu le 9 avril à Le Teilleul/50 (E. Mulo)
- 3 individus le 8 mai sur l'étang des Blavettes à Barville/61 (F. Moraze) puis encore un individu le lendemain au même endroit (F. Moraze)
- 1 individu du 10 au 13 mai à la station de lagunage de Pontorson/50 (P. Desgué et al.)
- Jusqu'à 10 oiseaux entre Poses/27 et Val-de-Reuil/27 entre le 11 mai et le 13 juillet (C. Gerard, D. Basley, T. Basset)
- 1 individu le 29 juin à Saint-Opportune-la-Mare/27 (F. Prévost)

Espèce rare mais régulière en Normandie. Avec 10 individus ensemble à la réserve de la Grande Noé et des données tardives en juin et juillet en vallée de la Seine, l'année 2021 restera mémorable.

## Labbe à longue queue - *Stercorarius longicaudus* (Vieillot, 1819)

- Un individu le 15 mars à Écrammeville/14 (G. Vimard)
- Un individu en seawatch le 1<sup>er</sup> septembre à Gatteville-le-Phare/50 (J-P Moulin)
- 3 individus lors d'une sortie en mer le 8 septembre au large de Granville/50 (S. Provost et al.)
- Un individu survole le polder de Beauguillot suite à une tempête le 27 novembre (M. Billard et al.)

Bonne année pour l'espèce désormais annuelle en Normandie. Notons surtout une observation surprenante d'un individu en fin d'hiver, dans les terres. En effet cette espèce pélagique est extrêmement rare hors du milieu marin.

## Mergule nain - *Alle alle* (Linnaeus, 1758)

- 1 individu à Gatteville-le-Phare/50 le 7 novembre (J-P. Marie)
- 1 individu à Colleville-Montgomery/14 le 7 novembre (J. Girard)
- 1 individu à Sainte-Marie-du-Mont/50 le 16 novembre (P. Deux), observation surprenante d'un individu posé sur le canal de la RNN de Beauguillot
- 1 individu le 18 novembre à Sandouville/76 (T. Domalain & G. De Smet)
- 2 individus lors d'une séance de seawatch à Gatteville-le-Phare/50 le 22 novembre (J-P. Marie & A. Verneau)
- 1 individu le 9 décembre à Gatteville-le-Phare/50 (L. Manceau)

Espèce observée chaque année depuis 2014. Avec 7 individus, l'année 2021 est une bonne année pour l'espèce mais loin du record de 24 individus en 2015.

## Macareux moine - *Fratercula arctica* (Linnaeus, 1758)

- 1 individu le 29 septembre à Granville/50 (Gu. Debout)
- 1 individu en migration active durant une séance de seawatch le 4 novembre à Gatteville-le-Phare/50 (J-P. Marie)
- 1 individu le 7 novembre à Gatteville-le-Phare/50 (M. Billard)
- 1 individu le 11 novembre à Gatteville-le-Phare/50 (P. Devoucoux)

Espèce régulièrement rencontrée en guet à la mer (ou seawatch), Gatteville-le-Phare/50 est d'après les données du CHR le hot spot pour la Normandie pour cette espèce.

## Océanite culblanc - *Oceanodroma leucorhoa* (Vieillot, 1818)

- 1 individu le 14 novembre en guet à la mer à Colleville-Montgomery/14 (J-P. Marie)

Océanite toujours rare, mais observée annuellement depuis 2016. Une unique donnée en 2021 sur un des principaux spots de guet à la mer du Calvados.

## Ibis falcinelle - *Plegadis falcinellus* (Linnaeus, 1766)

- 2 individus du 23 février au 28 juin à Dragey-Ronthon /50 (Divers observateurs)
- 2 individus du 25 février au 13 mai à Saint-Côme-du-Mont/50 (PNRMCB)
- 1 individu à Saint-Jean-le-Thomas/50 du 9 au 16 avril (S. Provost)

- 1 individu le 2 juillet à Barville/61 (R. Menauge & N. Perrot Ligodières)
- 1 individu le 4 octobre à Marcey-les-Grèves/50 (D. Quérel)
- 3 individus le 10 octobre à Saint-Vaast-la-Hougue/50 (S. Poncet)
- 1 individu du 10 au 14 octobre à Merville-Franceville/14 (F. Jougleux)
- 3 individus du 15 octobre au 18 novembre à Cosqueville/50 (N. Fillol)
- 1 individu le 14 novembre à Cricqueville-en-Bessin/14 (F. Leclerc, A. Brodin & G. Vimard)
- 2 individus le 22 novembre à la réserve de Beauguillot à Sainte-Marie-du-Mont/50 (T. Domalain)
- 1 individu le 12 décembre à Saint-Étienne-la-Thillaye/14 (S. Dubus)
- 1 individu les 20 et 21 décembre entre Saint-Pierre-du-Jonquet/14 et Saint-Samson/14 (J. Jean-Baptiste)
- 1 individu le 26 décembre à Dragey-Ronthon /50 (C. Rivière)
- 9 individus le 30 décembre à Vains/50 (T & M. Lerenard)

Cette espèce continue sa progression vers le nord de la France et donc en Normandie. Pour rappel, elle n'est plus soumise à homologation à partir du 1<sup>er</sup> janvier 2022.



*Ibis falcinelle sur l'ENS des Ponts d'Ouves à Saint-Côme-du-Mont/50 – Loan Delpit*

### Blongios nain - *Ixobrychus minutus* (Linnaeus, 1766)

- 1 mâle adulte le 2 mai à Bonneville-sur-Touques/14 (W. Duvernoy)
- 1 mâle adulte le 9 mai à Martigny/76 (H. Elleron)

- 1 chanteur du 24 juin au 20 juillet à la réserve de la Grande Noé à Val-de-Reuil/27 (C. Gérard & B. Perraud)

Outre les observations devenant annuelles à Val-de-Reuil, l'année 2021 enregistre 2 données de mâles adultes début mai en 2 localités différentes.

## Crabier chevelu – *Ardeola ralloides* (Scopoli, 1769)

- 2 individus différents entre le 1<sup>er</sup> et le 27 juin à Sainte-Opportune-la-Mare/27 (F. Prévost)
- 2 individus (peut-être les mêmes ?) le 3 juin à Saint-Vigor-d'Ymonville/76 (T. Domalain)

Au moins 2 individus différents entre l'estuaire de Seine et le marais Vernier en 2021. Retour de l'espèce en Normandie après plusieurs années sans données.

## Elanion blanc - *Elanus caeruleus* (Desfontaines, 1789)

- 1 individu du 15 janvier au 21 février entre le Marais Vernier et Saint-Aubin-sur-Quillebeuf/27 (G. Ranvier & F. Prévost)
- 1 puis 2 individus à Ecoquenéauville/50 du 27 janvier au 22 février (F. Chagnaud et al.)
- 1 individu les 15 et 16 septembre à Cosqueville/50 (A. Guérard)
- 1 du 27 septembre à la fin de l'année à Bouquelon/27 (F. Prévost et al.) puis un second oiseau à proximité à Marais-Vernier/27 du 24 novembre à la fin de l'année (F. Prévost)
- 1 individu du 9 au 12 novembre à Tosny/27 (C. Chartier et al.)
- 1 individu à Fréville/50 (J-M. Joly) le 9 février, Caen le 14 février (M. Billard, B. Lang et al.), Criqueville-en-Auge/14 le 15 février (M. Deflandre), à Bretteville-sur-Ay/50 le 14 mars (C. Pérelle), Épaignes le 26 mars (C. Rideau), Bosgouet le 8 avril (T. Goubaux), Petitville/14 le 17 octobre (J. Girard), Saint-Martin-du-Teilleul/27 le 28 octobre (L. Six-Dugardin), Gatteville-le-Phare/50 le 13 novembre (L. Delpit), Beaumontel le 12 décembre (D. Dieu)

Après une année 2020 exceptionnelle, l'espèce poursuit sa progression dans notre région. Toutefois, aucune nidification réussie n'a pour le moment été constatée.



## Vautour percnoptère – *Neophron percopterus* (Linnaeus, 1758)

- 1 individu adulte le 6 janvier à Millebosc/76 (V. Poirier)
- 1 individu immature le 9 mai à Ecquetot/27 (C. Perrier & P. Cornette)
- 1 individu immature (le même ?) le 18 mai à Graignes/50 (A. Chartier)

Avec au moins 2 individus, l'année 2021 constitue une année record pour l'espèce en Normandie. Notons une donnée hivernale d'un individu adulte, surprenante pour cette espèce migratrice.

## Vautour fauve - *Gyps fulvus* (Habliz, 1783)

- 1 individu de 1<sup>ère</sup> année fréquentant les Centres d'Enfouissements Techniques de Bretteville-le-Rabet/14 les 29 et 30 juillet (J. Jean-Baptiste et al.) puis de Billy/14 du 23 au 26 août (F. Leclerc et al.). Il est observé une dernière fois en vol à Soumont-Saint-Quentin/14 le 31 août (W. Duvernoy).

Un seul individu en 2021 observé en fin d'été contrairement aux années précédentes où l'espèce était principalement observée en fin de printemps.



*Vautour fauve à Billy/14 - Jean-Pierre Marie*

## Circaète Jean-le-Blanc - *Circaetus gallicus* (J.F. Gmelin, 1788)

- 1 individu à Sainte-Opportune-la-Mare/27 le 20 mai (G. Ranvier)

- 1 individu à Saint-Pierre-du-Jonquet/14 le 21 juillet (M. Deflandre)
- 1 individu à Daubeuf-près-Vatteville/27 le 24 juillet (L. Poulain)

Après l'année 2020 record (4 individus), l'année 2021 constitue elle aussi une bonne année pour cette espèce dans notre région.

## Busard pâle – *Circus macrourus* (S.G. Gmelin, 1770)

- 1 individu de 1<sup>ère</sup> année à Beaumontel/27 le 6 octobre (C. Goujon)

Après 2 ans sans observation, l'espèce fait son retour en Normandie avec cet individu de 1<sup>ère</sup> année. La dernière donnée datait de 2019 lors d'une année record.

## Pygargue à queue blanche – *haliaeetus albicilla* (Linnaeus, 1758)

- 1 individu immature à Sainte-Geneviève/76 le 6 novembre (T. Domalain)

Retour de l'espèce en Normandie, la dernière observation datait de janvier 2018 dans les marais de la Dives où un individu avait effectué un hivernage complet du 20 novembre 2017 au 02 mars 2018 (103 jours de présence !).

## Buse pattue - *Buteo lagopus* (Pontoppidan, 1763)

- 1 individu en vol à Chaussée (La)/76 le 13 novembre (S. Vasseur)
- 1 individu à Vains/50 le 13 décembre (J-P. Marie)

2 observations en 2021 à dates classiques pour l'espèce. Cette année est donc une bonne année pour l'espèce en Normandie, la dernière donnée datant de 2018.

## Grand-duc d'Europe – *Bubo bubo* (Linnaeus, 1758)

Cette espèce a marqué l'année 2021 en Normandie. Cette année a vu la première nidification de l'espèce dans la région. Ainsi, 1 adulte et 2 juvéniles ont été découverts le 5 juin sur les falaises côtières à Criel-sur-Mer (V. Poirier). Jamais plus d'un seul adulte ne sera observé sur le site. Le dernier individu sera observé le 17 juillet.



*Grand-duc d'Europe adulte à Criel-sur-Mer/76 – Lionel Triboulin*

## Pic cendré - *Picus canus* (J. F. Gmelin, 1788)

Quelques données, toutes dans l'Orne, se concentrent essentiellement sur les derniers bastions de l'espèce. Le pic cendré a fait son entrée au CHR en 2019 suite à son déclin continu en Normandie depuis plusieurs décennies. L'espèce ne niche plus désormais que dans quelques forêts du Perche Ornais.

## Pie-grièche grise - *Lanius excubitor* (Linnaeus, 1758)

- 1 individu le 17 février à Saint-Ouen-des-Champs/27 (B. Courteille)
- 1 individu le 24 octobre à Neauphe-sous-Essai/61 (F. Grosbois)
- 1 individu du 5 au 21 novembre à Évreux/27 (J. Gotti et al.)



*Pie-Grièche grise à Neauphe-sous-Essai – François Grosbois*

Espèce rare mais annuelle en Normandie.

## Pie-grièche à tête rousse - *Lanius senator* (Linnaeus, 1758)

- 1 mâle adulte trouvé mort suite à une collision avec une baie vitrée le 14 mai à Granville/50 (L. Legendre)
- 1 mâle adulte le 31 mai à Vauville/50 (L. Tello y Vazquez)

Après une année sans observation, l'espèce fait son retour en Normandie avec ces 2 données manchoises.

## Crave à bec rouge - *Pyrrhocorax pyrrhocorax* (Linnaeus, 1758)

- 1 individu déjà observé en 2020 et réobservé en 2021 du 1<sup>er</sup> janvier au 17 mars au sémaphore de Barneville-Carteret/50 (Y. Mouchel et al.)
- 1 individu le 7 mars à Régneville-sur-Mer/50 (S. Flochel)
- 1 individu le 3 mai à Genêts/50 (A. Hemon)

Plusieurs observations en 2021, toutes dans la Manche, au moins pour partie dues à la réussite du programme de réintroduction de Jersey.



*Crave à bec rouge au cap de Carteret – Jean-Pierre Moulins*

## Corneille mantelée - *Corvus cornix* (Linnaeus, 1758)

- 1 individu observé le 8 octobre à Néville-sur-Mer (S. Poncet)

Une seule donnée en 2021 pour cet individu visiblement uniquement de passage dans le Cotentin.

## Rémiz penduline – *Remiz pendulinus* (Linnaeus, 1758)

- 3 individus du 29 mars au 8 avril à la prairie de Caen/14 (M. De Mijolla et al.)
- 1 individu du 8 au 17 avril à Colleville-Montgomery/14 (S. Poncet, G. Bordage, J-P. Marie, N. Bunel)

Au moins 4 individus en 2021 après 3 années sans données. Rappelons que l'espèce est uniquement soumise à homologation dans les 3 départements de l'ancienne Basse-Normandie.



*Rémiz penduline au marais de Colleville-Montgomery – Jean-Pierre Marie*

## Alouette haussecol - *Eremophila alpestris* (Linnaeus, 1758)

- 3 individus sur la plage de Lingreville/50 du 29 novembre au 1<sup>er</sup> décembre (E. Gonzalez)

Espèce régulière en Normandie, souvent en petites bandes sur le littoral. Comme pour cette donnée, elles sont parfois en compagnie d'autres espèces ; Bruant des neiges, Alouette des champs, etc....

## Pouillot à grands sourcils - *Phylloscopus inornatus* (Blyth, 1842)

- 1 individu le 13 octobre à Chausey/50 (C. Girard et al.)
- 1 individu le 29 octobre à Avranches/50 (C. Heroguel)
- 1 individu le 16 novembre à Cherbourg-Octeville/50 (D. Aubert)

Date et lieu classique pour l'espèce. L'année 2021 fournit peu de données mais est à l'image du faible passage durant cet automne en France.

## Pouillot de Sibérie - *Phylloscopus collybita tristis* (Blyth, 1843)

- L'individu découvert le 28 décembre 2020 à Sainte-Marie-du-Mont/50 (L. Delpit) est toujours présent le 1<sup>er</sup> janvier (A. Corbeau, N. Bunel, J-J Baptiste et F. Malvaud)
- 1 individu le 23 octobre à Tourville-la-Rivière/76 (Y. Carasco)
- 1 individu le 5 novembre à Saint-Vigor-d'Ymonville/76 (T. Domalain)
- 1 individu le 8 novembre à Cosqueville (J. Courtin et A. Verneau)
- 1 individu le 7 décembre à Mont-Saint-Aignan/76 (B. Perraud)
- 1 individu le 27 décembre à Courtils/50 (C. Gloria)

Le nombre de données de cette sous-espèce semble augmenter au fil des années. Résultant probablement de l'amélioration des connaissances sur celle-ci ainsi que des récentes connaissances acoustiques permettant une meilleure détection et identification de ces individus souvent délicats à certifier.

Pour rappel, au vu de la difficulté d'identification de cette sous-espèce et au regard de la progression des connaissances globales de ce taxon et en référence aux travaux d'autres CHR, un enregistrement seul ne suffit pas, il faut en supplément une description rigoureuse de l'oiseau. Cependant des photos de très bonne qualité peuvent suffire si l'ensemble des critères diagnostiques sont bien visibles. Les individus observés trop brièvement ou simplement entendus sont difficilement certifiables et doivent être de préférence considérés comme « de type sibérien » (taxon ouvert dans Faune France).



*Pouillot de Sibérie à Courtils – Christian Gloria*

## Tichodrome échelette - *Tichodroma muraria* (Linnaeus, 1766)

- L'individu revenu à Coutances le 18 novembre 2020 a poursuivi son hivernage jusqu'au 31 mars 2021 au moins (divers observateurs durant les mois de janvier, février et mars).

Date et lieu classique pour l'espèce en Normandie qui hiverne à Coutances/50 chaque année depuis 2017.



*Tichodrome échelette à Coutances - Charles Wilkins*

## Etourneau roselin – *Pastor roseus* (Linnaeus, 1758)

- Un individu adulte observé le 5 juin à Auderville/50 (F. Desprez) en compagnie d'Etourneaux sansonnet.

Date classique pour l'espèce dont l'apparition en Normandie cette année-là fait suite à un afflux important de l'espèce en France. La dernière donnée régionale datait de 2014 à Clitourps (50).

## Cinacle plongeur – *Cinclus cinclus* (Linnaeus, 1758)

- Un individu découvert le 23 novembre au Havre/76 (E. Alleaume). Il poursuivra son hivernage durant plusieurs mois.

Remarquable observation de cette espèce dans un parc périurbain. La seule donnée homologuée pour l'espèce remontait à 2002 déjà en Seine-Maritime.



*Cinacle plongeur au parc de Rouelles - Annie Delarue*

## Moineau friquet - *Passer montanus* (Linnaeus, 1758)

- 1 individu à Argouges/50 du 4 janvier au 11 avril (P. Feather)
- 1 individu le 1<sup>er</sup> février à Le Teilleul/50 (C. Girard)
- 1 individu le 11 août à Lolif/50 (C. Frey)

Aucune autre observation n'a été homologuée en 2021 en dehors des bastions connus de l'espèce dans l'Orne et dans la Manche.





*Moineau friquet à Pontorson - Maude Lerenard*

### Accenteur alpin - *Prunella collaris* (Scopoli, 1769)

- 1 individu en migration active le 19 novembre à Carolles/50 (S. Provost)

Remarquable observation d'un individu en migration active, 4<sup>e</sup> donnée validée en Normandie.

### Pipit de Richard - *Anthus richardi* (Vieillot, 1818)

- 1 individu le 10 janvier à Genêts/50 (P. Desgué, N. Bunel et M. Billard)
- 5 individus le 11 décembre à Vains/50 (S. Provost) puis toujours 1 individu au même endroit le 28 décembre (E. Lhomer)

L'espèce est désormais annuelle et l'hivernage est de plus en plus régulier. La baie du Mont-Saint-Michel semble constituer le secteur le plus régulier pour cette espèce en Normandie.

## Pipit rousseline - *Anthus campestris* (Linnaeus, 1758)

- 1 individu le 25 avril au Marais-Vernier/27 (F. Prévost)
- 1 individu le 11 août à Colleville-Montgomery/14 (J. Girard)
- 1 individu le 5 septembre à Suré/61 (F. Moraze) et 1 posé le même jour au Moutiers-en-Auge/14 (C & A. Wilkins)
- 1 le 8 septembre à Fourches/14 (J. Jean-Baptiste)

Nombreuses observations durant cette année 2021 y compris dans les terres. S'ajoutent à ces données de nombreuses observations sur les sites de migration de Carolles et du Cap de la Hève. Cette espèce est régulière en Normandie au passage postnuptial.



*Pipit rousseline au Moutiers-en-Auge – James Jean-Baptiste*

## Pipit à gorge rousse – *Anthus cervinus* (Pallas, 1811)

- 1 individu le 24 avril à la prairie de Caen/14 (M. Billard)
- 1 individu le 20 octobre à Chausey/50 (S. Provost & M-L. Miège)

Deux données en 2021 pour cette espèce à des dates classiques du passage migratoire de cette espèce.



*Pipit à gorge rousse à Chausey – Sébastien Provost*

## Sizerin flammé – *Carduelis flamma* (Linnaeus, 1758)

- 1 individu enregistré en migration active le 17 octobre à Carolles/50 (S. Provost & C. Rivière)

Espèce très rare en Normandie, pouvant être confondue avec le Sizerin cabaret plus commun. Espèce d'apparition irrégulière, soumise à des afflux automnaux.

## Bruant ortolan - *Emberiza hortulana* Linnaeus, 1758

- 1 individu enregistré en migration nocturne à Feuguerolles-Bully/14 le 3 septembre et 1 le 9 septembre dans les mêmes conditions (M. Billard)
- 1 individu en migration active le 5 septembre à Carolles/50 (S. Provost) et 1 enregistré en migration nocturne au même endroit le 25 septembre (S. Provost)

Espèce rare en Normandie, le développement du suivi de la migration nocturne devrait augmenter de manière considérable le nombre d'oiseaux détectés chaque année.

Suite au développement des suivis de la migration nocturne, et de la difficulté d'identification et de la diversité des cris du Bruant ortolan en migration, le CHR demande systématiquement les éléments suivants pour statuer sur une donnée:

- L'observateur doit décrire précisément le ou les types de cris concernés ;
- Joindre l'enregistrement et si possible le sonagramme.

La validation se base ensuite sur une étude récente des cris du Bruant ortolan en migration nocturne développée par Magnus Robb (<https://soundapproach.co.uk/species/ortolan-bunting/>). Ainsi une donnée pourra être validée si :

- Elle concerne un seul cri de type « Plik » considérant que les cris de ce type permettent d'identifier un ortolan avec un risque d'erreur limité ;
- Elle concerne au moins 2 cris et si possible de 2 types différents.

Les données comprenant un cri unique (hors type « Plik ») ou un seul type de cri sont à considérer avec prudence du fait du risque de confusion non négligeable avec des espèces communes en migration nocturne comme le précise bien Magnus Robb et collaborateurs, 2023 (<https://soundapproach.co.uk/species/ortolan-bunting/>)

# Données de 2019 homologuées par le CHN : (Hugo Touzé & le CHN)

1. **Oie à bec court - *Anser brachyrhynchus* :**

Calvados – Ouistreham, 23 ind., 31 octobre (J.-P. Marie)

2. **Macreuse à front blanc - *Melanitta perspicillata* :**

Manche - Granville, pointe du roc, mâle +2A, 28 janvier (S. Provost & C. Gloria)

3. **Chevalier bargette - *Xenus cinereus* :**

Calvados - Sallenelles, méandres de l'Orne, 18 et 19 mai (J. Girard & al.)



*Chevalier bargette à Sallenelles – Tony Le Huu Nghia*

4. **Sterne de Forster – *Sterna forsteri* :**

Calvados - Houlgate, +2A, du 20 février au 10 mars (F. Leclerc & al.)



*Sterne de Forster - William Duvernoy*

5. **Guillemot à Miroir - *Cepphus grylle* :**

Manche – Gatteville-le-Phare, +2A, 1<sup>er</sup> septembre (A. Verneau)

6. **Bergeronnette des Balkans – *Motacilla flava feldegg* :**

Manche – Geffosses, havre de Geffosses, mâle 2A, 24 juin (A. Cordonnier)

7. **Pipit à dos olive – *Anthus hodgsoni* :**

Manche – Carolles, 30 octobre (S. Provost & L. Manceau)

# Données refusées par le CHR

- **Oie de la toundra** : 23 décembre – Tancarville/76 – Observation brève et description du cri ne permettant pas d'exclure une Oie à bec court
- **Phalarope à bec large** : 22 octobre – Cricqueville-en-Bessin/14 - Absence de description
- **Phalarope à bec large** : 24 novembre – Sainte-Marie-du-Mont/50 - Absence de description
- **Guifette moustac** : 11 mai – Saint-Côme-du-Mont/50 – Absence de description
- **Macareux moine** : 28 novembre – Colleville-sur-Mer/14 - absence de description
- **Puffin cendré** : 30 décembre – Veules-les-Roses/76 - absence de description
- **Élanion blanc** : 16 avril – Flottemanville/50 - absence de description
- **Vautour fauve** : 3 août - Rocquancourt/14 - absence de description
- **Circaète Jean-le-Blanc** – 20 mai- Saint-Opportune-la-Mare /27 - absence de description
- **Circaète Jean-le-Blanc** – 23 mai – Carolles/50 – Impossible d'écarter une confusion avec une Buse variable morphe claire
- **Pygargue à queue blanche** : 19 juillet – Penly/76 – Oiseau échappé de captivité
- **Faucon crécerellette** : 30 janvier – Chérencé-le-Héron/50 – probable confusion avec un Épervier d'Europe
- **Faucon crécerellette** : 1<sup>er</sup> février – Saint-Nicolas-d'Aliermont/76 – Absence de description
- **Faucon crécerellette** : 28 juin – Rouen/76 – Absence de description
- **Faucon crécerellette** : 7 octobre – Cléville/14 – Absence de description
- **Pouillot à grands sourcils** : 8 octobre – Saint-Jacques-sur-Darnétal/76 - Absence de description
- **Pouillot de Sibérie** : 12 novembre – Poses/27 - absence de description
- **Pouillot de Sibérie** : 1<sup>er</sup> décembre – Val-de-Reuil/27 – malgré un enregistrement du cri correspondant à cette espèce, l'absence de description de l'individu ne permet pas au CHR de valider cette donnée
- **Rousserolle turdoïde** – 7 septembre – Sandouville/76 - absence de description
- **Étourneau unicolore** – 30 janvier – Saint-Aubin-Routot/76 - absence de description
- **Moineau friquet** – 10 données réparties en Normandie – descriptions insuffisantes ou absentes
- **Sizerin flammé** – 30 septembre – Cherbourg-Octeville/50 – description insuffisante ne permettant pas d'écarter un Sizerin cabaret
- **Bruant ortolan** – 26 août – Appenai-sous-Bellême - absence de description

- **Bruant ortolan** – 04 septembre – Appenai-sous-Bellême - absence de description

**Remerciements** : Les membres du CHR Normandie remercient vivement tous les ornithologues qui transmettent leurs données via le site Faune France/Normandie, permettant ainsi d'assurer une « traçabilité » et valorisations des observations d'oiseaux rares en Normandie. Merci également au bureau du GONm de nous avoir accueillis au siège régional de Caen pour la réunion annuelle.

**Comité d'Homologation Régional de Normandie (GONm+LPO) : oiseaux rares**  
[chr.normandie@gmail.com](mailto:chr.normandie@gmail.com)



LISTE DES ESPECES SOUMISES A HOMOLOGATION EN NORMANDIE

D'après la « Liste officielle des Oiseaux de France », édition 2020 (catégories A, B & C) - Commission de l'Avifaune Française (CAF) & la liste officielle du CHN (mise à jour en 2017)  
<https://cdnfiles1.biolovision.net/www.faune-france.org/userfiles/FauneFrance/FFEnSavoirPlus/LOF2020.pdf>  
[http://www.chn-france.org/upload\\_content/Liste\\_taxons\\_CHN\\_4.pdf](http://www.chn-france.org/upload_content/Liste_taxons_CHN_4.pdf)

Notez que toutes les autres espèces plus rares ne figurant pas encore sur la liste des oiseaux de Normandie sont aussi à soumettre au CHR

N°	Nom vernaculaire	Nom scientifique	Descripteur	Anciens noms	Catégories de la CAF	Statut CHN	Règle d'homologation	Commentaire
1	Bernache cravant du Pacifique	<i>Branta bernicla nigricans</i>	(Lawrence, 1846)	Bernache du Pacifique	A			
2	Bernache à cou roux	<i>Branta ruficollis</i>	(Pallas, 1769)		A	CHN		
3	Oie des neiges	<i>Anser caerulescens</i>	(Linnaeus, 1758)	Oie blanche	BD	CHN		Vérifier l'origine sauvage (hors catégories E)
4	Oie de la taïga	<i>Anser fabalis</i>	(Latham, 1787)	Oie de taïga ( <i>Anser fabalis fabalis</i> ) Oie des moissons	A	CHN		
5	Oie à bec court	<i>Anser brachyrhynchus</i>	Baillon, 1833		A	CHN		
6	Oie de la toundra	<i>Anser serrirostris rossicus</i>	Buturlin, 1933	Oie de toundra ( <i>Anser fabalis rossicus</i> ) Oie des moissons	A			
7	Oie rieuse du Groenland	<i>Anser albifrons flavirostris</i>	Dalgety & Scott, 1948		A	CHN		
8	Oie naine	<i>Anser erythropus</i>	(Linnaeus, 1758)		A	CHN		
9	Cygne de Bewick	<i>Cygnus columbianus</i>	(Ord, 1815)		A			
10	Cygne chanteur	<i>Cygnus cygnus</i>	(Linnaeus, 1758)	Cygne sauvage	A			
11	Sarcelle élégante	<i>Anas formosa</i>	Georgi, 1775		BD	CHN		Vérifier l'origine sauvage (hors catégories E)
12	Sarcelle à ailes bleues	<i>Anas discors</i>	Linné, 1766		A	CHN		Vérifier l'origine sauvage (hors catégories E)
13	Canard à front blanc	<i>Anas americana</i>	J.F. Gmelin, 1789	Canard d'Amérique	A	CHN		
14	Sarcelle à ailes vertes	<i>Anas carolinensis</i>	J.F. Gmelin, 1789	Sarcelle de la Caroline	A	CHN		
15	Sarcelle marbrée	<i>Marmaronetta angustirostris</i>	(Ménétries, 1832)		A	CHN		
16	Fuligule nyroca	<i>Aythya nyroca</i>	(Güldenstädt, 1770)		A			
17	Fuligule à bec cerclé	<i>Aythya collaris</i>	(Donovan, 1809)		A			
18	Fuligule à tête noire	<i>Aythya affinis</i>	(Eyton, 1838)	Petit fuligule	A	CHN		
19	Eider à tête grise	<i>Somateria spectabilis</i>	(Linnaeus, 1758)		A	CHN		
20	Macreuse à front blanc	<i>Melanitta perspicillata</i>	(Linnaeus, 1758)	Macreuse à lunette	A	CHN		

**LISTE DES ESPECES SOUMISES A HOMOLOGATION EN NORMANDIE**

D'après la « Liste officielle des Oiseaux de France », édition 2020 (catégories A, B & C) - Commission de l'Avifaune Française (CAF) & la liste officielle du CHN (mise à jour en 2017)  
<https://cdnfiles1.biolovision.net/www.faune-france.org/userfiles/FauneFrance/FFEnSavoirPlus/LOF2020.pdf>  
[http://www.chn-france.org/upload\\_content/Liste\\_taxons\\_CHN\\_4.pdf](http://www.chn-france.org/upload_content/Liste_taxons_CHN_4.pdf)

Notez que toutes les autres espèces plus rares ne figurant pas encore sur la liste des oiseaux de Normandie sont aussi à soumettre au CHR

N°	Nom vernaculaire	Nom scientifique	Descripteur	Anciens noms	Catégories de la CAF	Statut CHN	Règle d'homologation	Commentaire
21	Macreuse à bec jaune	<i>Melanitta americana</i>	(Swainson, 1832)	Macreuse d'Amérique	A	CHN		
22	Harelde boréale	<i>Clangula hyemalis</i>	(Linnaeus, 1758)	Harelde de Miquelon, Harelde kakawi	A			
23	Garrot d'islande	<i>Bucephala islandica</i>	(J.F. Gmelin, 1789)		A	CHN		
24	Erismature rousse	<i>Oxyura jamaicensis</i>	(J.F. Gmelin, 1789)		A			
25	Erismature à tête blanche	<i>Oxyura leucocephala</i>	(Scopoli, 1769)		A	CHN		
26	Martinet à ventre blanc	<i>Apus melba</i>	(Linnaeus, 1758)	Martinet alpin	A			
27	Martinet pâle	<i>Apus pallidus</i>	(Shelley, 1870)		A			
28	Outarde barbue	<i>Otis tarda</i>	Linnaeus, 1758	grande outarde	AE	CHN		E pour la Normandie : pas de données validées au CHN dans une autre catégorie
29	Outarde canepetière	<i>Tetrax tetrax</i>	(Linnaeus, 1758)		A			
30	Coucou geai	<i>Clamator glandarius</i>	(Linnaeus, 1758)		A			
31	Coulicou à bec jaune	<i>Coccyzus americanus</i>	(Linnaeus, 1758)		A	CHN		
32	Syrnhapte paradoxal	<i>Syrnhaptes paradoxus</i>	(Pallas, 1773)		A	CHN		1 donnée du 14 mai 1888 à Alençon
33	Râle des genêts	<i>Crex crex</i>	(Linnaeus, 1758)		A			
34	Marouette poussin	<i>Zapornia parva</i>	(Scopoli, 1769)		A			
35	Marouette de baillon	<i>Zapornia pusilla</i>	(Pallas, 1776)		A	CHN		
36	Talève sultane	<i>Porphyrio porphyrio</i>	(Linnaeus, 1758)	Poule sultane	AC			
37	Grue demoiselle	<i>Grus virgo</i>	(Linnaeus, 1758)		A	CHN		
38	Grèbe à bec bigarré	<i>Podilymbus podiceps</i>	(Linnaeus, 1758)		A	CHN		
39	Flamant rose	<i>Phoenicopterus roseus</i>	Pallas, 1811		A			

**LISTE DES ESPECES SOUMISES A HOMOLOGATION EN NORMANDIE**

D'après la « Liste officielle des Oiseaux de France », édition 2020 (catégories A, B & C) - Commission de l'Avifaune Française (CAF) & la liste officielle du CHN (mise à jour en 2017)  
<https://cdnfiles1.biolovision.net/www.faune-france.org/userfiles/FauneFrance/FFEnSavoirPlus/LOF2020.pdf>  
[http://www.chn-france.org/upload\\_content/Liste\\_taxons\\_CHN\\_4.pdf](http://www.chn-france.org/upload_content/Liste_taxons_CHN_4.pdf)

Notez que toutes les autres espèces plus rares ne figurant pas encore sur la liste des oiseaux de Normandie sont aussi à soumettre au CHR

N°	Nom vernaculaire	Nom scientifique	Descripteur	Anciens noms	Catégories de la CAF	Statut CHN	Règle d'homologation	Commentaire
40	Flamant nain	<i>Phoenicopterus minor</i>	G.R. Gray, 1869		D	CHN		
41	Vanneau sociable	<i>Vanellus gregarius</i>	(Pallas, 1771)		A	CHN		
42	Pluvier bronzé	<i>Pluvialis dominica</i>	(Müller, PLS, 1776)		A			
43	Gravelot kildir	<i>Charadrius vociferus</i>	Linnaeus, 1758	Pluvier kildir	A	CHN		
44	Gravelot mongol	<i>Charadrius mongolus</i>	(Pallas, 1776)	Pluvier mongol	A	CHN		
45	Guignard d'Eurasie	<i>Charadrius morinellus</i>	Linnaeus, 1758	Pluvier guignard	A			
46	Bécasseau falcinelle	<i>Calidris falcinellus</i>	(Pontoppidan, 1763)		A	CHN		
47	Bécasseau de Temminck	<i>Calidris temminckii</i>	(Leisler, 1812)		A			
48	Bécasseau à cou roux	<i>Calidris ruficollis</i>	(Pallas, 1776)	Bécasseau à col roux	A	CHN		
49	Bécasseau de Baird	<i>Calidris bairdii</i>	(Coues, 1861)		A	CHN		
50	Bécasseau de Bonaparte	<i>Calidris fuscicollis</i>	(Vieillot, 1819)		A	CHN		
51	Bécasseau rousset	<i>Calidris subruficollis</i>	(Vieillot, 1819)		A	CHN		
52	Bécasseau tacheté	<i>Calidris melanotos</i>	(Vieillot, 1819)		A			
53	Bécasseau semipalmé	<i>Calidris pusilla</i>	(Linné, 1766)		A	CHN		
54	Bécassin à long bec	<i>Limnodromus scolopaceus</i>	(Say, 1823)		A	CHN		
55	Bécassine double	<i>Gallinago media</i>	(Latham, 1787)		A	CHN		
56	Chevalier bargette	<i>Xenus cinereus</i>	(Guldenstädt, 1775)	Bargette de Terek	A	CHN		
57	Phalarope de Wilson	<i>Phalaropus tricolor</i>	(Vieillot, 1819)		A	CHN		
58	Phalarope à bec étroit	<i>Phalaropus lobatus</i>	(Linnaeus, 1758)		A			
59	Phalarope à bec large	<i>Phalaropus fulicarius</i>	(Linnaeus, 1758)		A			
60	Chevalier grivelé	<i>Actitis macularius</i>	(Linnaeus, 1766)		A	CHN		

**LISTE DES ESPECES SOUMISES A HOMOLOGATION EN NORMANDIE**

D'après la « Liste officielle des Oiseaux de France », édition 2020 (catégories A, B & C) - Commission de l'Avifaune Française (CAF) & la liste officielle du CHN (mise à jour en 2017)  
<https://cdnfiles1.biolovision.net/www.faune-france.org/userfiles/FauneFrance/FFEnSavoirPlus/LOF2020.pdf>  
[http://www.chn-france.org/upload\\_content/Liste\\_taxons\\_CHN\\_4.pdf](http://www.chn-france.org/upload_content/Liste_taxons_CHN_4.pdf)

Notez que toutes les autres espèces plus rares ne figurant pas encore sur la liste des oiseaux de Normandie sont aussi à soumettre au CHR

N°	Nom vernaculaire	Nom scientifique	Descripteur	Anciens noms	Catégories de la CAF	Statut CHN	Règle d'homologation	Commentaire
61	<b>Chevalier à pattes jaunes</b>	<i>Tringa flavipes</i>	(J.F. Gmelin, 1789)	<b>Petit chevalier</b>	<b>A</b>	<b>CHN</b>		
62	Chevalier stagnatile	<i>Tringa stagnatilis</i>	(Bechstein, 1803)		A			
63	<b>Chevalier criard</b>	<i>Tringa melanoleuca</i>	(J.F. Gmelin, 1789)	<b>Grand chevalier</b>	<b>A</b>	<b>CHN</b>		
64	<b>Courvite Isabelle</b>	<i>Cursorius cursor</i>	(Latham, 1787)		<b>A</b>	<b>CHN</b>		
65	Glaréole à collier	<i>Glareola pratincola</i>	(Linnaeus, 1766)		A			
66	<b>Mouette blanche</b>	<i>Pagophila eburnea</i>	(Phipps, 1774)	<b>Mouette ivoire , goéland sénateur</b>	<b>A</b>	<b>CHN</b>		
67	<b>Mouette atricille</b>	<i>Larus atricilla</i>	Linnaeus, 1758		<b>A</b>	<b>CHN</b>		
68	<b>Mouette de Franklin</b>	<i>Larus pipixcan</i>	Wagler, 1831		<b>A</b>	<b>CHN</b>		
69	Goéland d'Audouin	<i>Larus audouinii</i>	Payraudeau, 1826		A			
70	<b>Goéland à bec cerclé</b>	<i>Larus delawarensis</i>	<b>Ord, 1815</b>		<b>A</b>	<b>CHN</b>		<b>CHN depuis 2021</b>
71	Goéland bourgmestre	<i>Larus hyperboreus</i>	Gunnerus, 1767		A			
72	Goéland à ailes blanches	<i>Larus glaucoides</i>	Meyer, 1822	Goéland arctique	A			
73	<b>Goéland de la Baltique</b>	<i>Larus fuscus fuscus</i>	Linnaeus, 1758		<b>A</b>	<b>CHN</b>		
74	Sterne hansel	<i>Gelochelidon nilotica</i>	(J.F. Gmelin, 1789)		A			
75	Sterne caspienne	<i>Hydroprogne caspia</i>	(Pallas, 1770)		A			
76	<b>Sterne royale</b>	<i>Thalasseus maxima</i>	<b>Boddaert, 1783</b>		<b>A</b>	<b>CHN</b>		
77	<b>Sterne voyageuse</b>	<i>Sterna bengalensis</i>	Lesson, 1831		<b>A</b>	<b>CHN</b>		
78	<b>Sterne élégante</b>	<i>Thalasseus elegans</i>	(Gambel, 1849)		<b>A</b>	<b>CHN</b>		
79	<b>Sterne fuligineuse</b>	<i>Onychoprion fuscatus</i>	(Linnaeus, 1766)		<b>A</b>	<b>CHN</b>		
80	Sterne de Dougall	<i>Sterna dougallii</i>	Montagu, 1813		A			
81	<b>Sterne de Forster</b>	<i>Sterna forsteri</i>	<b>Nuttall, 1834</b>		<b>A</b>	<b>CHN</b>		
82	Guifette moustac	<i>Chlidonias hybrida</i>	(Pallas, 1811)		A			

LISTE DES ESPECES SOUMISES A HOMOLOGATION EN NORMANDIE

D'après la « Liste officielle des Oiseaux de France », édition 2020 (catégories A, B & C) - Commission de l'Avifaune Française (CAF) & la liste officielle du CHN (mise à jour en 2017)  
<https://cdnfiles1.biolovision.net/www.faune-france.org/userfiles/FauneFrance/FFEnSavoirPlus/LOF2020.pdf>  
[http://www.chn-france.org/upload\\_content/Liste\\_taxons\\_CHN\\_4.pdf](http://www.chn-france.org/upload_content/Liste_taxons_CHN_4.pdf)

Notez que toutes les autres espèces plus rares ne figurant pas encore sur la liste des oiseaux de Normandie sont aussi à soumettre au CHR

N°	Nom vernaculaire	Nom scientifique	Descripteur	Anciens noms	Catégories de la CAF	Statut CHN	Règle d'homologation	Commentaire
83	Guifette leucoptère	<i>Chlidonias leucopterus</i>	(Temminck, 1815)		A			
84	Labbe à longue queue	<i>Stercorarius longicaudus</i>	Vieillot, 1819		A			
85	Mergule nain	<i>Alle alle</i>	(Linnaeus, 1758)		A			
86	<b>Guillemot à miroir</b>	<b><i>Cephus grylle</i></b>	<b>(Linnaeus, 1758)</b>		<b>A</b>	<b>CHN</b>		
87	Macareux moine	<i>Fratercula arctica</i>	(Linnaeus, 1758)		A			
88	<b>Plongeon à bec blanc</b>	<b><i>Gavia adamsii</i></b>	<b>(Gray, 1859)</b>		<b>A</b>	<b>CHN</b>		
89	<b>Albatros à sourcils noirs</b>	<b><i>Thalassarche melanophris</i></b>	<b>Temminck, 1828</b>		<b>A</b>	<b>CHN</b>		
90	Océanite culblanc	<i>Oceanodroma leucorhoa</i>	(Vieillot, 1818)	Pétrel tempête à culblanc, Pétrel culblanc	A			
91	Puffin cendré	<i>Calonectris borealis</i>	(Cory, 1881)		A			
92	Puffin majeur	<i>Puffinus gravis</i>	(O'Reilly, 1818)		A			
93	<b>Puffin de macaronésie / de Boyd</b>	<b><i>Puffinus baroli / boydi</i></b>	<b>(Bonaparte, 1857) / Mathems, 1912</b>		<b>A</b>	<b>CHN</b>		
94	<b>Cormoran pygmée</b>	<b><i>Phalacrocorax pygmaeus</i></b>	<b>(Pallas, 1773)</b>		<b>A</b>	<b>CHN</b>		
95	Blongios nain	<i>Ixobrychus minutus</i>	(Linnaeus, 1766)		A			
96	Crabier chevelu	<i>Ardeola ralloides</i>	(Scopoli, 1769)	Héron crabier	A			
97	<b>Aigrette des récifs</b>	<b><i>Egretta gularis</i></b>	<b>(Bosc, 1792)</b>		<b>A</b>	<b>CHN</b>		
98	<b>Pélican blanc</b>	<b><i>Pelecanus onocrotalus</i></b>	<b>Linnaeus, 1758</b>		<b>A</b>	<b>CHN</b>		
99	Gypaète barbu	<i>Gypaetus barbatus</i>	(Linnaeus, 1758)		A			
100	Vautour percnoptère	<i>Neophron percnopterus</i>	(Linnaeus, 1758)	Percnoptère d'Égypte	A			
101	Vautour fauve	<i>Gyps fulvus</i>	(Habliz, 1783)		AC			
102	Vautour moine	<i>Aegypius monachus</i>	(Linnaeus, 1766)		AC			
103	Circaète Jean-le-Blanc	<i>Circaetus gallicus</i>	(J.F. Gmelin, 1788)		A			

**LISTE DES ESPECES SOUMISES A HOMOLOGATION EN NORMANDIE**

*D'après la « Liste officielle des Oiseaux de France », édition 2020 (catégories A, B & C) - Commission de l'Avifaune Française (CAF) & la liste officielle du CHN (mise à jour en 2017)  
<https://cdnfiles1.biolovision.net/www.faune-france.org/userfiles/FauneFrance/FFEnSavoirPlus/LOF2020.pdf>  
[http://www.chn-france.org/upload\\_content/Liste\\_taxons\\_CHN\\_4.pdf](http://www.chn-france.org/upload_content/Liste_taxons_CHN_4.pdf)*

*Notez que toutes les autres espèces plus rares ne figurant pas encore sur la liste des oiseaux de Normandie sont aussi à soumettre au CHR*

N°	Nom vernaculaire	Nom scientifique	Descripteur	Anciens noms	Catégories de la CAF	Statut CHN	Règle d'homologation	Commentaire
104	Aigle pomarin	<i>Aquila pomarina</i>	C. L. Brehm, 1831		A	CHN		
105	Aigle criard	<i>Aquila clanga</i>	Pallas, 1811		A	CHN		
106	Aigle royal	<i>Aquila chrysaetos</i>	(Linnaeus, 1758)		A			
107	Aigle botté	<i>Aquila pennata</i>	(J.F. Gmelin, 1788)		A			
108	Aigle de Bonelli	<i>Aquila fasciata</i>	(Vieillot, 1822)		A			
109	Busard pâle	<i>Circus macrourus</i>	(S.G. Gmelin, 1770)		A			
110	Pygargue à queue blanche	<i>Haliaeetus albicilla</i>	(Linnaeus, 1758)		A			
111	Buse pattue	<i>Buteo lagopus</i>	(Pontoppidan, 1763)		A			
112	Buse féroce	<i>Buteo rufinus</i>	(Cretzschmar, 1829)		A	CHN		
113	Petit-duc scops	<i>Otus scops</i>	(Linnaeus, 1758)	Hibou petit-duc	A			
114	Harfang des neiges	<i>Bubo scandiacus</i>	(Linnaeus, 1758)		A	CHN		
115	Grand-Duc d'Europe	<i>Bubo bubo</i>	(Linnaeus, 1758)	Hibou grand-duc	A			
116	Chouette de Tengmalm	<i>Aegolius funereus</i>	(Linné, 1758)		A			
117	Rollier d'Europe	<i>Coracias garrulus</i>	Linnaeus, 1758		A			
118	Pic cendré	<i>Picus canus</i>	J. F. Gmelin, 1788		A			
119	Faucon crécerellette	<i>Falco naumanni</i>	Fleischer, 1818		A			
120	Faucon kobez	<i>Falco vespertinus</i>	Linnaeus, 1766		A			
121	Pie-grièche isabelle	<i>Lanius isabellinus</i>	Hemprich & Ehrenberg, 1833		A	CHN		
122	Pie-grièche à poitrine rose	<i>Lanius minor</i>	J.F. Gmelin, 1788		A	CHN		CHN depuis 2021
123	Pie-grièche grise	<i>Lanius excubitor</i>	Linnaeus, 1758		A			
124	Pie-grièche des steppes	<i>Lanius excubitor pallidirostris</i>	Cassin, 1851	( <i>Lanius meridionalis pallidirostris</i> )	A	CHN		
125	Pie-grièche à tête rousse	<i>Lanius senator</i>	Linnaeus, 1758		A			

**LISTE DES ESPECES SOUMISES A HOMOLOGATION EN NORMANDIE**

D'après la « Liste officielle des Oiseaux de France », édition 2020 (catégories A, B & C) - Commission de l'Avifaune Française (CAF) & la liste officielle du CHN (mise à jour en 2017)  
<https://cdnfiles1.biolovision.net/www.faune-france.org/userfiles/FauneFrance/FFEnSavoirPlus/LOF2020.pdf>  
[http://www.chn-france.org/upload\\_content/Liste\\_taxons\\_CHN\\_4.pdf](http://www.chn-france.org/upload_content/Liste_taxons_CHN_4.pdf)

Notez que toutes les autres espèces plus rares ne figurant pas encore sur la liste des oiseaux de Normandie sont aussi à soumettre au CHR

N°	Nom vernaculaire	Nom scientifique	Descripteur	Anciens noms	Catégories de la CAF	Statut CHN	Règle d'homologation	Commentaire
126	Cassenoix moucheté	<i>Nucifraga caryocatactes</i>	(Linnaeus, 1758)		A			
127	Crave à bec rouge	<i>Pyrrhocorax pyrrhocorax</i>	(Linnaeus, 1758)		A			
128	Corneille mantelée	<i>Corvus cornix</i>	Linnaeus, 1758		A			
129	Jaseur boréal	<i>Bombycilla garrulus</i>	(Linnaeus, 1758)		A			
130	Mésange boréale	<i>Poecile montanus</i>	(Conrad von Baldenstein, 1827)		A			
131	Rémiz penduline	<i>Remiz pendulinus</i>	(Linnaeus, 1758)		A			Sauf les départements de Seine-Maritime (76) et Eure (27) depuis le 1er janvier 2013.
132	Alouette haussecol	<i>Eremophila alpestris</i>	(Linnaeus, 1758)		A			
133	Alouette calandrelle	<i>Calandrella brachydactyla</i>	(Leisler, 1814)		A			
134	Hirondelle de rochers	<i>Ptyonoprogne rupestris</i>	(Scopoli, 1769)		A			
135	Hirondelle rousseline	<i>Cecropis daurica</i>	(Linné, 1771)		A			
136	Mésange à longue queue Nordique	<i>Aegithalos caudatus caudatus</i>	(Linné, 1758)		A	CHN		
137	Pouillot de Bonelli	<i>Phylloscopus bonelli</i>	(Vieillot, 1819)		A			
138	<b>Pouillot de Hume</b>	<b><i>Phylloscopus humei</i></b>	<b>(Brooks, 1878)</b>		<b>A</b>	<b>CHN</b>		
139	Pouillot à grands sourcils	<i>Phylloscopus inornatus</i>	(Blyth, 1842)		A			
140	<b>Pouillot de Pallas</b>	<b><i>Phylloscopus proregulus</i></b>	<b>(Pallas, 1811)</b>		<b>A</b>	<b>CHN</b>		
141	<b>Pouillot brun</b>	<b><i>Phylloscopus fuscatus</i></b>	<b>(Blyth, 1842)</b>		<b>A</b>	<b>CHN</b>		
142	Pouillot de Sibérie	<i>Phylloscopus collybita tristis</i>	Blyth, 1843	Pouillot vélocé de Sibérie	A			Un enregistrement seul ne suffit pas, il faut une description rigoureuse de l'oiseau en plus. Des photos de très bonnes qualités seules peuvent par contre suffire si l'ensemble des critères diagnostiques sont bien visibles

**LISTE DES ESPECES SOUMISES A HOMOLOGATION EN NORMANDIE**

D'après la « Liste officielle des Oiseaux de France », édition 2020 (catégories A, B & C) - Commission de l'Avifaune Française (CAF) & la liste officielle du CHN (mise à jour en 2017)  
<https://cdnfiles1.biolovision.net/www.faune-france.org/userfiles/FauneFrance/FFEnSavoirPlus/LOF2020.pdf>  
[http://www.chn-france.org/upload\\_content/Liste\\_taxons\\_CHN\\_4.pdf](http://www.chn-france.org/upload_content/Liste_taxons_CHN_4.pdf)

Notez que toutes les autres espèces plus rares ne figurant pas encore sur la liste des oiseaux de Normandie sont aussi à soumettre au CHR

N°	Nom vernaculaire	Nom scientifique	Descripteur	Anciens noms	Catégories de la CAF	Statut CHN	Règle d'homologation	Commentaire
143	Pouillot ibérique	<i>Phylloscopus ibericus</i>	Ticehurst, 1937		A		2 cris sont nécessaires pour des enregistrements seuls	
144	Rousserolle turdoïde	<i>Acrocephalus arundinaceus</i>	(Linnaeus, 1758)		A			
145	Phragmite aquatique	<i>Acrocephalus paludicola</i>	(Vieillot, 1817)		A			Uniquement les données hors capture/baguage
146	<b>Rousserolle isabelle</b>	<b><i>Acrocephalus agricola</i></b>	<b>(Jerdon, 1845)</b>		<b>A</b>	<b>CHN</b>		
147	<b>Rousserolle des buissons</b>	<b><i>Acrocephalus dumetorum</i></b>	<b>Blyth, 1849</b>		<b>A</b>	<b>CHN</b>		
148	Hypolaïs icterine	<i>Hippolais icterina</i>	(Vieillot, 1817)		A		2 cris sont nécessaires pour des enregistrements seuls	
149	<b>Fauvette épervière</b>	<b><i>Sylvia nisoria</i></b>	<b>(Bechstein, 1795)</b>		<b>A</b>	<b>CHN</b>		
150	Fauvette mélanocéphale	<i>Sylvia melanocephala</i>	(J.F. Gmelin, 1789)		A			
151	Fauvette passerinette	<i>Sylvia cantillans</i>	(Pallas, 1764)		A			
152	Tichodrome échelette	<i>Tichodroma muraria</i>	(Linnaeus, 1766)		A			
153	Etourneau roselin	<i>Pastor roseus</i>	(Linnaeus, 1758)		A			
154	Etourneau unicolore	<i>Sturnus unicolor</i>	Temminck 1820		A			
155	<b>Grive dorée</b>	<b><i>Zoothera dauma</i></b>	<b>(Latham, 1790)</b>		<b>A</b>	<b>CHN</b>		
156	<b>Robin à flancs roux</b>	<b><i>Tarsiger cyanurus</i></b>	<b>(Pallas, 1773)</b>		<b>A</b>	<b>CHN</b>		
157	Gobemouche à collier	<i>Ficedula albicollis</i>	(Temminck, 1815)		A		2 cris sont nécessaires pour des enregistrements seuls	
158	Gobemouche nain	<i>Ficedula parva</i>	(Bechstein, 1794)		A		2 cris sont nécessaires pour des enregistrements seuls	
159	Monticole de roche	<i>Monticola saxatilis</i>	(Linnaeus, 1766)	Merle de roche	A			
160	<b>Tarier de Sibérie</b>	<b><i>Saxicola maurus</i></b>	<b>(Pallas, 1773)</b>	<b>Traquet pâtre oriental</b>	<b>A</b>	<b>CHN</b>		
161	<b>Traquet isabelle</b>	<b><i>Oenanthe isabellina</i></b>	<b>(Temminck, 1829)</b>		<b>A</b>	<b>CHN</b>		
162	<b>Traquet du désert</b>	<b><i>Oenanthe deserti</i></b>	<b>(Temminck, 1825)</b>		<b>A</b>	<b>CHN</b>		



**LISTE DES ESPECES SOUMISES A HOMOLOGATION EN NORMANDIE**

D'après la « Liste officielle des Oiseaux de France », édition 2020 (catégories A, B & C) - Commission de l'Avifaune Française (CAF) & la liste officielle du CHN (mise à jour en 2017)  
<https://cdnfiles1.biolovision.net/www.faune-france.org/userfiles/FauneFrance/FFEnSavoirPlus/LOF2020.pdf>  
[http://www.chn-france.org/upload\\_content/Liste\\_taxons\\_CHN\\_4.pdf](http://www.chn-france.org/upload_content/Liste_taxons_CHN_4.pdf)

Notez que toutes les autres espèces plus rares ne figurant pas encore sur la liste des oiseaux de Normandie sont aussi à soumettre au CHR

N°	Nom vernaculaire	Nom scientifique	Descripteur	Anciens noms	Catégories de la CAF	Statut CHN	Règle d'homologation	Commentaire
163	Traquet oreillard	<i>Oenanthe hispanica</i>	(Linnaeus, 1758)		A			
164	<b>Traquet pie</b>	<b><i>Oenanthe pleschanka</i></b>	<b>(Lepechin, 1770)</b>		<b>A</b>	<b>CHN</b>		
165	Cincla plongeur	<i>Cinclus cinclus</i>	(Linnaeus, 1758)		A			
166	<b>Moineau espagnol</b>	<b><i>Passer hispaniolensis</i></b>	<b>(Temminck, 1820)</b>		<b>A</b>	<b>CHN</b>		
167	Moineau friquet	<i>Passer montanus</i>	(Linnaeus, 1758)		A			Sauf colonie de Pontorson et sites de nidifications connues
168	Accenteur alpin	<i>Prunella collaris</i>	(Scopoli, 1769)		A		2 cris sont nécessaires pour des enregistrements seuls	
169	Bergeronnette d'Italie	<i>Motacilla flava cinereocapilla</i>	Savi, 1831	Bergeronnette printanière d'Italie	A			
170	<b>Bergeronnette des Balkans</b>	<b><i>Motacilla flava feldegg</i></b>	<b>Michahelles, 1830</b>		<b>A</b>	<b>CHN</b>		
171	Bergeronnette nordique	<i>Motacilla flava thunbergi</i>	Billberg, 1828	Bergeronnette printanière nordique	A			
172	Pipit de Richard	<i>Anthus richardi</i>	Vieillot, 1818		A			
173	<b>Pipit de Godlewski</b>	<b><i>Anthus godlewskii</i></b>	<b>Taczanowski, 1876</b>		<b>A</b>	<b>CHN</b>		
174	Pipit rousseline	<i>Anthus campestris</i>	(Linnaeus, 1758)		A			Sauf pour les falaises de Carolles et le cap de la Hève.
175	<b>Pipit à dos olive</b>	<b><i>Anthus hodgsoni</i></b>	<b>Richmond, 1907</b>		<b>A</b>	<b>CHN</b>		
176	Pipit à gorge rousse	<i>Anthus cervinus</i>	(Pallas, 1811)		A		2 cris sont nécessaires pour des enregistrements seuls	
177	<b>Roselin githagine</b>	<b><i>Bucanetes githagineus</i></b>	<b>(Lichtenstein, 1823)</b>		<b>A</b>	<b>CHN</b>		
178	<b>Roselin cramoisi</b>	<b><i>Erythrura erythrura</i></b>	<b>(Pallas, 1770)</b>		<b>A</b>	<b>CHN</b>		
179	<b>Linotte à bec jaune</b>	<b><i>Carduelis flavirostris</i></b>	<b>(Linnaeus, 1758)</b>		<b>A</b>	<b>CHN</b>		
180	Sizerin flammé	<i>Acanthis flammea</i>	(Linnaeus, 1758)		A			
181	<b>Bec-croisé perroquet</b>	<b><i>Loxia pytyopsittacus</i></b>	<b>Borkhausen, 1793</b>		<b>A</b>	<b>CHN</b>		
182	<b>Bec-croisé bifascié</b>	<b><i>Loxia leucoptera</i></b>	<b>Gmelin, JF, 1789</b>		<b>A</b>	<b>CHN</b>		

**LISTE DES ESPECES SOUMISES A HOMOLOGATION EN NORMANDIE**

D'après la « Liste officielle des Oiseaux de France », édition 2020 (catégories A, B & C) - Commission de l'Avifaune Française (CAF) & la liste officielle du CHN (mise à jour en 2017)  
<https://cdnfiles1.biolovision.net/www.faune-france.org/userfiles/FauneFrance/FFEnSavoirPlus/LOF2020.pdf>  
[http://www.chn-france.org/upload\\_content/Liste\\_taxons\\_CHN\\_4.pdf](http://www.chn-france.org/upload_content/Liste_taxons_CHN_4.pdf)

Notez que toutes les autres espèces plus rares ne figurant pas encore sur la liste des oiseaux de Normandie sont aussi à soumettre au CHR

N°	Nom vernaculaire	Nom scientifique	Descripteur	Anciens noms	Catégories de la CAF	Statut CHN	Règle d'homologation	Commentaire
183	Bruant à calotte blanche	<i>Emberiza leucocephalos</i>	S.G. Gmelin, 1771		A	CHN		
184	Bruant fou	<i>Emberiza cia</i>	Linnaeus, 1766		A		2 cris sont nécessaires pour des enregistrements seuls	
185	Bruant ortolan	<i>Emberiza hortulana</i>	Linnaeus, 1758		A		2 cris sont nécessaires pour des enregistrements seuls, sauf cris de type « Plik »	
186	Bruant nain	<i>Emberiza pusilla</i>	Pallas, 1776		A		2 cris sont nécessaires pour des enregistrements seuls	
187	Bruant mélanocéphale	<i>Emberiza melanocephala</i>	Scopoli, 1769		A	CHN		
188	Bruant à couronne blanche	<i>Zonotrichia leucophrys</i>	(Forster, 1772)		A	CHN		

**LISTE DES ESPECES SOUMISES A HOMOLOGATION EN NORMANDIE**

D'après la « Liste officielle des Oiseaux de France », édition 2020 (catégories D & E) - Commission de l'Avifaune Française (CAF) & la liste officielle du CHN (mise à jour en 2017)  
<https://cdnfiles1.biolovision.net/www.faune-france.org/userfiles/FauneFrance/FFEnSavoirPlus/LOF2020.pdf>  
[http://www.chn-france.org/upload\\_content/Liste\\_taxons\\_CHN\\_4.pdf](http://www.chn-france.org/upload_content/Liste_taxons_CHN_4.pdf)

Notez que toutes les autres espèces plus rares ne figurant pas encore sur la liste des oiseaux de Normandie sont aussi à soumettre au CHR

N°	Nom vernaculaire	Nom scientifique	Descripteur	Anciens noms	Catégories de la CAF	Statut CHN
1	Bernache de Hutchins	<i>Branta hutchinsii</i>	(Richardson, 1832)		E	CHN
2	Canard à faucilles	<i>Anas falcata</i>	Georgi, 1775		D	CHN
3	Damier du Cap	<i>Daption capense</i>	(Linnaeus, 1758)		E	CHN
4	Harle couronné	<i>Lophodytes cucullatus</i>	(Linnaeus, 1758)		E	CHN
5	Roselin pourpré	<i>Carpodacus purpureus</i>	(Gmelin, 1789)	<i>Haemorhous purpureus</i>	E	CHN
6	Spatule d'Afrique	<i>Platalea alba</i>	Scopoli, 1786		E	CHN

LISTE DES HYBRIDES & TAXONS AUTRES SOUMIS A HOMOLOGATION EN NORMANDIE

N°	Nom vernaculaire	Nom scientifique	Descripteur	Anciens noms	Catégories de la CAF	Statut CHN	Commentaire
1	Pouillot de type sibérien	<i>Phylloscopus collybita tristis / "fulvescens"</i>					Taxons proposés par Faune-France
2	Bergeronnette de la Manche	<i>M. f. flava X M. f. flavissima</i>					Non encore ouvert à la saisie sur Faune-France

Mise à Jour : 01/01/2023

Contact : secrétariat du CHR Normandie (GONm+LPO) : chr.normandie@gmail.com

#### Ressources

Liste CAF 2020

<https://cdnfiles1.biolovision.net/www.faune-france.org/userfiles/FauneFrance/FFEnSavoirPlus/LOF2020.pdf>

Liste des oiseaux soumis au CHN 2017

[http://www.chn-france.org/upload\\_content/Liste\\_taxons\\_CHN\\_4.pdf](http://www.chn-france.org/upload_content/Liste_taxons_CHN_4.pdf)

#### Catégories

**Catégorie A** = Espèces présentes à l'état sauvage en France métropolitaine y compris la frange maritime (Zone Économique Exclusive), observées au moins une fois depuis 1950 et dont l'origine naturelle est considérée comme la plus probable au moins pour un individu

**Catégorie B** = Espèces observées à l'état sauvage sur la même aire géographique, mais qui n'ont pas été revues depuis 1950.

**Catégorie C** = Espèces introduites ou échappées de captivité en France métropolitaine depuis plusieurs années, qui ont fait souche et dont au moins une population se maintient par reproduction en milieu naturel, indépendamment d'éventuels apports supplémentaires d'origine humaine

**Catégorie D** = Espèces pour lesquelles il existe au moins une mention dont l'origine naturelle est possible mais cependant pas la plus probable compte tenu des informations disponibles. L'arrivée de ces espèces en France métropolitaine a pu être aidée volontairement par l'Homme ou bien il s'agit d'échappés de captivité.

**Catégorie E** = Espèces supposées d'origine captive, mentionnées dans la littérature comme ayant été vues dans la nature en France métropolitaine

#### L'objectif du CHR

Le Comité d'Homologation Régional des oiseaux rares de Normandie (CHR Normandie GONm + LPO) rappelle que son objectif est d'authentifier et de publier l'ensemble des observations d'oiseaux rares de la région pour que les bases de données utilisées pour la connaissance des espèces soient les plus propres et réalistes possible. En janvier 2022, la totalité des données soumises au CHR Normandie a été validée, soit sur les anciennes bases locales de données du GONm et de la LPO soit sur le portail (Faune France).

Depuis 2019, l'ensemble des données naturalistes est répertorié et saisi sur les portails Faune France (ou sur le site miroir équivalent de Faune Normandie) de Biolovision.

Nous encourageons et incitons fortement tous les observateurs à utiliser ce portail national qui permet l'utilisation des données à une échelle régionale via les associations partenaires (GONm, LPO...), mais également à l'échelle nationale et internationale pour une meilleure connaissance et protection des espèces en France et dans le Monde.

#### L'homologation au CHR

Dans cette présente liste, rassemblant l'ensemble des espèces rares observées en Normandie, les espèces qui sont soumises à homologation au Comité d'Homologation National des oiseaux rares en France (CHN) se sont les règles d'homologation propre au CHN qui font foi.

Pour toutes les autres espèces de cette liste qui sont soumise au CHR il est demandé de systématiquement y associer une description détaillée (silhouette, coloration du plumage partie par partie, comportement, voix, conditions d'observation...) et/ou de joindre, tout document graphique disponible (photos, dessins, notes de terrain...) ou sonore (enregistrement, sonagramme) afin d'éliminer les autres espèces similaires.

Des règles particulières selon les espèces sont répertoriées dans cette présente liste (les feuilles suivantes de ce document) et, à noter que pour toute première donnée régionale (hors CHN), il est demandé une photo permettant d'identifier clairement l'espèce.

Avec l'essor grandissant des enregistrements, nous souhaitons attirer l'attention des observateurs sur les risques de cris aberrants d'espèce et/ou d'imitateurs, nous préconisons donc un enregistrement accompagné d'une description de l'oiseau, même brèves. Pour les enregistrements seul, un minimum de deux cris pour un certain nombre d'espèce difficile et aux cris monosyllabique sont nécessaire pour une homologation certaine (cf. « règle d'homologation » par espèce de cette liste).