

# Les oiseaux rares en Normandie en 2011

## Rapport du Comité d'Homologation Régional

Sébastien Provost & le CHR Normandie

Réuni le 9 décembre 2012 à Merville-Franceville et à Caen (14), le CHR Normandie a terminé l'examen de la 18ème circulaire, couvrant pour l'essentiel l'année 2011. Le nombre de fiches reçues est de 106 (59 en 2010). Le taux d'acceptation élevé (91,5%) témoigne de la qualité des fiches descriptives reçues, souvent accompagnées de photos. La liste des espèces CHR mise à jour et la fiche vierge à remplir sont téléchargeables sur ce lien <http://www.gonm.org/telechargements/chr-oiseaux-rares>. Ou sur demande au secrétariat du CHR : [chr.normandie@gmail.com](mailto:chr.normandie@gmail.com)

La dernière réunion s'est déroulée en présence des membres votants, excepté Jocelyn Desmares et Pascal Provost (excusés) : Bruno Chevalier, Jean-Pierre Marie, Benoît Lecaplain, Sébastien Provost et Gunter de Smet. Bruno et Sébastien se chargent de la circulation, de la communication, de la gestion et de la publication des données. Pascal a quitté notre région en juin 2012, le CHR Normandie le remercie vivement pour ses nombreuses années de service. Un nouveau membre va être élu en 2013.

### Travaux du CHR :

Le CHR rappelle que son objectif est d'authentifier et de publier les observations d'oiseaux rares à l'échelle régionale, sur la base de descriptions. Toute observation non envoyée au comité puis archivée dans la base de données et publiée dans la revue du GONm « *le Cormoran* » fait l'objet du commentaire suivant : « *donnée non soumise au CHR* ». Nous sommes à la disposition des ornithologues désireux d'en savoir plus sur l'intérêt de rédiger des fiches. Le comité correspond par ailleurs avec deux comités nationaux : le Comité d'Homologation National (CHN) et le Comité des Migrateurs Rares (CMR). Les espèces rares de niveau national sont également présentées dans ce bilan mais les décisions finales et avis relèvent du CHN (Reeber & le CHN).

A noter que quatre espèces ne sont plus soumises à homologation nationale depuis le 1<sup>er</sup> janvier 2013 (CHN 2012), les descriptions de ces espèces doivent désormais être adressées au CHR : le busard pâle, la buse pattue, le goéland à ailes blanches et l'étourneau roselin.

Le CHR tient à rappeler qu'il est préférable de rédiger la fiche dès que possible après l'observation, avec une description détaillée et si possible des notes sur le comportement, même si l'oiseau a été photographié. Les données anciennes sont toujours les bienvenues.



Les membres du CHR Normandie à Saint-Samson/14 le 8 décembre 2012 (B. Lecaplain, S. Provost, B. Chevalier, JP. Marie, G. de Smet, absents J. Desmares et P. Provost)

La **mésange rémiz** étant un migrateur rare mais régulier en Haute-Normandie (Eure, Seine-Maritime), le CHR a décidé de ne la maintenir de la liste qu'en Basse-Normandie, région où elle est toujours rare.


La **pie-grièche grise**, espèce nicheuse disparue du Calvados, demeure un migrateur occasionnel en Normandie. Elle fait son entrée sur la liste à compter du 1<sup>er</sup> janvier 2013. Une description précise et des photos sont conseillées pour identifier au mieux ce taxon polymorphe (cf la pie-grièche méridionale).

Enfin, nous rappelons que des descriptions d'anatidés hybrides sont prises en compte lorsqu'au moins un des « parents » est rare à l'échelle régionale ou nationale.

### Fiche ou pas fiche...

L'analyse du fichier historique du CHR Normandie (1987-2010) et de la base de données du GONm permet quelques comparaisons. D'une manière générale, les laridés (goéland bourgmestre par ex.) et acididés (mergule par ex.) font peu l'objet de descriptions, les *seawatchers* rédigeant généralement assez peu de descriptions (mais davantage depuis quelques années !). Concernant les anatidés, bien que les observations soient parfois réalisées par plusieurs observateurs et dans la durée, des fiches ne sont pas systématiquement rédigées, souvent faute de concertations. Par contre, chez les passereaux, la majorité des observations font l'objet de fiches descriptives.

## Répartition régionale des données reçues en 2011



### Les faits marquants :

Trois nouvelles espèces s'ajoutent à la liste des oiseaux de Normandie en 2011 : le **gypaète barbu**, le **robin à flancs roux** et le **traquet du désert**.

Les observations de la **bernache à cou roux** et d'un immature de **bernache du Pacifique** sont remarquables. La **sarcelle à ailes vertes** est la 4<sup>ème</sup> mention régionale. La donnée de **puffin majeur** est également à souligner car l'espèce est exceptionnelle en Manche. L'**ibis falcinelle** dans le Calvados s'ajoute aux rares observations régionales de l'espèce jusqu'à fin 2011. Un chanteur de **marouette poussin** est toujours un événement et l'estuaire de Seine fournit une nouvelle donnée. L'observation de la **grande outarde** est quant à elle la première mention contemporaine de l'espèce. Parmi les limicoles, une mention de **bécassine double** (*in* Reeber & le CHN, 2012), 2 **bécasseaux roussets** et une belle série d'observation de **bécasseaux de Temminck**, migrateur annuel mais discret. Notons aussi la 3<sup>ème</sup> mention de la **mouette de Franklin** et le 1<sup>er</sup> cas de reproduction régional de la **sterne de Dougall**, espèce toujours très rare en Manche. Le **guillemot à miroir** a fait un séjour prolongé et remarqué dans le Calvados. Chez les passereaux, deuxièmes mentions normandes pour deux pipits : le **pipit de Godlewski** et le **pipit à dos olive** (1<sup>er</sup> cas d'hivernage en France). L'observation de dix **pouillots à grands sourcils** dans le département de la Manche (record régional) montre que le statut de l'espèce peut encore évoluer... Enfin, quelques espèces nordiques se sont fait remarquer : la **buse pattue**, le **jaseur boréal** et la **linotte à bec jaune**.



Ibis falcinelle (D. Vigour)



Pipit de Godlewski (F. Jallu)



Traquet du désert (A. Verneau)



Goéland à bec cerclé (JP. Marie)

### Liste systématique des données acceptées :

\*Les espèces en **rouge** et suivies d'un astérisque sont soumises à homologation nationale (CHN) et donc occasionnelles en Normandie. Le CHR suit l'avis du CHN. Les espèces en **vert** sont considérées comme très rares en Normandie. Entre parenthèses, le premier nom est celui du découvreur et/ou rédacteur de la fiche.

#### **Cygne de Bewick** *Cygnus columbianus*

2010 : 3 adultes et 2 immatures le 22 décembre à Picauville/50 (J. Desmares).

Cygne toujours très rare en Normandie, dont les séjours sont souvent brefs. Autour de 200 individus séjournent en France chaque hiver, notamment dans le nord-est (Zucca & le CMR, 2010).

#### **Cygne chanteur** *Cygnus cygnus*

2010 : 5 adultes du 17 janvier au 14 février à Val-de-Reuil/27 (C. Gérard).

Un peu moins rare que le cygne de Bewick mais toujours irrégulier dans notre région et par ailleurs hivernant rare en France, de l'ordre de 100 à 200 individus (Zucca & le CMR, 2010).

#### **Bernache à cou roux** *Branta ruficollis*

1 adulte du 6 au 9 mars 2011 à la réserve naturelle de Beauguillot, Sainte-Marie-du-Mont/50 (A. Verneau *et al.*, in Reeber & le CHN, 2012), le même oiseau que celui signalé au havre de Regnéville/50 jusqu'en janvier 2011 (V. *Ornithos* 18-6 : 333).

#### **Bernache du Pacifique** *Branta bernicla nigricans*

1 adulte le 16 février 2011 sur l'herbu de Beauvoir/50 (S. Provost). 1 adulte consomme des algues vertes sur l'estran de Saint-Jean-le-Thomas/50, le 28 février 2011 (S. Provost). 1 individu de 1<sup>er</sup> hiver photographié le 29 mars 2011 à Granville/50 (S. Provost). 1 adulte le 10 décembre 2011 à Géfosse-Fontenay/14 (G. Vimard).

2010 : Jusqu'à 3 adultes en hivernage du 17 octobre au 22 avril 2011 à Saint-Vaast-la-Hougue/50 (A. Barrier, S. Crestey, R. Purenne).



Granville le 29 mars 2011 et Beauvoir le 16 février 2011 (S. Provost)

Les deux oiseaux notés en février en baie du Mont-Saint-Michel concernent peut-être des migrateurs pendant la remontée pré-nuptiale. Quant à la donnée de mars 2011, il pourrait s'agir d'une seconde mention française d'un oiseau immature (c'est un plumage également rarement rencontré en Grande-Bretagne). A noter le bel effectif hivernant (et régulier) dans le nord-est du Cotentin. Pas moins de 7 bernaches du Pacifique ont été observées en 2011 en Normandie, un record régional.

#### **Sarcelle marbrée** \* *Marmaronetta angustirostris*



2009 : 1 le 5 novembre 2009 à Léry-Poses/27 (C. Gérard). Cet oiseau a stationné du 4 au 7 novembre et a déjà fait l'objet d'une homologation au niveau national (Reeber & le CHN, 2010).

Rappelons que l'espèce avait ensuite été observée en septembre 2010, sur le même secteur (homologué par le CHN).

Léry-Poses le 5 novembre 2009 (C. Gérard)

**Erismature rousse** *Oxyura jamaicensis*

2009 : 3 du 4 décembre au 5 janvier 2010 à Val-de-Reuil/27 (D. Basley, C. Gérard).

Les observations régionales se raréfient, en lien avec le programme de limitation des effectifs de cette espèce inscrite sur la catégorie C de la Liste des Oiseaux de France. Selon Dubois (2012), le travail d'éradication de la population nicheuse française est devenu plus organisé. L'effectif nicheur en 2011 était de 41 couples. La tendance est stable et il y a désormais moins de 100 oiseaux en Grande-Bretagne contre 6000 au début des années 2000...

**Sarcelle à ailes vertes** \* *Anas carolinensis*

1 mâle les 12 et 13 mars 2011 sur la réserve du gros banc à Merville-Franceville/14 (JP. Marie). Ensuite, 1 mâle les 1<sup>er</sup> et 2 avril 2011 à la réserve naturelle de Beauguillot, Sainte-Marie-du-Mont/50 (N. Hull *et al.*, in Reeber & le CHN, 2012). Ce sont les 4<sup>ème</sup> et 5<sup>ème</sup> mentions régionales (première pour le calvados), sur environ 70 observations françaises (source [chn-france.org](http://chn-france.org))



Merville-Franceville le 12 mars 2011 (JP. Marie)

2009 : 1 mâle du 27 décembre au 5 janvier 2010 à Val-de-Reuil/27 (C. Gérard, C. Goujon). Donnée déjà citée dans le rapport CHN de 2009 (Reeber *et le CHN*, 2010) pour un oiseau ayant stationné du 11 décembre 2011 au 4 janvier 2010.

**Harelde boréale** *Clangula hyemalis*



Léry-Poses, février 2011 (C. Gérard)

Un mâle de 1<sup>er</sup> hiver est présent du 7 janvier au 20 mars 2011 à Varaville/14 (J. Jean-Baptiste, JP. Marie, D. Vigour, O. Zucchet).

Un autre mâle de 1<sup>er</sup> hiver est observé du 15 janvier au 25 février 2011 à Léry-Poses/27 (D. Basley, C. Gérard).

Toujours très irrégulière dans la région et migrateur rare en France avec généralement moins de 40 individus ces dernières années (Zucca & le CMR, 2010).

**Fuligule milouin X Fuligule nyroca** *Aythya ferina X Aythya nyroca*

1 le 6 novembre 2011 à Léry-Poses/27 (S. Provost, B. Chevalier, J. Desmares, B. Lecaplain, JP. Marie). Le CHR prend en compte les données d'hybrides dont au moins l'un des parents est inscrit à la liste CHR ou CHN.

**Blongios nain** *Ixobrychus minutus*

2005 : 1 femelle dans une travée de roselière le 26 août, à Saint-Arnoult/14 (E. Schmitt).

Le blongios reste un migrateur rare en Normandie (8<sup>ème</sup> mention homologuée par le CHR). L'espèce a niché en 2001 en estuaire de Seine.

**Crabier chevelu** *Ardeola ralloides*



Mondeville le 11 août 2011 (V. Voeltzel)



1 adulte photographié le 11 août 2011 à Mondeville/14 (V. Voeltzel), seulement la 2<sup>ème</sup> mention du fichier régional. Ce héron pourrait s'avérer de plus en plus régulier à l'avenir, au regard du nombre croissant de nicheurs en France.

**Puffin majeur** *Puffinus gravis*

2010 : 1 en vol le 18 septembre à environ 400 mètres du phare de Gatteville/50 (A. Guérard, A. Verneau). Remarquable observation (1<sup>ère</sup> pour le site) pour cette espèce occasionnelle en Manche. La dernière mention régionale homologuée date de juillet 1990 au large de Cherbourg.

**Océanite culblanc** *Oceanodroma leucorhoa*

1 en vol le 6 novembre 2011 à Gatteville-le-Phare/50 (A. Verneau, S. Crestey). L'espèce n'est pas observée tous les ans en Normandie, loin s'en faut... Le site le plus régulier en France pour l'observation de cette espèce est la digue du Clipon, à Dunkerque/59 (Zucca & le CMR, 2010).

**Pélican blanc** \* *Pelecanus onocrotalus*

2008 : 1 individu posé sur une mare de chasse du marais de la Touques/14, le 5 août 2008 (M et S. Schmitt). Donnée un peu ancienne (en cours de circulation au CHN) pour un oiseau dont l'origine sauvage est incertaine.

A noter que « Péli », le célèbre Pélican blanc du port d'Antifer/76, a été retrouvé mort le 13 février 2012. Il était présent dans cette région depuis 1973...

**Ibis falcinelle** *Plegadis falcinellus*



Mauvaines le 15 décembre 2011 (D. Vigour)

1 adulte du 13 au 16 décembre 2011 à Mauvaines/14 (D. Vigour, J. Jean-Baptiste, JP. Marie, O. Zucchet). Seulement la 7<sup>ème</sup> donnée homologuée par le CHR Normandie.

Ce sont ici les prémices d'une « vague » d'observations en Normandie en 2012, pour une espèce en pleine expansion en France...

**Flamant du Chili** *Phoenicopterus chilensis*

L'oiseau présent en baie du Mont-Saint-Michel depuis 1999 (originaire d'un parc zoologique) a été observé jusqu'en avril puis retrouvé mort fin mai 2012 au pied de l'îlot de Tombelaine (L. Loison, A. Gloux, S. Provost *et al.*, notes pers.).




Genêts, le 4 janvier et 22 novembre 2011 (A. Gloux)



le 8 mars 2011 (S.Provost)

### Gypaète barbu *Gypaetus barbatus*



Un jeune mâle issu d'un programme de réintroduction en Suisse (né en captivité au printemps 2010 et relâché le 13 juin 2010, équipé d'un émetteur), a survolé la Basse-Normandie entre le 4 et le 11 juin 2011, localisé en plusieurs endroits de la presqu'île du Cotentin notamment. Cet immature a ensuite continué sa route vers le nord avant de rejoindre son lieu d'origine (*vide* J.Jean-Baptiste). Première observation du gypaète en Normandie !

Source : [http://www.wild.uzh.ch/bg/sat/s\\_frame.php?bi=0&bg=0&ya=0&la=f&th=sat&st=2&su=sd3](http://www.wild.uzh.ch/bg/sat/s_frame.php?bi=0&bg=0&ya=0&la=f&th=sat&st=2&su=sd3)

### Vautour fauve *Gyps fulvus*

1 individu harcelé par une buse variable le 3 juin 2011 à Tortisambert/14 (A. Hugues). La dernière donnée homologuée datait de mai 2008 en vallée de Seine. L'erratisme du vautour fauve s'observe de plus en plus au nord de son aire de reproduction, parfois même jusqu'aux Pays-Bas...

### Buse pattue \* *Buteo lagopus*



Canapville le 27 décembre 2010 (E. Schmitt)

Un individu de 1<sup>er</sup> hiver les 4 et 5 janvier 2011 à Criquetot-l'Esneval/76 (D. Guédon, C. Vaudry). 1 autre 1<sup>er</sup> hiver le 21 octobre 2011 à Farceaux/27 (S. Nedellec).

2010 : 1<sup>er</sup> hiver le 27 décembre à Canapville/14 (E. Schmitt). La buse pattue n'est pas observée tous les ans en Normandie, loin de là..., ces observations sont donc remarquables et s'inscrivent dans le cadre d'un afflux sans précédent qui a touché la France au cours de l'hiver 2010-2011 (Reeber & le CHN, 2012).

### Circaète Jean-le-Blanc *Circaetus gallicus*

1 adulte en vol le 21 juin 2011 à Sandouville/76 (O. Gore, P. Provost, E. Rémond, G. Brière).



1<sup>er</sup> nid de circaète photographié en Normandie, hiver 2010-2011 (F. Jiguet)

2009-2010 : un jeune est entendu et vu le 30 juillet 2009 à Brestot/27 (F. Jiguet). L'année suivante, le même observateur entend les cris d'un jeune mi-août puis découvre un nid et des morceaux de coquilles d'œufs, correspondant exactement à la taille de l'œuf du circaète.

Aucune reproduction ne sera constatée en 2011 et 2012. La dernière nidification régionale du circaète datait de 1922 dans l'Orne (Letacq *in* Chartier, 2009). Il s'agit donc ici du 1<sup>er</sup> cas de reproduction contemporain en Normandie.

### Marouette poussin *Porzana parva*

1 chanteur près d'une mare de chasse le 9 juin 2011 à Saint-Vigor-d'Ymonville/76 (O. Gore, C. Blet-Charaudeau). Nouvelle donnée d'un chanteur en Estuaire de Seine, entendu un seul soir.

Il y a généralement entre 10 et 20 observations de marouette poussin chaque année en France, surtout dans les régions de l'est et le sud-est (Zucca & le CMR, 2010).

### Grue demoiselle \* *Grus virgo*



Beauvoir, novembre 2010 (S. Provost)

2010 : La donnée d'un jeune oiseau observé du 24 octobre au 11 novembre 2010 à Beauvoir/50 (B. Lecuyer, B. Vanhonsbrouck, S. Provost *et al.*) a été placée en catégorie A de la liste des oiseaux de France par la CAF (*in* Reeber & le CHN, 2012). Il s'agit d'une première mention Française d'un oiseau présumé sauvage (Provost, *in* ornithos, à paraître).

### Outarde barbue \* *Otis tarda*

1 jeune femelle du 18 décembre 2011 au 24 mars 2012 à Montchaton/50 (B. Chevalier, JC. Hébert, L. Vibert *et al.*). Donnée inscrite en catégorie E (« origine probablement captive ») du rapport CHN (Reeber & le CHN, 2012).



Montchaton le 2 janvier 2012 (S. Provost)



Montchaton le 13 janvier 2012 (R. Coulomb)

Née en Russie, réintroduite dans le sud-ouest de l'Angleterre en septembre 2011 et équipée d'un émetteur par le *Great Bustard Group*. Malgré un comportement très confiant, cette grande outarde a ensuite rejoint son lieu d'introduction britannique. En décembre 2012, 3 oiseaux issus de ce programme ont été observés en France (Vendée, Loire-Atlantique, Finistère).

### Outarde canepetière *Tetrax tetrax*

1990 : un oiseau tué à la chasse le 21 octobre à Hauteville-sur-mer/50 (anonyme *fide* A. Livory et A. Typlot). Donnée assez ancienne mais à retenir vu l'actuelle grande rareté de l'espèce en Normandie.

### Pluvier guignard *Charadrius morinellus*

4 adultes le 5 mai 2011 sur les pelouses dunaires de Surville/50 (R. Lemarchand). 1 adulte en mue le 25 août 2011 à Cricqueville-en-Bessin/14 (A. Brodin).

Il n'y a plus de site normand où ce pluvier est observé régulièrement... D'une manière générale, le nord-ouest de la France est une région peu visitée par l'espèce. Or, de l'ordre de 500 à 1000 guignards sont notés chaque année dans l'hexagone, surtout au passage postnuptial et plutôt sur la frange méditerranéenne (Zucca & le CMR, 2010).

### **Bécasseau de Temminck** *Calidris temminckii*

1 adulte le 1<sup>er</sup> mai 2011 sur une mare d'herbu à Beauvoir/50 (S. Provost). 2 adultes le 6 mai 2011 sur une mare de chasse de Goustranville/14 (JP. Marie). 1 adulte du 1<sup>er</sup> au 4 août 2011 sur une ancienne mare de chasse de Ver-sur-mer/14 (D. Vigour, O. Zucchet). 1 adulte à Saint-Côme-du-Mont/50 le 10 août 2011 (B. Lecaplain, D. Aubert, D. Vigour). Enfin, 1 juvénile le 16 septembre 2011 (B. Lecaplain) puis 1 adulte les 24 et 25 septembre (B. Lecaplain, A. Corbeau, S. Provost, A. Verneau et al.) à Sainte-Marie-du-Mont/50.



Goustranville le 6 mai 2011 (JP. Marie)



Ver-sur-mer le 3 août 2011 (D. Vigour)



Total de 7 bécasseaux de Temminck observés en 2011 et ayant fait l'objet d'une fiche CHR. L'espèce est notée aussi bien au passage prénuptial que postnuptial. En France, autour de 300-400 oiseaux sont comptés chaque année, en majorité sur le littoral méditerranéen (Zucca & le CMR, 2010).

### **Phalarope à bec large** *Phalaropus fulicarius*

1 adulte à Sainte-Marie-du-Mont le 16 janvier 2011 (A. Verneau, A. Guérard). 1 juvénile le 18 et 19 septembre 2011 à St-Martin-de-Bréhal/50 (E. Chabot, B. Chevalier, L. Lainé, S. Provost).



1 adulte en plumage internuptial le 19 septembre au Gast/50 (C. Girard). 1 en vol le 20 décembre 2011 à Ouistreham/14 (JP. Marie). 1 à Sandouville/76 le 20 octobre 2011 (A. Canny, O. Gore, P. Provost).

2010 : un 1<sup>er</sup> hiver le 4 septembre à Réthoville/50 (A. Verneau). Un 1<sup>er</sup> hiver le 25 octobre à Saint-Vaast-la-hougue/50 (S. Crestey, S. Josse).

*Le gast le 19 septembre 2011 (C. Girard)*

5 oiseaux observés en 2011 en Normandie et mention spéciale pour la donnée intérieure de l'étang du Gast. De l'ordre de 100 à 300 phalaropes à bec large sont observés chaque année en France (Zucca & le CMR, 2010), surtout depuis les caps de migration d'oiseaux de mer (Clipon, Cap-Gris-nez, Ouessant, etc...).

### **Bécasseau rousset** *Tryngites subruficollis*



Vrasville le 11 septembre 2011 (A. Verneau)

1 juvénile le 9 septembre 2011 à Vrasville/50 (A. Guérard) suivi de 2 juvéniles le 11 septembre (A. Verneau, D. & M. Mauras *et al.*, in Reeber & le CHN, 2012). Le Nord-Cotentin est visité assez régulièrement par ce bécasseau néarctique. L'année 2011 fait figure de record en France avec pas moins de 29 individus observés (*source CHN*).

2009 : 1 adulte le 20 mai à Merville-Franceville/14 (J. Jean-Baptiste *et al.*, in Reeber & le CHN, 2012).

**Bécasseau tacheté** *Calidris melanotos*

1 juvénile s'envole d'une mare halophile de l'herbu de Beauvoir/50, le 8 septembre 2011 (S. Provost).  
Espèce probablement annuelle, à rechercher à cette période sur les schorres littorales...  
A peine 20 oiseaux sont en moyenne observés chaque année en France (Zucca & le CMR, 2010).

**Bécassine double** *Gallinago media*

Observation à Sainte-Marie-du-Mont/50 le 19 avril 2012 (D. Davignon). C'est une rare mention régionale qui s'ajoute à huit autres données pour la France en 2011 (Reeber & le CHN, 2012).

**Labbe à longue queue** *Stercorarius longicaudus*

2 juvéniles en migration (pâle et intermédiaire) le 8 octobre 2011 à Gatteville-le-Phare/50 (A. Verneau, E. Martin, F. Morazé, D. Tavenon *et al.*).

Labbe occasionnel à rechercher sur les différents sites de seawatch de Normandie au passage postnuptial, bien que sa fréquence soit nettement plus rare que dans la région Nord-pas-de-Calais. Autour de 100 labbes à longue queue sont observés chaque année dans l'hexagone (Zucca & le CMR, 2010) mais les effectifs restent variables et peuvent osciller de plusieurs dizaines.

**Goéland à bec cerclé** *Larus delawarensis*

1 adulte en plumage internuptial le 19 septembre à Merville-Franceville/14 (JP. Marie).

2009 : 1 individu de 2<sup>ème</sup> hiver photographié le 24 octobre à Bonneville-sur-Touques/14 (E. Schmitt).



Merville-Franceville le 19 septembre 2011 (JP. Marie)



Bonneville le 24 octobre 2010 (E. Schmitt)



L'oiseau de Merville a été observé pour la première fois en décembre 2007. La dernière mention régionale d'un immature remontait à 2006.

Toujours rare sur le littoral de la Manche, le goéland à bec cerclé reste néanmoins régulièrement observé entre les côtes d'Armor et le bassin Aquitain. Autour de 30 oiseaux sont observés chaque année en France (Zucca & le CMR, 2010).

**Mouette de Franklin** \* *Larus pipixcan*



Saint-Pair-sur-mer le 15 octobre 2011  
(A. Corbeau, d'après vidéo)

Un oiseau de 2<sup>ème</sup> hiver est observé et filmé dans la soirée du 15 octobre 2011 à Saint-Pair-sur-mer/50 (A. Corbeau *et al.*, in Reeber et le CHN, 2012).

Les autres mentions normandes (toutes de la Manche) de ce laridé Néarctique remontent à février 2007 à Querqueville et à novembre 1997 à Gatteville-le-Phare. Il y a un peu plus de mentions homologuées en France (d'après *chn-france.org*).

### Sterne de Dougall *Sterna dougallii*



Chausey, juin 2011 (image caméra, GONm)

Après les observations de septembre 2010 à Saint-Pair-sur-mer/50 (3<sup>ème</sup> et 4<sup>ème</sup> mentions homologuées du CHR), la sterne de Dougall est de nouveau détectée (mais pas de fiche CHR reçue) : une tentative de reproduction a été observée dans les îles-Chausey, une « première » pour la Normandie (Gallien, 2011).

### Sterne hansel *Gelochelidon nilotica*

1 adulte en vol le 15 septembre 2011 à Ouistreham/14 (JP. Marie). Seulement la 6<sup>ème</sup> observation homologuée en Normandie.

### Guifette moustac *Chlidonias hybrida*

8 entre le 15 avril et le 17 mai 2011 à Bonneville-sur-Touques/14 (E. Schmitt, T. Couet). 1 au marais du vergeon à Vains/50 du 3 au 5 mai 2011 (F. le Goff, P. Percheron, S. Provost). 1 le 6 mai sur une mare de chasse de Goustranville/14 (JP. Marie). 3 le 7 mai au Val-de-Reuil/27 (M. Lorthiois). Enfin, 2 adultes le 14 septembre à Gorges/50 (B. Chevalier).



Bonneville-sur-Touques, mai 2011 (E. Schmitt)

2010 : 1 juvénile avec des guifettes noires le 7 septembre 2010 à Jullouville/50 (S. Cavallès, S. Provost).

2009 : 2 adultes le 27 mai à Saint-Côme-du-Mont/50 (A. et F. Corbeau).

Cette guifette fait son retour sur la liste CHR en 2011. Les mentions antérieures sont également prises en compte. Belle série d'observations en 2011 avec 15 oiseaux, surtout notés au passage prénuptial.

### Guillemot à miroir \* *Cephus grylle*

2010 : un individu de 1<sup>er</sup> hiver est présent du 24 octobre au 14 février 2011 à Saint-Pierre-du-Mont/14 (R. Purenne, JP. Marie, G. Vimard). Remarquable séjour pour un oiseau qui ne s'est pas montré si facilement...

Il existe une soixantaine de mentions de guillemot à miroir en France et moins de cinq répertoriées en Normandie (source *chn-France.org*).

### Macareux moine *Fratercula arctica*

1 en vol près de la côte de Gatteville-le-Phare/50 (A. et V. Verneau, E. Martin), le 8 octobre 2011. Alcidé toujours rare sur le littoral normand.

### Alouette haussecol *Eremophila alpestris*

Après l'observation de 2 oiseaux fin décembre 2010 (rapport CHR Normandie 2010), 1 le 3 février 2011 à Courtils/50 (S. Provost) puis 2 le 21 mars 2011 à Genêts/50 (B. Fontaine). En fin d'année, 1 le 15 novembre (S. Provost) et 2 du 10 décembre 2011 au 23 janvier 2012 à Courtils (B. et F. Duchenne, S. Provost *et al.*).

2010 : les 9 oiseaux de Réthoville/50 déjà signalés dans la circulaire de 2010 ont été observés jusqu'au 10 avril 2011 (A. Guérard, A. Verneau, JP. Marie, F. Duguet, F. Branswick *et al.*).



Courtils le 3 février 2011 (S. Provost)



Genêts le 21 mars 2011 (B. Fontaine)




Courtils le 15 novembre 2011 (SP)

Total de 6 oiseaux observés en 2011, un effectif inférieur à celui 2010 mais notable car l'espèce n'est pas observée tous les ans dans la région. En France, quelques dizaines à une centaine d'oiseaux sont observés tous les ans (Zucca & le CMR, 2010).

### Pipit rousseline *Anthus campestris*

Données figurant pour mémoire car l'espèce n'est pas soumise à homologation sur ces deux sites mais elle le reste ailleurs (sources GONm/migration.net) :

- Falaises de Carolles/50 : 18 en migration entre le 30 août et le 28 septembre dont 4 le 1<sup>er</sup> septembre (S. Provost, M. Beaufile, A. Corbeau *et al.*).
- Cap de la Hève à Saint-Adresse/76 : 1 en migration le 1<sup>er</sup> septembre (P. Provost, Y. Jacob) et 1 en migration le 25 septembre (O. Gore, C. Blet-Charaudeau).



L'effectif migrateur aux falaises de Carolles reste désormais à des niveaux bas, souvent en dessous des 20 individus...

Migration postnuptiale du pipit rousseline à Carolles (GONm/migration.net)

### Pipit de Richard *Anthus richardi*

6 en migration active à Carolles/50 entre le 28 septembre et le 7 novembre 2011 (S. Provost, R. Binard, M. Beaufile). 2 le 29 octobre 2011 à Auderville/50 (B. Lecaplain). 1 le 30 octobre à Réthoville/50 (A. Verneau, J. Barbe). 1 en migration le 20 novembre 2011 à Cricqueville-en-Bessin/14 (A. Rougeron) puis jusqu'à 5 en hivernage du 30 novembre 2011 au 25 janvier 2012 à Courtils/50 (S. Provost *et al.*).



Courtils le 28 décembre 2011 (Y. Blat)



le 18 décembre 2011 (F. Jallu)



le 30 novembre 2011 (S. Provost)

En 2011, un total de 15 pipits de Richard a été observé en Normandie (3<sup>ème</sup> record régional après les 19 en 2009 et 18 en 2003), tous en fin d'année et 11 d'entre eux en baie du Mont-Saint-Michel. Chaque année en France, plusieurs dizaines d'oiseaux à environ 80 oiseaux sont observés, surtout dans les départements côtiers des trois façades maritimes (Zucca & le CMR, 2010).

**Pipit de Godlewski** \* *Anthus godlewskii*

Un oiseau de 1<sup>er</sup> hiver a séjourné à Courtils/50 avec quelques pipits de Richard, entre le 30 novembre 2011 et le 9 janvier 2012 (S. Provost *et al.*).

Plus de cent dix ornithos se sont déplacés en décembre pour l'observer. Il s'agit de la 2<sup>ème</sup> mention régionale de ce passereau originaire d'Asie centrale, après un hivernage à Genêts/50, début 2008.



Courtils le 18 décembre 2011 (F. Jallu)



le 2 décembre 2011 (S. Provost)



le 31 décembre 2011 (C. Maurer)

Il existe dix mentions homologuées de pipit de Godlewski en France (source *chn-France.org*).

**Pipit à dos olive** \* *Anthus hodgsoni*

1 du 26 décembre 2011 au 6 janvier 2012 à Courtils/50 (W. Raitière, A. Mousseau, Y. Brillard *et al.*), découvert dans un arbre également fréquenté par un pipit de Godlewski et un pipit de Richard, une première pour la France !



Courtils le 26 décembre 2011 (W. Raitière)



27 décembre 2011 (S. Provost)

Une année remarquable pour les pipits rares en Normandie. Il s'agit ici de la seconde mention régionale de l'espèce après celle d'octobre 2009 à Carolles. Il y a un peu moins de 20 mentions françaises (source *chn-France.org*).

**Pipit à gorge rousse** *Anthus cervinus*

1 en migration active le 28 septembre 2011 à Carolles/50 (S. Provost). C'est la 7<sup>ème</sup> mention sur ce site en période migration postnuptiale, après celle de 2009. De l'ordre de 50 à 90 oiseaux sont notés tous les ans en France (Zucca & le CMR, 2010), surtout au passage pré-nuptial.

**Robin à flancs roux** \* *Tarsiger cyanurus*

1 le 15 octobre 2011 dans l'allée bocagère de la grande-île de Chausey/50 (S. Provost *et al.*).



Grande-île de Chausey le 15 octobre 2011 (S. Provost)

Première observation régionale de cette espèce originaire de la Taïga et 10<sup>ème</sup> mention française (source *chn-France.org*). Malgré sa discrétion et la concurrence « féroce » d'un rouge-gorge local, l'oiseau a été observé par la plupart des ornithos présents sur l'île ce jour là.

**Traquet du désert** \* *Oenanthe deserti*

1 femelle de 1<sup>ère</sup> année du 17 au 19 novembre 2012 à Chausey/50 (S. Provost, A. Hémon, P. Lepelley), suivie de près par l'observation d'un jeune mâle les 19 et 20 novembre à Gatteville-le-Phare (A. Verneau, V. Verneau *et al.*, in Reeber *et le* CHN, 2012). Premières mentions régionales de ce traquet. Au moins 5 individus ont été observés en France à la fin de l'automne 2011, seconde meilleure année après 1997 (Reeber & le CHN). Le nombre total de mentions françaises est de l'ordre de 35 individus (source *chn-France.org*).



Grande-île de Chausey le 18 novembre 2011 (S. Provost)

Gatteville-le-Phare le 19 novembre 2011 (A. Verneau)

**Tarier pâtre** (appelé **Tarier oriental**) \* *Saxicola torquatus maurus*

1 femelle de 1<sup>ère</sup> année le 20 octobre 2011 dans la réserve de Carolles/50 (D. Guillon, S. Provost). 3<sup>ème</sup> donnée régionale homologuée après celle de novembre 2006 à Agon-Coutainville/50. Il y a actuellement moins de 40 mentions françaises (source *chn-france.org*).



Carolles le 20 octobre 2011 (S. Provost)

### **Phragmite aquatique** *Acrocephalus paludicola*

Résultats du programme ACROLA du CRBPO/Museum d'Histoire Naturelle/Centre Régional de Baguage en Normandie.

43 captures dont 5 adultes (contrôle d'une femelle baguée au PN du Djoudj/Sénégal le 1<sup>er</sup> janvier 2011) du 1<sup>er</sup> au 28 août 2011 au marais du Cap à Montmartin-en-Graignes/50 (A. Chartier, J. Berthou, B. Mille, M. Muller, R. Purenne *et al.*). 1 autre capture sur un autre site de Montmartin-en-Graignes/50 le 10 août 2011 (B. Lecaplain, D. Aubert). 34 captures (dont 2 adultes et 1 juvénile bagué trois jours plus tôt en Estuaire de Seine/76) entre le 9 et le 20 août 2011 à Genêts/50 (S. Provost, A. Corbeau, C. Beauvils *et al.*). 1 le 20 août 2011 à Carentan/50 (B. Lecaplain, D. Aubert). 6 juvéniles capturés du 22 au 31 août 2011 à Saint-Côme-du-Mont/50 (B. Lecaplain, A. Corbeau, A. Petiteau). 77 captures au camp du Hode/76 (P. Provost, D. Hémerly *et al.*) en août et 8 en vallée du Seine (G. Ranvier). Et 1 juvénile vu le 2 septembre 2011 sur l'herbu de Genêts (S. Provost).



Genêts le 6 août 2011 (A. Corbeau) fem. ad. baguée en Afrique, contrôlée à Montmartin le 13 août 2011 (A. Chartier)

170 phragmites aquatiques ont été notés en 2011 en Normandie. Les marais de Carentan confirment leur rôle attractif pour l'espèce. Un nouveau contrôle entre l'Estuaire de Seine et la baie du Mont-Saint-Michel confirme la complémentarité entre sites de halte migratoire.

Actuellement en France, autour d'un millier de phragmites aquatiques sont capturés chaque année (source *forum bagueurs*), essentiellement en estuaire de Gironde, baie de l'Aiguillon, estuaire de la Loire et estuaire de Seine.

### **Pouillot à grands soucils** \* *Phylloscopus inornatus*

Après un automne 2010 sans observation régionale (peu de recherches spécifiques), le PGS fait une apparition remarquable en 2011 : 2 le 13 octobre et 1 le 14 octobre 2011 sur la grande-île de Chausey/50 (S. Provost, F. Gallien, C. Girard, L. Loison, B. Mottin *et al.*) et 2 nouveaux le 14 octobre à la pointe de la tour/Chausey (S. Provost), soit 3 oiseaux le même jour. Toujours à Chausey, 1 dans le bocage central de la grande-île du 15 au 17 octobre (S. Provost, C. Girard) et 3 nouveaux le 28 octobre (J.C. Delattre), 1 le lendemain (A. Corbeau, S. Provost). Egaleme nt 1 le 14 octobre 2011 à Agon-Coutainville/50 (B. Lecaplain). 1 dans la vallée du Lude à Carolles/50 le 26 octobre (E. Perret).



Chausey (S. Provost) et Agon le 14 octobre (B. Lecaplain)

Uniquement des observations dans la Manche, 10 oiseaux en tout, et un record régional (après les 6 de 2008) dont 8 pour la seule grande-île de Chausey. Ces recherches ciblées montrent que le statut de l'espèce pourrait évoluer au rang de « rareté régulière ».

En France, autour de 100 PGS sont désormais observés tous les ans, en majorité entre le Nord et le Finistère (Zucca & le CMR, 2010).

### Gobemouche nain *Ficedula parva*

Un 1<sup>er</sup> hiver observé près de l'observatoire de la réserve du gros banc, à Merville-Franceville/14, le 11 septembre 2011 (JP.Marie). Seulement la 5<sup>ème</sup> donnée homologuée en Normandie (source CHR/CHN)

### Mésange à longue queue « nordique » \* *Aegithalos caudatus caudatus*

Deux nouvelles observations après les premières mentions régionales de ce taxon à l'automne 2010 :



Hérouville le 19 janvier (E. Robbe)

8 dont une se heurtant contre une baie vitrée le 19 janvier à Hérouville-Saint-Clair/14 (E. Robbe), l'oiseau s'est ensuite envolé. Une *caudatus* dans un groupe de mésanges à longue queue le 11 février à Val-de-Reuil/27 (D. Baley).

En France, 660 oiseaux ont été homologués comme « *caudatus* » durant l'afflux sans précédent de 2010-2011, il s'agit des premières mentions authentifiées dans l'hexagone (Reeber & le CHN, 2012).

### Rémiz penduline *Remiz pendulinus*

2 femelles adultes capturées le 16 octobre et 4 oiseaux observés le 17 octobre 2011 à Pirou/50 (J. Pigeon). 5 captures dont 3 mâles le 26 octobre à Saint-Côme-du-Mont/50 (B. Lecaplain, A. Petiteau). 2 du 29 décembre 2011 au 1<sup>er</sup> janvier 2012 au Val-de-Reuil/27 (F. Bizon, C. Gérard). « Présence régulière » notée en Estuaire de Seine durant l'automne 2011 (P. Provost, comm.pers.).

2009 : 1 adulte le 25 octobre à Tourgeville/14 (E. Schmitt). La description ne permet pas en revanche d'avoir une idée sur le sexe de l'oiseau.

Les données d'octobre dans la Manche sont à souligner car l'espèce y est rare.

A compter du 1<sup>er</sup> janvier 2013, cette espèce restera uniquement soumise à homologation dans la région Basse-Normandie (migrateur rare mais régulier en Haute-Normandie).

### Jaseur boréal *Bombycilla garrulus*

Un posé dans un sorbier le 4 janvier 2011 au Tilleul/76 (D. Guédon, C. Lethuillier).



Le Tilleul le 4 janvier 2011 (C. Lethuillier)

2010 : 2 vus et entendus en vol le 23 octobre à Théville/50 (A. Verneau).

Les observations de jaseurs restent toujours occasionnelles en Normandie, malgré les informations régulières et quasi-annuelles en provenance du Nord-pas-de-Calais notamment. En dehors de contextes irruptifs pouvant engendrer l'observation de quelques centaines à quelques milliers de jaseurs en France, seulement quelques dizaines sont observés chaque année (Zucca & le CMR).

### Corneille mantelée *Corvus cornix*



Vains le 9 mai 2011 (S. Provost)

1 en vol au-dessus de la vasière de Vains/50, le 9 mai 2011 (S. Provost). Espèce toujours très rare dans la région, en provenance d'Irlande ou des pays de l'est.

En dehors de la Corse où l'espèce niche, de l'ordre de 100 à 300 corneilles mantelées sont observées chaque année en France (Zucca & le CMR, 2010), surtout dans le quart sud-est du pays et de plus en plus rarement dans le nord.

**Linotte à bec jaune** \* *Carduelis flavirostris*

3 le 11 janvier 2011 à Brévands/50 (J. Desmares).

Espèce devenue rarissime en Normandie (dernière mention homologuée en 2005 à Carolles). Depuis le 1<sup>er</sup> janvier 2012, la linotte à bec jaune est soumise à homologation nationale. Les effectifs hivernants semblent désormais se maintenir à des niveaux très faibles (Zucca & le CMR, 2010), avec tout au plus quelques dizaines d'oiseaux.

**Bruant ortolan** *Emberiza hortulana*

Après 23 ortolans en migration à la fin de l'été 2010, nettement moins d'oiseaux détectés en 2011 à Carolles : 6 entre le 22 août et le 2 septembre 2011 dont 2 posés (S. Provost, M. Beaufils).

**Liste des données non homologuées** (données reçues au CHR, ainsi que des copies des fiches CHN) :

**Oie des neiges** \* *Anser caerulescens*

2008 : une vingtaine en vol le 15 octobre à Bonneville-sur-Touques. Cette observation assez brève manque de précisions (bec notamment). L'effectif laisse supposer qu'il s'agisse d'échappées de captivité.

**Tadorne casarca** *Tadorna ferruginea*

Un hybride possible avec le Tadorne de Belon le 20 janvier 2011 à Beauvoir/50. Pas de description et photo de mauvaise qualité.

2009 : 5 le 18 octobre à Léry-Poses/27. Aucune description ni photo.

Pour rappel, cette espèce a été retirée de la liste des espèces soumises à homologation.

**Fuligule nyroca** *Aythya nyroca*

2009 : 1 mâle du 12 décembre au 8 janvier 2010 à Val-de-Reuil/27. Malheureusement, la description (sans photo) ne permet pas d'exclure un éventuel hybride.

**Blongios nain** *Ixobrychus minutus*

2006 : 1 chanteur le 27 mai à Tourgeville/14. Description du chant manquant de précision, oiseau non observé.

**Bécassine double** \* *Gallinago media*

Une observation le 5 août 2007 et le 20 septembre 2009 à Tourgeville/14. Le milieu et les circonstances d'observations sont bien décrits mais les descriptions manquent de précisions pour acquérir la certitude sur l'espèce.

**Bécasseau semipalmé** \* *calidris pusilla*

1 le 12 septembre à Huisnes-sur-mer/50. Bien que des éléments fassent penser à cette espèce, la distance d'observation assez importante, la description incomplète et les photos ne permettent pas d'exclure totalement un bécasseau minute *Calidris minuta*, de 1<sup>er</sup> été.

**Pouillot ibérique** *Phylloscopus ibericus*

1 chanteur le 16 avril 2011 à Héricourt-en-caux/76. C'est sans doute cela mais la description du chant manque de précisions. Les deux seules mentions régionales étaient accompagnées d'enregistrements.

**Remerciements** : Les membres du CHR Normandie remercient vivement tous les ornithologues qui transmettent leurs fiches descriptives et photographies.

**CHR Normandie**

[chr.normandie@gmail.com](mailto:chr.normandie@gmail.com)

## **Bibliographie :**

**Chartier A.** in Debout, G. coord. (2009) – Atlas des oiseaux nicheurs de Normandie. 2003-2005. Le Cormoran, 17 (1-2) : 102.

**Dubois PJ.** (2012). Les populations allochtones en France en 2011 (2<sup>ème</sup> enquête nationale). Ornithos 19-4 : pages 225-250.

**Gallien F.** (2011). Première nidification de la Sterne de Dougall en Normandie, dans la réserve des îles Chausey (Manche). Alauda 79 (4) : 265-268.

**Mission Migration.** [www://migraction.net](http://migraction.net)

**Provost S. & le CHR Normandie** (2011). Les oiseaux rares en Normandie en 2010 (17<sup>ème</sup> circulaire). Rapport du Comité d'Homologation Régional.

**Provost S.** (2012). Les oiseaux de la baie du Mont-Saint-Michel en 2011. GONm / BV / AESN. 170 p.

**Provost S.** (2012) : Migrations sur la Grande-île de Chausey (50) : octobre 2011. 25 p.

**Reeber S. & le CHN** (2010). Les oiseaux rares en France en 2009. 27<sup>ème</sup> rapport du Comité d'Homologation National. Ornithos 17-6.

**Reeber S. & le CHN** (2012). Les oiseaux rares en France en 2011. 29<sup>ème</sup> rapport du Comité d'Homologation National. Ornithos 19-6 : 353-395.

**Zucca M. & le CMR** (2010). Les observations d'oiseaux migrateurs rares en France (année 2007). Ornithos 17-1 : pages 2-43.