



Les oiseaux rares en Normandie en 2013

Rapport du Comité d'Homologation Régional

Sébastien Provost & le CHR Normandie
(septembre 2014)

Réuni le 29 août 2014 à Caen (14), le **CHR Normandie** a terminé l'examen de la 20ème circulaire, couvrant pour l'essentiel l'année 2013. Le nombre de fiches reçues est de 114 (92 en 2012). Le taux de données acceptées reste à un niveau élevé (94,3%). Les fiches descriptives reçues, souvent accompagnées de photos, sont souvent de bonnes qualités. La liste des espèces CHR mise à jour, la fiche type à remplir et les rapports annuels sont téléchargeables sur le lien [http://gonm.org/index.php?post/CHR-\(Comité-d-Homologation-Régional\)](http://gonm.org/index.php?post/CHR-(Comité-d-Homologation-Régional)). Ou sur demande au secrétariat du CHR : chr.normandie@gmail.com.

La dernière réunion s'est déroulée en présence des membres votants suivants : Benoît Lecaplain, Matthieu Lorthiois, Jean-Pierre Marie, Sébastien Provost (secrétaire), Gunter de Smet et David Vigour (élu en 2014, en remplacement de Bruno Chevalier). Jocelyn Desmares absent (excusé).

Travaux du CHR :

Le CHR rappelle que son objectif est d'authentifier et de publier les observations d'oiseaux rares à l'échelle régionale, sur la base de descriptions (et/ou photos). Pour rappel, quatre espèces ne sont plus soumises à homologation nationale depuis le 1^{er} janvier 2013 (CHN 2012), les descriptions de ces espèces doivent être adressées au CHR : le **busard pâle**, la **buse pattue**, le **goéland à ailes blanches** et l'**étourneau roselin**. La **mésange rémiz** étant un migrateur rare mais régulier en Haute-Normandie (Eure, Seine-Maritime), le CHR a décidé en 2013 de ne la maintenir de la liste qu'en Basse-Normandie, région où elle est toujours rare. La **pie-grièche grise**, espèce nicheuse disparue du Calvados, demeure un migrateur occasionnel en Normandie, elle a fait son entrée sur la liste le 1^{er} janvier 2013.

Les faits marquants en 2013 :

On retiendra tout d'abord l'observation de sept **bernaches du Pacifique** (dont un immature), un **puffin cendré** à Gatteville, un total régional de cinq **océanites cublanc**, un **blongios nain** dans l'Orne et un groupe de dix **ibis falcinelles** en baie du Mont-Saint-Michel. Pour les rapaces, citons l'observation d'une **buse pattue** et d'un **élanion blanc**. Rien de particulier chez les limicoles rares cette année hormis la double mention de **chevalier stagnatile** et un total de dix **pluviers guignards**. Chez d'autres migrateurs maritimes, on notera la belle série d'observation de six **labbes à longue queue** et plusieurs **goélands pontiques** bagués mais aussi deux **goélands bourgmestres**, un **goéland à ailes blanches**, quatre **sternes caspiennes** et deux **sternes « exotiques »**. Chez les passereaux, l'année aura été excellente pour l'**alouette haussecol** avec trente oiseaux, de même pour le **poillot à grands sourcils** avec un nouveau record à seize individus. Enfin, on remarquera deux données de **pie-grièche à tête rousse**, l'observation d'une **hirondelle rousseline** en Seine-Maritime et de nouvelles mentions hivernales du **jaseur boréal**.



Goéland bourgmestre
(J.L. Reuzé)



Phalarope à bec large
(P. Bernardin)



Chevalier stagnatile
(S. Provost)



Alouette haussecol
(P. Bernardin)



Pie-grièche à tête rousse
(G. Corteel)

Liste systématique des données acceptées :

Les espèces en **vert** sont considérées comme très rares en Normandie (aucune observation certaines années). Entre parenthèses, le premier nom est celui du découvreur et/ou rédacteur de la fiche.

Cygne chanteur *Cygnus cygnus*



2 le 29 mars à Réthoville/50 (E. Willay, L. Barenton). 1 le 26 novembre à l'ENS des Pont-d'ouve/Saint-Côme-du-Mont/50 (B. Lecaplain, A. Herouard, MN. Drouet).

3 oiseaux en 2013, c'est plutôt bien car la dernière mention homologuée datait de 2010. Cependant, l'espèce reste parfois « oubliée » et ne fait pas toujours l'objet de fiche CHR...

Saint-Côme-du-Mont, le 26 novembre 2013 (B. Lecaplain)

Bernache du Pacifique *Branta bernicla nigricans*



1 adulte sur le grand herbu à l'ouest du Mont-Saint-Michel/35-50 les 8 et 17 janvier (S. Provost). 1 oiseau de 1^{er} hiver le 8 février à Vains/50 (S. Provost) puis le 9 mars à l'ouest du Mont-Saint-Michel (JL. Reuzé). 1 adulte le 8 avril à Granville/50 (S. Provost). Jusqu'à 3 adultes à Saint-Vaast-La-Hougue/50 et aux alentours du 20 novembre au 6 mars 2014 (A. Barrier, A. Purenne, S. Crestey *et al.*).

2012 : Jusqu'à 4 du 10 novembre au 9 avril 2013 à Saint-Vaast-La-Hougue/50 (R. Purenne, S. Crestey *et al.*).

Granville, le 8 avril 2013 (S. Provost)

Soit au moins 7 oiseaux différents observés en 2013, comme en 2011 (4 en 2012). La donnée d'immatrice est la seconde mention régionale après celle de mars 2011 à Granville.

Harelde boréale *Clangula hyemalis*



1 le 24 novembre à Anneville-Ambourville/76 (G. Chevrier, L. Belin) et 1 à Montfarville/50 le 14 décembre (T. Daumal *et al.*).

Espèce d'apparition toujours irrégulière sur les côtes normandes... Les dernières mentions régionales dataient de 2011.

Anneville-Ambourville, le 24 novembre 2013 (G. Chevrier)

Puffin cendré *Calonectris diomedea*

1 en migration le 29 octobre à Gatteville-le-Phare/50 (A. Verneau, F. Malvaud).

Puffin d'apparition toujours occasionnelle en Manche (dernière mention homologuée en 1990 à Saint-Jouin-Bruneval/76 !). Gatteville est un bon spot pour les grands puffins car un puffin majeur *Puffinus gravis* y a été observé en septembre 2010.

Océanite culblanc *Oceanodroma leucorhoa*

1 le 10 octobre à Colleville-Montgomery/14 (JP. Marie). 3 le 12 octobre et 1 le 29 octobre à Gatteville-le-Phare/50 (A. Verneau, A. Guérard, F. Malvaud). 1 le 4 novembre à Colleville-Montgomery/14 (JP. Marie).

L'assiduité des « seawatchers » est récompensée car, même si cette espèce reste d'apparition quasi-annuelle sur les côtes normandes, ce sont toujours de petits effectifs. Il y a eu une donnée homologuée en 2011 mais aucune en 2012.

Blongios nain *Ixobrychus minutus*

1 le 1^{er} juin au marais de Briouze/61 (S. Lecocq).

2011 : 1 femelle le 20 mai au Val-de-Reuil/27 (C. Gérard).

Belle donnée Ornaise (dernière mention homologuée dans ce département en 1997). La dernière observation homologuée en Normandie datait de 2008 au Val-de-Reuil/27, qui reste sans doute le meilleur endroit pour observer l'espèce dans la région.

Ibis falcinelle *Plegadis falcinellus*



Pontorson, le 2 octobre 2013 (S. Provost)

Groupe remarquable de 10 oiseaux les 27 septembre et 2 octobre à Pontorson/50 (S. Provost, M. Le Bail, A. Leclerc). 2 en vol le 23 novembre à Saint-Arnoult/14 (E. Schmitt, A. Matthiau).

Après une année 2012 mémorable (7 oiseaux observés) et uniquement sept mentions régionales antérieures, l'espèce poursuit son essor, avec ici un effectif record pour la région.

Buse pattue *Buteo lagopus*

1 en vol le 8 décembre à Bérigny/50 (T. Cherezy *et al.*).

En dehors de contexte irruptif, l'espèce reste très occasionnelle dans notre région. Un oiseau avait été observé dans la Manche en 2012. Pour rappel, l'espèce reste uniquement soumise à homologation régionale depuis le 1^{er} janvier 2013.

Elanion blanc *Elanus caeruleus*

1 le 25 janvier à Quettehou/50 (D. Lung).

La dernière observation régionale datait de fin 2012 en baie du Mont-Saint-Michel. En progression, ce superbe rapace est de plus en plus observé au nord de son aire de répartition...

Pluvier guignard *Charadrius morinellus*

3 le 10 avril à Courtils/50 (R. Pilon). 5 le 1^{er} mai à Cheux/14 (JM. Hamel). 1 le 5 mai à Sainte-Marie-du-Mont/50 (E. Martin). 1 le 21 août à Genêts (S. Provost, C. Beauvils). Bel effectif printanier de 9 oiseaux et 1 seul détecté en période postnuptiale. Il n'y avait pas eu de mention en 2012.

Chevalier stagnatile *Tringa stagnatilis*



1 adulte nuptial du 3 au 7 avril 2013 à Dragey-Ronthon/50 (S. Provost *et al.*).
1 juvénile dans l'anse de Moidrey à Pontorson/50 du 22 au 25 juillet (S. Provost, A. Hemon).

Dragey, le 3 avril 2013 (S. Provost)

Deux mentions régionales la même année et dans un même secteur (baie du Mont-Saint-Michel), c'est exceptionnel. La dernière observation régionale homologuée datait de 2007.

Phalarope à bec large *Phalaropus fulicarius*



1 les 2 et 3 novembre à Vauville/50 (P. Bernardin, F. Noël, T. Desmarest). 1 en migration le 10 novembre à Ouistreham/14 (JP. Marie). 1 le 29 décembre à Cocqueville/50 (S. Crestey, J. Bozec, F. Noël).

3 oiseaux en fin d'année, à la suite de forts coups de vent...

Vauville, le 3 novembre 2013 (P. Bernardin)

Bécasseau tacheté *Calidris melanotos*

1 le 16 août à Bréhal/50 (B. Chevalier).

C'est le seul bécasseau néarctique observé en Normandie en 2013 contre 4 bécasseaux tachetés en 2012.

Bécasseau de Temminck *Calidris temminckii*

1 le 7 août au-devant de l'herbu-ouest du Mont-Saint-Michel/35-50 (Y. Daniel).

2011 : 3 le 1^{er} mai à Poses/27 (C. Gérard).

Un seul oiseau homologué en 2013, comparé aux 4 oiseaux de 2012.

Labbe à longue queue *Stercorarius longicaudus*



1 trouvé mort le 27 août à Saint-Vaast-d'Equiqueville/76 (V. Poirier *fide* S. Provost). Le 11 septembre, 2 identifiés en migration à Saint-Valéry-en-caux (B. Paepegaey, Y. Jacob) et 1 à Cricqueville-en-Bessin (B. Lecaplain). Enfin, 1 le 27 septembre à Gatteville-le-Phare (P. Bernardin) et 1 le 6 octobre à la pointe de Granville/50 (B. Chevalier).

Au gré des séances de *seawatch*, le labbe à longue queue reste un visiteur irrégulier. L'automne 2013 est un bon cru avec 5 migrateurs observés et 1 juvénile trouvé mort (dernières mentions régionales homologuées en 2011).

Gatteville, le 27 septembre 2013 (P. Bernardin)

Goéland à bec cerclé *Larus delawarensis*



1 adulte (patte cassée) du 20 janvier au 2 mars puis le 15 septembre à Villers-sur-Mer/14 (T. le Huu Nghia).

2012 : 1 adulte (patte cassée) du 11 février au 2 mars puis du 11 septembre au 21 décembre à Villers-sur-Mer/14 (T. le Huu Nghia).

Il s'agit de l'oiseau habituel « à une patte » observé pour la première fois en 2007. Où se trouve-t-il en période de reproduction ?

Villers-sur-Mer le 15 sept. 2013 (T. le Huu Nghia)

Goéland pontique *Larus cachinnans*



Le Havre, le 12 septembre 2013 (D. le Guillou)

1 oiseau porteur de bagues le 12 août à Courseulles-sur-Mer/14 (E. Chabot). 1 pontique de 1^{ère} année également bagué, observé du 12 au 14 septembre au Havre/76 (D. Le Guillou).

2012 : 1 immature de 2^{ème} année bagué, photographié, le 11 février à Villers-sur-Mer/14 (T. Le Huu Nghia).

2011 : 1 premier hiver bagué, photographié, du 19 au 25 novembre à Dives-sur-Mer/14 (T. Le Huu Nghia). Malgré son bec assez court et fort, cet oiseau rentre dans les variations du pontique, raison pour laquelle il a été homologué.

Belle série d'observations et mentions estivales rares pour une espèce dont les oiseaux bagués permettent souvent de certifier l'origine et l'appartenance spécifique, mais pas toujours ! (cas des hybrides possibles parmi les colonies nicheuses mixtes d'Europe de l'est). Les lecteurs de bagues font sérieusement progresser les connaissances sur la fréquence de ce laridé en Normandie.

Goéland bourgmestre *Larus hyperboreus*



Fécamp, le 1^{er} mars 2013 (JL. Reuzé)



Vains, le 29 janvier 2013 (S. Provost)



1 ind. de 1^{er} hiver le 3 janvier à Genêts/50 (JL. Reuzé) puis probablement le même du 29 janvier au 2 février à Vains/50 (Ecomusée, S. Provost *et al.*). 1 adulte le 1^{er} mars dans le port de Fécamp/76 (JL & L. Reuzé).

Beau doublé pour cet observateur Mayennais ! L'oiseau de la baie du Mont-Saint-Michel s'alimentait sur des carcasses de moutons de prés-salés. La dernière mention du CHR date de 2011 à Barfleur/50.

Goéland à ailes blanches * *Larus glaucoides*

2012 : 1 le 26 décembre à Crosville-sur-Douve/50 (J. Desmares, *in chn-France.org*).

Nouvelle apparition de ce laridé néarctique en Normandie, après l'afflux de l'hiver 2011/2012 qui concernait 4 oiseaux. Pour rappel, l'espèce reste seulement soumise à homologation régionale depuis le 1^{er} janvier 2013.

Sterne caspienne *Hydroprogne caspia*



1 le 24 avril à Courcelles-sur-Seine/76 (M. Lorthiois). 1 adulte le 11 juillet à Dragey-Ronthon/50 (S. Provost, D. Lemaréchal). 2 le 30 septembre à Brévands/50 (M. Collard).

Ce nombre d'individus (4) est rarement atteint sur une année en Normandie ; deux oiseaux avaient été vus dans le Calvados en 2012.

La mention printanière est à souligner car plus inhabituelle.

Brévands, le 30 septembre 2013 (M. Collard)

Sterne « à bec orange » *Sterna maxima/bengalensis/elegans* ou hybride

1 le 23 octobre à Saint-Pair-sur-Mer/50 (P. Desgué), revue début novembre au même endroit (G. Cauca). Cette donnée figure ici pour mémoire car cette appellation de « sterne à bec orange » n'est pas prise en compte par le CHN. Les observateurs n'ont pu observer tous les critères nécessaires à l'identification de l'une des trois espèces et permettant d'écartier un éventuel hybride. La dernière mention homologuée d'une « sterne à bec orange » en Normandie date de l'été 2001 à Genêts/50 (sterne voyageuse).

Sterne fuligineuse/bridée *Sterna fuscata/anaethetus*

1 en vol le 27 août au devant du polder Foucault à Beauvoir/50 (S. Provost). Cette donnée figure à titre d'information dans ce rapport car le double taxon n'est plus inscrit sur la liste du CHN, s'agissant ici de l'une ou l'autre espèce.

Guifette moustac *Chlidonias hybrida*



A la réserve de la Grande Noé/14, 1 le 14 avril (D. Basley), 7 les 13-14 avril (C. Gérard), 9 le 17 avril (M. Lorthiois, C. Gérard, L. Lapalusière) puis 3 le 5 mai à l'étang Hérouard (M. Lorthiois, L. Lapalusière, D. Basley). 12 le 2 mai au lac des deux amants au Val-de-Reuil/27 (D. Basley).

Il y a probablement eu une vingtaine d'oiseaux différents dans l'Eure, département le plus visité par l'espèce. En 2012, seulement 4 oiseaux avait été vus, tous dans la Manche.

Pour rappel, cette guifette a fait son retour sur la liste du CHR en 2011.

La Grande-Noé, le 18 avril (C. Gérard)

Macareux moine *Fratercula arctica*

1 au large de Fécamp/76 le 12 février (D. le Guillou, F. Gallien).

2008 : 1 au large de Fécamp/76 le 16 décembre (M. Lorthiois, R. Jamault).

Deux observations depuis des embarcations au large de la Seine-Maritime, un moyen de mieux détecter cette espèce sur nos côtes.

Alouette haussecol *Eremophila alpestris*



Polder nouveau conseil, le 29 décembre 2013 (H. Touzé)

1 le 31 octobre à la pointe d'Agon-Coutainville/50 (B. Lecaplain, N. Fillol). Jusqu'à 8 du 26 novembre au 8 mars 2014 à Cosqueville/50 (F. Dauguet *et al.*). Jusqu'à 20 à Courtils/50 du 29 novembre au 4 décembre (C. Gloria, S. Provost *et al.*), deuxième effectif record régional et 1 au devant du polder nouveau conseil/BMSM/35-50 du 12 décembre au 9 janvier 2014 au moins (S. Provost *et al.*). Soit un beau total annuel de 30 oiseaux, contre 1 seul en 2012 (et 6 en 2011).

Hirondelle rousseline *Hirundo daurica*



1 posée le 10 juin à la Poterie-Cap-d'Antifer (C. Lethuillier).

Belle découverte pour cet oiseau qui s'est prêté au jeu de la photo.
La dernière mention homologuée en Normandie datait de 1988 !

La Poterie-Cap-d'Antifer, le 10 juin 2013 (C. Lethuillier)

Pipit rousseline *Anthus campestris*

1 le 26 avril à Criquebeuf-sur-Seine/27 (M. Lorthiois). 6 en migration active entre le 21 et 23 août à Genêts/50 (S. Provost, C. Beaufiles). A Carolles, où l'espèce est annuelle et non soumise à homologation (sources GONm/migration.net), 8 en migration entre le 16 août et le 28 septembre (M. Beaufiles, S. Provost, D. Guillon *et al.*).

La mention printanière est à souligner, la période postnuptiale totalise 14 oiseaux (20 migrateurs en 2012).

Pipit de Richard *Anthus richardi*



Polder Frémont, le 2 janvier 2014 (Y. Blat)

8 en migration active à Carolles/50 entre le 27 septembre et le 8 octobre (S. Provost, M. Beaufiles, M. Carrasco). 1 sur l'herbu de Genêts le 29 décembre (JL. Reuzé). Jusqu'à 3 sur l'herbu du polder Frémont à l'ouest du Mont-Saint-Michel/35-50, du 27 décembre au 21 février (M. Beaufiles, E. Lhomer *et al.*).

Soit un total de 12 oiseaux notés en 2013, contre 11 en 2012. On remarquera le bel effectif migratoire Carollais sur une courte période (fin septembre – début octobre) et le nouvel hivernage de l'espèce en baie du Mont-Saint-Michel (4 oiseaux).

Phragmite aquatique *Acrocephalus paludicola*

Résultats du programme ACROLA du CRBPO/Museum d'Histoire Naturelle/Centre Régional de Baguage en Normandie.



37 capturés entre le 1^{er} et 23 août à Genêts/50 (J. Fournier, S. Provost, C. Beaufiles *et al.*). 3 capturés entre le 22 et 26 août à Saint-Côme-du-Mont/50 (B. Lecaplain). 1 capturé le 4 août à Colombières/14 (A. Chartier) et 2 sur le même site du 14 au 16 août (B. Lecaplain). 25 capturés du 4 au 27 août à Montmartin-en-Graignes/50 (A. Chartier, B. Scaar, C. Chartier, M. Dufour *et al.*) et 3 à Graignes/50 entre le 8 et 14 août (A. Chartier, M. Dufour, M. Muller). 9 capturés du 4 au 16 août sur l'herbu du Mont-Saint-Michel/50 (P. Provost, A. Hemon, S. Provost *et al.*). 1 capturé le 10 août à Saint-Arnoult/14 (B. Dumeige, E. Schmitt).

Montmartin-en-Graignes, le 13 août (A. Chartier)

Par ailleurs, 42 oiseaux ont été capturés au camp du Hode/76 dont 38 bagués (K. Sourdrille/RNN Estuaire de Seine, *com.pers.*).

2010 : 1 capturé le 17 août à Saint-Côme-du-Mont/50 (B. Lecaplain).



Soit un total de 123 oiseaux bagués en 2013, effectif légèrement en dessous de celui de 2012 (164) et 2011 (170) avec une pression de suivi comparable mais les résultats ont aussi été inférieurs dans d'autres régions.

Quelques sites des marais du Cotentin et du Bessin confirment leur importance pour l'espèce, au même titre que l'herbu de Genêts et l'estuaire de Seine.

Le Mont-Saint-Michel, août 2013 (P. Provost)

On notera les premiers essais de baguage concluants sur le vaste herbu du Mont-Saint-Michel/50 (à chiendent maritime, obione, aster...); dès lors, le potentiel en termes de halte migratoire dans ce type d'habitat est probablement nettement sous-évalué...

Rousserolle turdoïde *Acrocephalus arundinaceus*



2010 : 1 capturée le 21 août au Val-de-Reuil/27 (M. Lorthiois, V. Radola, AC. Klein).

Aucune donnée en 2013, après une année 2012 exceptionnelle pour cette espèce (7 oiseaux).

Val-de-Reuil, le 21 août 2010 (M. Lorthiois)

Hypolaïs icterine *Hippolais icterina*

2012 : 1 chanteur à Elbeuf-sur-Andelle/27 le 8 juin (B. Lang).

La description est ici basée sur le chant, l'oiseau ayant ensuite réagi à la repasse. Rappelons que pour cette espèce, il est également important de décrire le plus précisément possible le plumage, afin d'écartier un éventuel hypolaïs polyglotte ou une autre espèce au chant atypique.

L'est de la Normandie se situe non loin de la limite de répartition de cette hypolaïs. La dernière mention homologuée datait de 2003 (en Seine-Maritime).

Pouillot véloce sibérien *Phylloscopus collybita* « *tristis* »



1 le 13 décembre au Mont-Saint-Michel/50 (C. Morvan, E. Chauveau).

Soit une donnée, comme en 2012, pour un taxon plus difficile à détecter et peut-être plus rare que le pouillot à grands sourcils en Normandie...

Le Mont-Saint-Michel, le 13 décembre 2013 (C. Morvan)

Pour rappel, le CHR Normandie a décidé de maintenir sous l'appellation « pouillot véloce sibérien » tous les oiseaux présentant les caractéristiques de la sous-espèce *tristis* (plumage pâle, zone jaunâtre limitée aux rémiges secondaires, barre alaire pâle, parotiques roussâtres, sourcils marqué, parties nues bien noires), avec cri ou chant entendus, une bonne description et si possible des photos.

Pouillot à grands sourcils *Phylloscopus inornatus*



Chausey, le 30 septembre 2014 (S. Provost)

1 le 23 septembre à Carolles/50 (S. Provost). 1 le 4 octobre au port de Granville/50 (J. Alamargot). 1 du 17 au 20 octobre à Gatteville-le-Phare/50 (A. Verneau, L. Legrand, A. Guérard). Sur la Grande-île de Chausey/50, 5 le 30 septembre (S. Provost), 1 le 6 octobre (S. Provost, B. Lecaplain), 1 le 12 octobre (B. Lecaplain, S. Provost), 5 le 24 octobre (S. Provost, M. Sénéchal) et 1 le 30 octobre (S. Provost).

Nouvel effectif record pour la région avec 16 pouillots à grands sourcils (11 en 2012 et 10 en 2011), tous observés dans la Manche dont 13 à Chausey, une île particulièrement attractive pour ce pouillot... Précisons que des données automnales de Haute-Normandie ne nous sont pas encore parvenues.

Gobemouche nain ou de la taïga *Ficedula parva/albicilla*

1 le 13 octobre sur la Grande-île de Chausey (B. Lecaplain, S. Provost). L'oiseau a été soumis au CHR comme de type « *parva/albicilla* » en raison de l'observation brève mais, vu le statut du gobemouche de la Taïga en Europe d'Ouest (aucune mention confirmée en France), il s'agit plus probablement de *parva*. A noter que 2 gobemouches nains avaient été observés à Chausey en 2012.

Rémiz penduline *Remiz pendulinus*



Val-de-Reuil, décembre 2012 (C. Gérard)

1 le 10 novembre à Saint-Côme-du-Mont/50 (N. Fillool, J. Couhlon).

2011 : 2 du 2 décembre au 13 janvier 2012 au Val-de-Reuil/27 (C. Gérard, F. Bizon).

Pour rappel, depuis le 1^{er} janvier 2013, cette espèce reste uniquement soumise à homologation en Basse-Normandie (migrateur rare mais régulier en Haute-Normandie).

Pie-Grièche grise *Lanius excubitor*

1 le 18 février à Champsecret/61 en forêt d'Andaine (S. Lecocq). 1 le 19 février puis du 9 avril au 10 mai à la Belliere/61 (L. Doisy, W. Arial, M. Deflandre).

Ces deux observations ponctuelles confortent l'entrée de l'espèce sur la liste du CHR (depuis le 1^{er} janvier 2013) car cette pie-grièche est désormais une rareté régionale. On remarquera ici la simultanéité des dates en février et l'indice de nidification possible en avril.

Pie-Grièche à tête rousse *Lanius senator*



1 du 13 au 15 mai à Bouafles/27 (G. Corteel). 1 du 26 mai au 3 juin à Saint-Benoît-d'Hebertot/14 (E. Schmitt, W. Cherezy).

Comme en 2012, 2 oiseaux homologués en Normandie, un statut de rareté comparable à celui de la pie-grièche grise, dont l'aire de répartition est l'exact opposé de la « tête rousse » !

Bouafles, le 13 mai 2013 (G. Corteel)

Jaseur boréal *Bombycilla garrulus*



Le Havre, le 7 mars 2013
(Deschandol-Sabine, Copyright)

3 le 21 janvier près du pont de Beauvoir/50 (JB. Baglin). 8 du 21 février au 2 avril au Havre/76 (Y. Jacob *et al.*).

2012 : 16 en migration le 9 novembre à la Poterie-Cap-d'Antifer/76 (C. Lethuillier).

2008 : 1 le 18 décembre à Biville-sur-Mer/76 (V. Poirier).

Le jaseur continue à sourire aux observateurs régionaux ! On notera le long séjour des oiseaux havrais, ce qui aura permis à de nombreux observateurs de les admirer. Dans le précédent rapport, 2 oiseaux avaient été vus dans la Manche.

Bruant ortolan *Emberiza hortulana*

2 en migration active le 4 septembre à Carolles (S. Provost, M. Beaufils).

Soit 2 oiseaux détectés en 2013 en Normandie, comparé aux 5 de 2012.

Liste des données non homologuées :

Erismature rousse *Oxyura jamaicensis*

1 du 23 mars au 30 octobre 2011 à Val-de-Reuil/27. Malgré un long séjour, la description du bec n'exclut pas totalement une érismature à tête blanche (aucune photo reçue).

Marouette poussin *Porzana parva*

1 le 2 septembre à Canapville/14. Taille et longueur de la projection primaire non détaillées, pas d'éléments sur les sous-caudales et flancs et observation très furtive.

Glaréole sp *Glareola sp*

1 le 27 septembre à Regnéville-sur-Mer/50. Cette observation concerne probablement une glaréole mais plusieurs critères importants manquent à l'appel (croupion, forme des rectrices, coloration...), en raison de la brièveté de l'observation.

Goéland bourgmestre *Larus hyperboreus*

2011 : 1 le 23 octobre à Poses/27. Description incomplète ne permettant pas d'écarter un goéland leucique plus commun.

Goéland pontique *Larus cachinnans*

1 le 31 janvier à Val-de-Reuil/27. La description du bec et des ailes ne sont pas assez précises et n'excluent pas un goéland plus commun.

Pour cette espèce d'identification délicate, il faut être particulièrement rigoureux dans la description (si possible prendre des photos), afin d'exclure un éventuel hybride voire un goéland leucopnée ou argenté (notamment en fin d'hiver).

Remerciements : Les membres du CHR Normandie remercient vivement tous les ornithologues qui transmettent leurs fiches descriptives et photographies, permettant ainsi d'assurer une « traçabilité » des observations d'oiseaux rares en Normandie. Merci également au bureau du GONm de nous avoir accueilli au siège régional de Caen pour la réunion annuelle.

CHR Normandie

chr.normandie@gmail.com

**LISTE DES ESPECES SOUMISES A HOMOLOGATION EN NORMANDIE
GONm (septembre 2014)**



(en gras, les espèces à soumettre au CHN)

Plongeon à bec blanc	<i>Gavia adamsii</i>
Grèbe à bec bigarré	<i>Podylimbus podiceps</i>
Albatros à sourcils noirs	<i>Diomedea melanophris</i>
Océanite culblanc	<i>Oceanodroma leucorhoa</i>
Puffin majeur	<i>Puffinus gravis</i>
Puffin cendré	<i>Calonectris diomedea</i>
Cormoran pygmée	<i>Phalacrocorax pygmeus</i>
Pélican blanc	<i>Pelecanus onocrotalus</i>
Héron crabier	<i>Ardeola ralloides</i>
Blongios nain	<i>Ixobrychus minutes</i>
Spatule africaine	<i>Platalea alba</i>
Ibis falcinelle	<i>Plegadis falcinellus</i>
Flamant rose	<i>Phoenicopterus ruber</i>
Flamant du Chili	<i>Phoenicopterus chilensis</i>
Flamant nain	<i>Phoenicopterus minor</i>
Cygne chanteur	<i>Cygnus cygnus</i>
Cygne de Bewick	<i>Cygnus columbianus</i>
Oie à bec court	<i>Anser brachyrhynchus</i>
Oie naine	<i>Anser erythropus</i>
Oie des neiges	<i>Anser caerulescens</i>
Bernache à cou roux	<i>Branta ruficollis</i>
Bernache du pacifique	<i>Branta bernicla nigricans</i>
Canard noir	<i>Anas rubripes</i>
Canard à front blanc	<i>Anas americana</i>

Canard à faucilles	<i>Anas falcata</i>
Sarcelle à ailes bleues	<i>Anas discors</i>
Sarcelle à ailes vertes	<i>Anas carolinensis</i>
Sarcelle marbrée	<i>Marmaronetta angustirostris</i>
Fuligule nyroca	<i>Aythya nyroca</i>
Fuligule à bec cerclé	<i>Aythya collaris</i>
Eider à tête grise	<i>Somateria spectabilis</i>
Macreuse à bec jaune	<i>Melanitta americana</i>
Harelda boréale	<i>Clangula hyemalis</i>
Garrot d'islande	<i>Bucephala islandica</i>
Harle couronné	<i>Lophodytes cucullatus</i>
Erismature à tête blanche	<i>Oxyura leucocephala</i>
Erismature rousse	<i>Oxyura jamaicensis</i>
Vautour fauve	<i>Gyps fulvus</i>
Vautour moine	<i>Aegyptius monachus</i>
Aigle pomarin	<i>Aquila pomarina</i>
Aigle royal	<i>Aquila chrysaetos</i>
Aigle criard	<i>Aquila clanga</i>
Aigle botté	<i>Hieraaetus pennatus</i>
Buse pattue	<i>Buteo lagopus</i>
Buse féroce	<i>Buteo rufinus</i>
Pygargue à queue blanche	<i>Haliaeetus albicilla</i>
Elanion blanc	<i>Elanus caeruleus</i>
Busard pâle	<i>Circus macrourus</i>
Circaète jean-le-blanc	<i>Circaetus gallicus</i>
Faucon gerfaut	<i>Falco rusticolus</i>
Faucon sacre	<i>Falco cherrug</i>
Faucon lanier	<i>Falco biarmicus</i>
Faucon kobez	<i>Falco vespertinus</i>
Grue demoiselle	<i>Grus virgo</i>

Marouette de baillon	<i>Porzana pusilla</i>
Marouette poussin	<i>Porzana parva</i>
Talève sultane	<i>Porphyrio porphyrio</i>
Outarde canepetière	<i>Tetrax tetrax</i>
Grande outarde	<i>Otis tarda</i>
Vanneau sociable	<i>Vanellus gregarius</i>
Gravelot kildir	<i>Charadrius vociferous</i>
Pluvier guignard	<i>Charadrius morinellus</i>
Gravelot mongol	<i>Charadrius mongolus</i>
Bécassine double	<i>Gallinago media</i>
Chevalier stagnatile	<i>Tringa stagnatilis</i>
Chevalier criard	<i>Tringa melanoleuca</i>
Chevalier à pattes jaunes	<i>Tringa flavipes</i>
Chevalier Bargette	<i>Xenus cinereus</i>
Chevalier grivelé	<i>Actitis macularia</i>
Bécassin à long bec	<i>Limnodromus scolopaceus</i>
Bécasseau de Temminck	<i>Calidris temminckii</i>
Bécasseau de baird	<i>Calidris bairdii</i>
Bécasseau tacheté	<i>Calidris melanotos</i>
Bécasseau de Bonaparte	<i>Calidris fuscicollis</i>
Bécasseau rousset	<i>Tryngites subruficollis</i>
Bécasseau falcinelle	<i>Limicola falcinellus</i>
Phalarope à bec large	<i>Phalaropus fulicarius</i>
Phalarope à bec étroit	<i>Phalaropus lobatus</i>
Phalarope de Wilson	<i>Phalaropus tricolor</i>
Glaréole à collier	<i>Glareola pratincola</i>
Labbe à longue queue	<i>Stercorarius longicaudus</i>
Mouette blanche	<i>Pagophila eburnea</i>
Goéland pontique	<i>Larus cachinnans</i>
Goéland à ailes blanches	<i>Larus glaucooides</i>

Goéland bourgmestre	<i>Larus hyperboreus</i>
Goéland à bec cerclé	<i>Larus delawarensis</i>
Goéland d'Audouin	<i>Ichthyaetus audouinii</i>
Mouette atricille	<i>Larus atricilla</i>
Mouette de Franklin	<i>Larus pipixcan</i>
Guifette leucoptère	<i>Chlidonias leucopterus</i>
Guifette moustac	<i>Chlidonias hybridus</i>
Sterne hansel	<i>Sterna nilotica</i>
Sterne caspienne	<i>Sterna caspia</i>
Sterne de Dougall	<i>Sterna dougallii</i>
Sterne fuligineuse	<i>Sterna fuscata</i>
Sterne inca	<i>Larosterna inca</i>
Sterne voyageuse	<i>Sterna bengalensis</i>
Sterne de Forster	<i>Sterna forsteri</i>
Mergule nain	<i>Alle alle</i>
Guillemot à miroir	<i>Cephus grylle</i>
Macareux moine	<i>Fratercula arctica</i>
Coucou-geai	<i>Clamator glandarius</i>
Coulicou à bec jaune	<i>Coccyzus americanus</i>
Harfang des neiges	<i>Nyctea scandiaca</i>
Hibou petit-duc	<i>Otus scops</i>
Martinet à ventre blanc	<i>Apus melba</i>
Guêpier d'Europe	<i>Merops apiaster</i>
Rollier d'Europe	<i>Coracias garrulus</i>
Alouette calandrelle	<i>Calandrella brachydactyla</i>
Alouette haussecol	<i>Eremophila alpestris</i>
Hirondelle de rochers	<i>Hirundo rupestris</i>
Hirondelle rousseline	<i>Hirundo daurica</i>
Pipit de richard	<i>Anthus richardi</i> (3)
Pipit de Godlewski	<i>Anthus godlewskii</i>

Pipit rousseline	<i>Anthus campestris</i> (1)
Pipit à gorge rousse	<i>Anthus cervinus</i>
Pipit à dos olive	<i>Anthus hodgsoni</i>
Bergeronnette citrine	<i>Motacilla citreola</i>
Bergeronnette printanière d'Italie	<i>Motacilla flava cinereocapilla</i>
Bergeronnette printanière nordique	<i>Motacilla flava thunbergi</i>
Pie-grièche grise	<i>Lanius excubitor</i>
Pie-grièche à tête rousse	<i>Lanius senator</i>
Pie-grièche à poitrine rose	<i>Lanius minor</i>
Jaseur boréal	<i>Bombycilla garrulus</i>
Cingle plongeur	<i>Cinclus cinclus</i>
Accenteur alpin	<i>Prunella collaris</i>
Robin à flancs roux	<i>Tarsiger cyanurus</i>
Tarier oriental	<i>Saxicola torquatus maurus</i>
Traquet oreillard	<i>Oenanthe hispanica</i>
Traquet du désert	<i>Oenanthe deserti</i>
Merle de roche	<i>Monticola saxatilis</i>
Grive dorée	<i>Zoothera dauma</i>
Phragmite aquatique	<i>Acrocephalus paludicola</i>
Rousserolle des buissons	<i>Acrocephalus dumetorum</i>
Rousserolle isabelle	<i>Acrocephalus agricola</i>
Rousserolle turdoïde	<i>Acrocephalus arundinaceus</i>
Hypolaïs ictérine	<i>Hippolais icterina</i>
Fauvette épervière	<i>Sylvia nisoria</i>
Fauvette passerinette	<i>Sylvia cantillans</i>
Fauvette mélanocéphale	<i>Sylvia melanocephala</i>
Pouillot ibérique	<i>Phylloscopus ibericus</i>
Pouillot à grands sourcils	<i>Phylloscopus inornatus</i>
Pouillot de pallas	<i>Phylloscopus proregulus</i>
Pouillot brun	<i>Phylloscopus fuscatus</i>

Pouillot de Hume	<i>Phylloscopus humei</i>
Pouillot de Bonelli	<i>Phylloscopus bonelli</i>
Pouillot véloce sibérien	<i>Phylloscopus collybita tristis</i>
Gobemouche à collier	<i>Ficedula albicollis</i>
Gobemouche nain	<i>Ficedula parva</i>
Rémiz penduline	<i>Remiz pendulinus</i> (2)
Tichodrome échelette	<i>Tichodroma muraria</i>
Bruant ortolan	<i>Emberiza hortulana</i> (3)
Bruant fou	<i>Emberiza cia</i>
Bruant mélanocéphale	<i>Emberiza melanocephala</i>
Bruant nain	<i>Emberiza pusilla</i>
Bruant à calotte blanche	<i>Emberiza leucocephalos</i>
Bruant à couronne blanche	<i>Zonotrichia leucophrys</i>
Linotte à bec jaune	<i>Carduelis flavirostris</i>
Roselin cramoyi	<i>Carpodacus erythrinus</i>
Roselin githagine	<i>Rhodopechys githaginea</i>
Sizerin blanchâtre	<i>Carduelis hornemanni</i>
Moineau espagnol	<i>Passer hispaniolensis</i>
Etourneau roselin	<i>Sturnus roseus</i>
Etourneau unicolore	<i>Sturnus unicolor</i>
Cassenoix moucheté	<i>Nucifraga caryocatactes</i>
Crave à bec rouge	<i>Pyrrhonorax pyrrhonorax</i>
Corneille mantelée	<i>Corvus cornix</i>

Et toutes autres espèces plus rares ne figurant pas encore sur la liste des oiseaux de Normandie.

(1) sauf pour les falaises de Carolles et le cap de la Hève.

(2) sauf la Haute-Normandie depuis le 1er janvier 2013

(3) une fiche globale saisonnière pour les sites de Carolles et du cap de la Hève

Comité d'Homologation Régional

Fiche descriptive pour l'observation d'une espèce occasionnelle en Normandie

à retourner à : Maison de l'Oiseau Migrateur, 33 bis rue de la poste 50740 Carolles

chr.normandie@gmail.com

Espèce proposée

Nom français :

Nom scientifique :

Nombre d'oiseaux :

Sexe :

Age :

Date(s) d'observation(s) :

Durée des observations :

Localité (Commune / Lieu-dit / département) :

Rédacteur de la fiche (Nom / adresse postale / courriel) :

Autres observateurs :

Qui l'a trouvé :

Qui l'a identifié :

Distance d'observation :

Matériel optique utilisé :

L'oiseau a-t-il été photographié :

Par qui :

L'oiseau a-t-il été capturé :

Par qui :

L'oiseau a-t-il été conservé :

Où :

Conditions météorologiques :

Connaissances antérieures de l'espèce :

Connaissances d'espèces voisines :

Description de l'observation et de l'oiseau (avant recours aux guides d'identification) :

indiquer les conditions dans lesquelles l'oiseau a été observé, puis établir une description détaillée de celui-ci (silhouette, coloration du plumage partie par partie, comportement, voix...).

Joindre éventuellement une copie des notes prises sur le terrain, ainsi que tout document graphique (dessin, photo...) ou sonore.

Bibliographie :

www.chn-france.org

Provost S. & le CHR Normandie (2013). Les oiseaux rares en Normandie en 2012 (19^{ème} circulaire).
Rapport du Comité d'Homologation Régional.