



Les oiseaux rares en Normandie en 2016

Rapport du Comité d'Homologation Régional

Alexandre CORBEAU, Benoît LECAPLAIN & le CHR Normandie
(Janvier 2018)

Le CHR rappelle que son objectif est d'authentifier et de publier les observations d'oiseaux rares à l'échelle régionale, sur la base de descriptions (et/ou photos). Réuni le 22 septembre 2017 à Caen (14), le **CHR Normandie** a terminé l'examen de la 23e circulaire, couvrant pour l'essentiel l'année 2016. Le nombre de fiches reçues est de 159 pour 59 espèces différentes, une nouvelle année record après 2014 (145 fiches).

D'autres observations régionales ne font pas l'objet de fiche CHR, des erreurs d'identification ne sont pas exclues dans certains cas.

La dernière réunion s'est déroulée en présence des membres suivants : Alexandre Corbeau (co-secrétaire), Yvon Créau (vérificateur auprès du GONm), Jocelyn Desmares, Benoît Lecaplain (co-secrétaire), Matthieu Lorthiois, Jean-Pierre Marie, Sébastien Provost, Gunter de Smet. David Vigour n'a pas pu être présent.

Sébastien a maintenant quitté le secrétariat du CHR (tout en restant membre), nous le remercions vivement pour son travail effectué depuis de nombreuses années.

La liste des espèces à soumettre à homologation au CHR Normandie a entièrement été révisée. Basée sur la « Liste officielle des Oiseaux de France », édition 2016 (catégories A, B et C) de la Commission de l'Avifaune Française (CAF), elle intègre maintenant les noms des descripteurs, les nouvelles avancées phylogénétiques tout en conservant les anciens noms pour information.

Cette nouvelle liste des espèces CHR et la fiche type à remplir sont à retrouver en fin de ce document et avec les rapports annuels, téléchargeables sur le lien (<http://www.gonm.org/index.php?post/CHR-%28Comit%C3%A9-d-Homologation-R%C3%A9gional%29>) ou sur demande au secrétariat du CHR : chr.normandie@gmail.fr


Les notes du CHR (cf. notes dans la liste des espèces soumises à homologation) :

- Le pipit rousseline ne nécessite pas de fiche sur les sites de migration des Falaises de Carolles et du Cap de la Hève.
- La rémiz penduline ne nécessite pas de fiche dans le département de la Seine-Martine (76) et de l'Eure (27) depuis le 1^{er} janvier 2013.
- Le pipit de Richard et le bruant ortolan font l'objet d'une fiche globale pour la saison de migration sur les sites des Falaises de Carolles et du Cap de la Hève.
- L'observation du phragmite aquatique nécessite une fiche pour les données uniquement hors capture/bague.
- L'homologation du pouillot de Sibérie requière obligatoirement un enregistrement de cris ou de chant.
- Le sizerin flammé (boréal) - *Acanthis flammea* fait son entrée dans la liste CHR (depuis 2016). Ayant récemment été séparé du sizerin cabaret - *Acanthis cabaret* (observé classiquement dans notre région) par la CAF, il faut penser à différencier ces deux espèces sur le terrain.

Enfin, nous rappelons que dans les fiches transmises, il faut nécessairement une description, même succincte, qui permet d'éliminer les autres espèces similaires à celle décrite et que les espèces suivantes sont parfois « oubliées » par les observateurs dans la rédaction des fiches : cygne chanteur, bernache du Pacifique, macareux moine, phalarope à bec large...

Merci d'y penser !

Grâce à l'outil Clicnat – Faune-Normandie (<http://www.faune-normandie.org/>), la rédaction d'une fiche est plus facile et plus directe. Pour l'année 2016, ce sont 152 observations qui ont été saisies sur Faune Normandie. Un même oiseau peut avoir été noté plusieurs fois. La carte suivante montre la localisation de ces données (carte issue de Faune-Normandie).



Liste des espèces homologuées lors de l'année 2016

1. Cygne chanteur - *Cygnus cygnus* (Linnaeus, 1758)



3 adultes le 19 novembre à Réthoville/50 (G. & J. Dumont) ; 1 adulte du 25 au 27 décembre à Casqueville/50 (A. Verneau) ; 4 le 6 décembre 2016 et possiblement un autre groupe de 5 le 16 janvier 2017 à Saint Vigor d'Ymonville/76 (G. de Smet)

Effectif stable avec 7 oiseaux en 2015 et une nouvelle fois un groupe de 5 à Saint Vigor d'Ymonville.

Alain Verneau

2. Bernache cravant du Pacifique - *Branta bernicla nigricans* (Lawrence, 1846)



A Saint Vaast la Hougue/50 : 2 le 11 novembre (S. Crestey) puis 1 adulte le 19 novembre (G. & J. Dumont)

3 individus en 2016, espèces annuelles depuis 2008 (5 en 2015).

Joël Dumont

3. Fuligule à bec cerclé - *Aythya collaris* (Donovan, 1809)



1 mâle adulte le 7 octobre à Val de Reuil/27 (D. Basley)

Espèce occasionnelle en Normandie, la dernière donnée remonte à 2008.

Daniel Basley

4. Fuligule nyroca - *Aythya nyroca* (Güldenstädt, 1770)



1 femelle du 12 au 26 février à Pont l'Evêque/14 (T. Le Huu Nghia)

Une nouvelle donnée en 2016 de ce rare fuligule après le couple observé en 2015 (obs précédente en 2010).

Tony Le Huu Nghia

5. Harelde boréale - *Clangula hyemalis* (Linnaeus, 1758)



Martin Billard

3 mâles (2 adultes et 1 première année) et 3 femelles (1 adulte et 2 de première année) le 8 novembre à Gatteville le Phare/50 (K. Schmale) ; 1 le 29 novembre à Merville Franceville Plage/14 (M. Billard & JP. Marie) ; 1 femelle le 30 novembre au large de Villerville/14 (G. de Smet) ; 1 femelle le 6 décembre à Saint Marcouf/50 (J. Bozec *et al.*) ; 1 femelle le 7 décembre à Pont l'Evêque/14 (Y. Carasco) ; 1 mâle et 2 femelles le 21 décembre à Merville Franceville Plage/14 (JP. Marie & M. Billard) ; 4 le 28 décembre à Villerville/14 (T. Le Huu Nghia)
Année record en 2016 avec 17 individus (1 en 2015).

6. Erismature rousse - *Oxyura jamaicensis* (J.F. Gmelin, 1789)



Daniel Basley

1 mâle le 8 août à l'étang de Vie (Saint-Patrice du Désert/61) (JP. Louvet) ; 4 (1 femelle et 3 poussins) le 10 juillet sur les étangs des Noës (Saint-Patrice du Désert/61) (S. Lecocq) ; à Val de Reuil/27 : 1 puis 2 le 12 octobre (D. Basley puis C. Gérard), 1 le 22 novembre (D. Basley) ; 1 le 29 novembre à Oudalle/76 (G de Smet)
Effectif record en 2016 avec 9 individus (1 en 2015) et la preuve d'une reproduction dans la région.

7. Océanite culblanc - *Oceanodroma leucorhoa* (Vieillot, 1818)

1 individu le 20 octobre au seawatch à Gatteville le Phare/50 (A. Guérard)
Océanite toujours rare et non annuel (aucun en 2015 et 1 en 2014).

8. Blongios nain - *Ixobrychus minutus* (Linnaeus, 1766)

Après un couple nicheur observé en 2014 et aucun individu en 2015, 2 mâles ont été observés en 2016 : 1 le 11 mai à Gorges/50 (B Chevalier) et 1 le 27 mai à Val de Reuil/27 (C. Gérard)

9. Crabier chevelu - *Ardeola ralloides* (Scopoli, 1769)



Xavier Vergon

1 individu le 10 juin à Sandouville /76 (G de Smet), possiblement un des 5 individus observés le 27 juillet à Oudalle/76 (Xavier Vergon via Y. Jacob)

Seulement 2 données dans la base du CHR (2007 & 2011) avant cette année exceptionnelle avec 5-6 individus.

10. Ibis falcinelle - *Plegadis falcinellus* (Linnaeus, 1766)

2 adulte le 21 mars à Saint Jean de Daye/50 (A Chartier) ; 1 individu de deuxième année le 27 avril à La Cerlangue/76 (G. de Smet)
Espèce régulière et annuelle depuis 2011 (3 en 2015, 5 en 2014).

11. Flamant rose - *Phoenicopterus roseus* Pallas, 1811



1 individu le 25 juillet à Gonfreville l'Orcher (A Cannu via P. Fichaux et F. Simon) ; 1 première année le 26 juillet à Sandouville/76 (G. de Smet)

2 individus en 2016 de cette espèce rare en Normandie, la dernière donnée remonte à 2001.

Pierre Fichaux

12. Elanion blanc - *Elanus caeruleus* (Desfontaines, 1789)



1 adulte le 12 janvier à Vesly/27 (J. Desmares) ; 1 le 1^{er} juillet à Besneville/50 (G. Debout via S. Provost) ; 1 le 14 juillet à Emanvielle/27 (P. Cheveau) ; 1 le 29 juillet à Moitiers d'Allonne/50 (L. Blanc) ; 1 le 5 août à Biéville Quetiéville (L. Wieckiewicz via D. Vigour) ; 1 le 23 décembre à Eu/27 (V. Poirier)

Année record avec 6 individus en 2016 pour ce rapace en progression (2 en 2015 & 2 en 2014).

Pierre Cheveau

13. Pygargue à queue blanche - *Haliaeetus albicilla* (Linnaeus, 1758)



1 individu de premier hiver observé en baie du Mont-Saint-Michel côté 50 (Vains et Genêts) du 6 au 28 janvier (S. Provost, P. Desgué, *et al.*) puis 1 le 3 mars, possiblement le même, individu observé à Marcey les Grèves/50 (S. Provost)

Après un individu retrouvé mort en 2015 (données précédentes de 2001), il y a eu 2 observations de cette espèce en 2016.

Sébastien Provost

14. Vautour fauve - *Gyps fulvus* (Habliz, 1783)



Pascal Bernardin

1 individu observé à travers la Manche/50 (Jobourg, Omonville, Vauville) du 5 au 11 juillet (P. Boullenger, O. Aubrais, P. Bernardin, C. Laget via A. Barrier).

Oiseau bagué à Peralejo (Espagne), passe par Troyes et les Pays-Bas avant d'arriver en Normandie

L'observation de ce rapace devient régulière en Normandie lors de ses dispersions post-juvéniles, après des gros groupes les années précédentes (12 en 2015 et 27 en 2014), 1 oiseau espagnol a été observé en 2016.

15. Circaète Jean-le-Blanc - *Circaetus gallicus* (J.F. Gmelin, 1788)



1 immature le 27 juillet à Saint Vigor d'Ymonville/76 (P. Fichaux)

Observation quasi annuelle d'un ou deux individus de ce rapace depuis 2009.

Pierre Fichaux

16. Busard pâle - *Circus macrourus* (S.G. Gmelin, 1770)



1 femelle le 4 mars à Haussez (via J. Jean-Baptiste) : suivis satellite depuis la Finlande jusqu'au Sénégal ; 1 première année en migration à Carolles/50 (A. Corbeau, S. Provost & JR Jacquemot)

Les 2 individus observés en 2016 égalent le record de 2010 (1 en 2014 et 1 en 2015).

Alexandre Corbeau

17. Buse pattue - *Buteo lagopus* (Pontoppidan, 1763)

1 mâle le 3 décembre à Coudehard/61 (J. Jean-Baptiste)

Observation maintenant quasi annuelle de ce rapace qui est récemment sorti de la liste CHN.

18. Guignard d'Eurasie - *Charadrius morinellus* Linnaeus, 1758



1 première année le 2 septembre à Réthoville/50 (A. Verneau *et al.*) ; 2 juvéniles le 11 septembre à Courtils/50 (T. Grandguillot & D. Guillon)

Année classique avec 3 individus (4 en 2015, 2 en 2014 et 10 en 2013).

Alain Verneau

19. Bécasseau de Temminck - *Calidris temminckii* (Leisler, 1812)



1 le 5 mai à Billy/14 (F. Leclerc) ; un groupe de 6 le 9 et 10 mai à Huisnes sur mer/50 (S. Provost) ; 1 le 16 août à la station de lagunage de Bréhal/50 (B. Chevalier)

Annuel depuis 2006 ce rare bécasseau peut parfois former de petit groupe (6 en 2016 ; 10 en 2008 et 7 en 2000).

Sébastien Provost

20. Phalarope à bec large - *Phalaropus fulicarius* (Linnaeus, 1758)



1 le 20 octobre et 1 le 21 octobre en migration à Gatteville-le-Phare/ 50 (A. Guérard). 1 le 5 novembre au seawatch à Merville-Franceville-Plage/14 (JP. Marie).

Année assez classique avec 3 migrateurs observés (4 en 2015).

William Duvernoy

21. Labbe à longue queue - *Stercorarius longicaudus* Vieillot, 1819

Un adulte est noté le 28 juillet à Cricqueville-en-Bessin/14 (G. Vimard), 1 posé dans une prairie dans le marais de Réthoville/50 le 5 septembre (A. Verneau), 1 le 18 septembre à Gatteville-le-Phare/50 (A. Verneau, V. Verneau & S. Crestey) et 1 le 2 octobre à Colleville-Montgomery/14 (JP. Marie).

Après une année 2015 sans observation, 4 individus ont été observés en 2016 pour ce labbe de plus en plus observé en séance de seawatch.

22. Macareux moine - *Fratercula arctica* (Linnaeus, 1758)



Delphine Esterlingot

15 oiseaux observés en 2016 dont 13 à Gatteville-le-Phare/50 : 5 le 20 octobre et 4 le 21 octobre (A. Guérard), 3 oiseaux le 8 novembre (K. Schmale & JF. Blanc) et 1 le 13 novembre (S. Crestey). 2 inds. ont été trouvés morts : 1 à Baubigny/50 le 21 janvier (B. Lemerancier & J. Jean-Baptiste) et 1 à Urville-Nacqueville/50 le 6 juillet (D. Esterlingot).

Effectif record cette année pour ce petit alcidé observé tous les ans depuis 2006 (2 en 2015, 1 en 2014).

23. Mergule nain - *Alle alle* (Linnaeus, 1758)

3 oiseaux observés lors de séances de seawatch : 1 le 21 janvier à Criqueville-en-Bessin/14 (JP. Moulin) et 2 le 8 novembre à Gatteville-le-Phare/50 (A. Verneau, JF. Blanc, K Schmale & F. Malvaud).

Année moyenne pour cette espèce après des années records (24 individus en 2015 et 14 en 2007) et des années sans données (2013, 2011, 2010).

24. Sterne caspienne- *Hydroprogne caspia* (Pallas, 1770)

1 adulte le 15 septembre à Oudalle/76 (G. de Smet). L'espèce est annuelle mais rare (1 en 2015, 2 en 2014).

25. Guifette moustac - *Chlidonias hybrida* (Pallas, 1811)

1 adulte le 13 avril à Huisne-sur-Mer/50 (S. Provost). 3 du 28 avril au 11 mai à Gorges/50 (B. Chevallier) et 6 adultes au lac des Deux-Amants à Poses/27 le 16 mai (D. Basley). Année classique pour cette espèce (7 en 2015, 9 en 2014).

26. Goéland pontique - *Larus cachinnans* Pallas, 1811

Année record en 2016 avec 32 individus (17 en 2015).

Un oiseau bagué de premier hiver observé le 7 décembre 2015 à Courseulles-sur-Mer/14 (JP. Marie, F. Leclerc) a été revu les 17 et 26 décembre et le 4 janvier 2016 (JP. Marie). 1 ind. de 2^{ème} année le 24 janvier à Merville-Franceville-Plage/14 (JP. Marie). 1 oiseau bagué immature le 9 juin 2015 à Redderne en Allemagne et observé à Billy/14 le 27 février (F. Leclerc). 8 oiseaux en février : 2 inds. de 2^{ème} année et 1 ind. de 3^{ème} année à Saint-Aubin-sur-Mer/76 le 21 mars (Y. Carasco), 2 inds. de 2^{ème} année à Quiberville/76 le 21 mars, 2 inds. de 2^{ème} année le 23 mars et 1 ind. de 2^{ème} année le 30 mars pour cette même localité (Y. Carasco). 1 ind. de 1^{er} été le 19 août à Merville-Franceville-Plage/14 (T. Le Huu Nghia). 1 ind. de 4^{ème} année le 24 septembre à Blonville-sur-Mer/14 (T. Le Huu Nghia).

10 oiseaux ont été observés par Yann Carasco à Quiberville/76 à partir de septembre 2016 : 1 immature le 30 septembre, revu ensuite le 14 octobre ; 1 immature le 28 octobre ; 1 immature, 2 inds. de 2^{ème} année et 1 ind. de 3^{ème} année le 26 novembre ; 1 subadulte, 2 immatures et 1 ind. de 2^{ème} année le 11 décembre. 2 oiseaux à Saint-Aubin-sur-Mer/76 : 1 adulte le 30 septembre et 1 immature le 26 novembre (Y. Carasco). 1 ind. de 2^{ème} année le 23

octobre (T. Le-Huu-Nghia) et 1 immature du 6 au 19 novembre (JP. Marie) à Dives-sur-Mer/14. 1 immature et 1 ind. de 2^{ème} année le 5 novembre à Merville-Franceville-Plage/14 (J. Girard & T. Le-Huu-Nghia). 1 subadulte bagué en Pologne et observé à la prairie de Caen le 4 décembre (F. Leclerc). 1 adulte le 11 décembre à Ommay/61 (J. Jean-Baptiste).

A nouveau, les observations sont concentrées sur le Calvados (11 oiseaux) et la Seine-Maritime (20 oiseaux).

Tony Le Huu Nghia



27. Goéland à ailes blanches - *Larus glaucoides* Meyer, 1822

Deux observations en 2016. 1 à Cuves/50 le 5 février (S. Provost) et 1 à Rouen du 2 au 30 avril (J. Yvon & C. Goujon). Aucune donnée entre 1997 et 2012. 5 inds. en 2012, 1 en 2014 et 1 en 2015.

28. Goéland bourgmestre - *Larus hyperboreus* Gunnerus, 1767



Quatre oiseaux en 2016 (aucun en 2015). 1 subadulte à Vauville/50 le 17 février (ML. Travert). 1 ind. de 2^{ème} année à Billy/14 du 25 janvier au 12 mars (F. Leclerc & JP. Marie), un autre oiseau sur le même site le 13 février (F. Leclerc). Enfin, un oiseau de 2^{ème} année est découvert le 6 février par Jean Barbe à Port-en-Bessin-Huppain/14. Il sera observé régulièrement jusqu'au 11 septembre. L'oiseau fréquentait le port de pêche et avait ses habitudes sur un des quais au retour des bateaux.

Marie-Léa Travert

29. Petit-duc scops - *Otus scops* (Linnaeus, 1758)

Un chanteur le 1er mai dans la forêt de Belbeuf/76 (J. Wikramaratna).

Il ne s'agit que de la 3^{ème} donnée contemporaine normande après l'oiseau d'Avranches/50 en 2011 et l'individu capturé à Tancarville/76 en 2014.

30. Faucon kobez - *Falco vespertinus* Linnaeus, 1766

1 femelle observée du 9 au 12 mai à Gorges/50 et Auvers/50 (S. Lecocq, A. Chartier *et al.*) ; 1 femelle de deuxième année le 16 mai à Camembert/61 (J. Jean-Baptiste). L'espèce est annuelle depuis 2012 mais reste très rare.

31. Pie-grièche grise - *Lanius excubitor* Linnaeus, 1758

1 le 18 février et le 16 octobre au Gast/14 (L. Sineux). 1 le 23 mars à Radon/61 (P. Fichaux). 1 le 10 décembre à Paluel/76 (G. de Smet *et al.*). Dates et lieux classiques pour cette espèce peu commune.

32. Pie-grièche à tête rousse - *Lanius senator* Linnaeus, 1758

2 oiseaux en mai : 1 le 5 mai à Argouges/50 (P. Feather) et 1 le 16 mai à Auvilliers/76 (T. Domalain). Aucune donnée en 2015.

33. Alouette haussecol - *Eremophila alpestris* (Linnaeus, 1758)



1 mâle adulte du 14 au 17 février à Merville-Franceville-Plage/14 (JP. Marie). 3 oiseaux le 13 novembre à Saint-Vaast-la-Hougue/50 (S. Crestey). 2 oiseaux à Merville-Franceville-Plage/14 le 31 décembre 2016 (T. Le Huu-Nghia). Ces oiseaux seront régulièrement observés jusqu'en avril 2017.

Enfin, un groupe important (9-10) était présent à Cosqueville/50 entre le 19 octobre 2016 et avril 2017. 2 oiseaux ont d'abord été découverts le 19 octobre (G. Dumont) puis 9 à partir du 20 octobre (A. Verneau, M. Billard *et al.*).

16 oiseaux en 2016 contre un seul en 2015.

Tony Le Huu-Nghia

34. Pouillot à grands sourcils - *Phylloscopus inornatus* (Blyth, 1842)

6 oiseaux début octobre au cap de la Hève à Sainte-Adresse/76 : 1 le 4, 2 le 6, 1 le 7, 1 le 10 et 1 le 11 octobre (G. de Smet & M. Simon). 3 oiseaux aux falaises de Carolles/50 : 1 le 12 et 1 le 30 octobre, 1 le 4 novembre (S. Provost, JR. Jacquemot, A. Trémion & P. Gachet). 3 oiseaux à Chausey : 1 les 13 et 14 octobre (C. Girard), 1 le 24 et 1 le 27 octobre (S. Provost). 1 oiseau capturé le 4 octobre à Sandouville/76 (Y. Jacob). 1 le 14 octobre à Gatteville-le-Phare/50 (A. Guérard). 1 le 27 octobre à Bricquebec/50 (Y. Carasco). Une prospection attentive sur le littoral permet de détecter cette espèce rare mais régulière en Normandie.

Deuxième meilleure année en 2016 avec 15 oiseaux (19 en 2013).

35. Pouillot ibérique - *Phylloscopus ibericus* Ticehurst, 1937

1 mâle chanteur du 22 avril au 23 août à Cerisy-la-Forêt/50 (P. Gachet). 6^{ème} mention régionale.

36. Phragmite aquatique - *Acrocephalus paludicola* (Vieillot, 1817)

Résultats du programme ACROLA du CRBPO/Museum d'Histoire Naturelle/Centre Régional de Baguage en Normandie. Synthèse des données : Faustine Simon (Réserve naturelle de l'estuaire de la Seine)

Total annuel de 69 phragmites aquatiques capturés en Normandie, il s'agit d'un effectif très faible (206 en 2015). 55 oiseaux capturés en estuaire de la Seine/76 au mois d'août (Y. Jacob, G. Le Guillou *et al.*). Un oiseau dans les marais de la Touques à Saint-Arnoult-le-Marais/14 (B. Dumeige), 9 inds. dans la Réserve naturel régionale des Marais de la Taute/50 (A. Chartier, B. Scaar, P. Ollivier *et al.*) et 4 inds. à la roselière de Genêts (S. Provost, M. Chevalier *et al.*).

37. Rousserolle turdoïde - *Acrocephalus arundinaceus* (Linnaeus, 1758)



1 juvénile à Ver-sur-Mer/14 le 17 août (W. Duvernoy *fade* JP. Marie).

Les observations et les photos sont exceptionnelles chez cette espèce en Normandie.

William Duvernoy

38. Jaseur boréal - *Bombcilla garrulus* (Linnaeus, 1758)

1 le 11 novembre à Colleville-Montgomery/14 (JP. Marie), un groupe de 13 le 20 novembre à Saint-Ouen-du-Mesnil-Oger/76 (G. de Smet) et 1 le 25 novembre au cap de la Hève à Sainte-Adresse/76 (G. de Smet). Plusieurs oiseaux ont été suspectés mais un seul a été observé.

Après deux années d'absence, 15 oiseaux ont été observés en 2016.

39. Accenteur alpin - *Prunella collaris* (Scopoli, 1769)

Incroyable rencontre avec cette espèce montagnarde le 6 mai sur les falaises d'Etretat/76 (C. Lethuillier). L'espèce est rarissime en Normandie. Il existe quelques observations signalées par Henri Gadeau de Kerville (1890) avant les années 1850.

40. Bergeronnette printanière nordique - *Motacilla flava thunbergi* Billberg, 1828

Surprenante observation de 4 oiseaux à Sées/61 le 14 septembre (P. Fichaux) ! 3 oiseaux en 2015.

41. Pipit de Richard - *Anthus richardi* Vieillot, 1818

1 oiseau hivernant à Cricqueville-en-Bessin/14, observé le 17 janvier (JP. Marie & J. Girard) puis le 13 mars (J. Girard).
4 oiseaux en migration : 2 oiseaux à Carolles/50 les 29 et 30 octobre (S. Provost) et 2 inds. à Sainte-Adresse/76 les 22 et 25 novembre (G. de Smet).

5 oiseaux en 2016, comme en 2015 (7 en 2014). L'hivernage est de plus en plus régulier.

42. Pipit rousseline - *Anthus campestris* (Linnaeus, 1758)

1 oiseau observé le 14 septembre à Huisne-sur-Mer/50 (S. Provost).

Seule mention régionale en 2016 en dehors du site de migration de Carolles/50 où 14 oiseaux ont été notés en migration active (S. Provost) mais aucun au cap de la Hève/76. 4 oiseaux avaient été notés en Normandie en 2015.

43. Pipit à gorge rousse - *Anthus cervinus* (Pallas, 1811)



2 observations au printemps : 1 le 20 avril à Penly/76 (G. de Smet) et 1 le 13 mai à Huisne-sur-Mer/50 (C. Gloria). 1 seul oiseau en 2015.

Christian Gloria

44. Bruant ortolan - *Emberiza hortulana* Linnaeus, 1758

4 oiseaux en 2016 (aucun en 2015), et uniquement dans la région de la Baie du Mont-Saint-Michel : 2 inds. le 24 août au Grouin du Sud à Vains/50 (S. Provost), 1 à Carolles/50 le 13 septembre (S. Provost & JR. Jacquemot) et 1 à Chausey/50 le 22 septembre (S. Provost & JR. Jacquemot).

Fiches non homologuées : principalement dû à des descriptions trop courtes (même après rappel) qui n'ont pas permis d'exclure des espèces voisines ou des erreurs d'identification ou bien à cause d'absence de critères fondamentaux ou d'enregistrement de cris/chant dans le cas du pouillot de Sibérie.

1. **Cygne chanteur** - *Cygnus cygnus* (Linnaeus, 1758)
2 oiseaux à Vains/50 en décembre. Description trop succincte.
2. **Bernache cravant du Pacifique** - *Branta bernicla nigricans* (Lawrence, 1846)
1 en mars à Grand-camp-Maisy/14. Il n'y a pas eu de description pour cet oiseau.
3. **Erismature rousse** - *Oxyura jamaicensis* (J.F. Gmelin, 1789)
1 le 27 novembre au Val-de-Reuil/27. Description trop succincte.
4. **Sterne de Dougall** - *Sterne dougallii* Montagu, 1813
2 oiseaux le 31 juillet à Chausey. Il n'y a pas eu de description pour ces oiseaux.
5. **Goéland pontique** - *Larus cachinnans* Pallas, 1811
1 le 20 avril à Port-en-Bessin-Huppain/14, l'absence de description ne nous a pas permis de valider l'observation de ce goéland délicat à identifier.
6. **Pouillot à grands sourcils** - *Phylloscopus inornatus* (Blyth, 1842)
1 le 6 octobre à Tréauville/76. Description trop succincte.
7. **Pouillot de Sibérie** - *Phylloscopus collybita tristis* Blyth, 1843
1 le 15 janvier à Boos/76. L'absence d'enregistrement ne permet pas de confirmer avec certitude l'identification.
8. **Pouillot ibérique** - *Phylloscopus ibericus* Ticehurst, 1937
1 le 21 avril à Argentan/61. Il n'y a pas eu de description ni d'enregistrement pour cet oiseau.
9. **Lusciniolle à moustache** - *Acrocephalus melanopogon* (Temminck, 1823)
1 le 5 mai à Sainte-Marie-du-Mont/50. La description est trop succincte pour exclure un phragmite des joncs et valider l'observation de cet oiseau non encore observé en Normandie.
10. **Traquet oreillard** - *Oenanthe hispanica* (Linnaeus, 1758)
1 mâle le 23 mai à Biville/50. Les photos montrent un traquet motteux.

Espèces occasionnelles signalées en Normandie en 2016, en cours d'examen au CHN (Reeber et le CHN, à paraître) :

1. **Oie à bec court** - *Anser brachyrhynchus* Baillon, 1833 : 2 le 26 novembre à Merville Franceville Plage/14
2. **Bernache à cou roux** - *Branta ruficollis* (Pallas, 1769) : 1 du 21 mars au 4 avril à Querqueville/50
3. **Canard à front blanc** - *Anas americana* J.F. Gmelin, 1789 : 2 mâles du 23 au 20 octobre à Val de Reuil/27
4. **Sarcelle à ailes vertes** - *Anas carolinensis* J.F. Gmelin, 1789 : 1 mâle le 17 mars à Merville Franceville Plage/14
5. **Marouette de baillon** - *Zapornia pusilla* (Pallas, 1776) : 1 première année capturée le 6 août à Genêts/50 et 1 autre première année le 7 et 8 septembre à Pontorson/50
6. **Outarde barbue** - *Otis tarda* Linnaeus, 1758 : 1 le 13 avril à Chef du pont/50
7. **Bécasseau de Baird** - *Calidris bairdii* (Coues, 1861) : 1 juvénile le 25 août à Gonfreville l'Orcher/76 et 1 première année du 8 au 11 novembre à Cosqueville/50
8. **Bécasseau rousset** - *Calidris subruficollis* (Vieillot, 1819) : 1 le 11 mai à Merville Franceville Plage/14
9. **Bécasseau semipalmé** - *Calidris pusilla* (Linnaeus, 1766) : 1 première année le 15 septembre à Auderville/50
10. **Bécassine double** - *Gallinago media* (Latham, 1787) : 1 le 28 août à saint Arnoult/14

Données de 2015 homologuées par le CHN : (Reeber, S., Kayser, Y. & le CHN, 2016)

1. **Oie à bec court** - *Anser brachyrhynchus* Baillon, 1833 : Calvados – Graye-sur-Mer, 2 ind., phot., 13 novembre (F. Leclerc) ; Manche – Sainte-Marie-du-Mont, 3 ad., phot., du 14 novembre au 11 février 2016 (S. Provost, V. Vautrain, A. Denis et al.).
2. **Sarcelle marbrée** - *Marmaronetta angustirostris* (Ménétries, 1832) : Eure – Igoville : la Planquette, ad., phot., du 7 au 9 janvier (C. Goujon, A. Confais) ; Manche – Bréhal : station de lagunage de Tanguières, ad., 26 juin (B. Chevalier).
3. **Buse pattue** - *Buteo lagopus* (Pontoppidan, 1763) : 2011 Calvados – Ouistreham et Merville-Franceville-Plage, 1^{er} hiver, 9 novembre (J. Jean-Baptiste et al.) ; Coulonces, Tournai-sur-Dive, Bailleul et Villedieu-les-Bailleul, 1^{er} hiver, phot., du 27 novembre au 31 janvier 2012 (J. Jean-Baptiste, F. Gabillard, B. Lang et al.).
4. **Sterne de forster** - *Sterna forsteri* Nuttall, 1834 : Calvados – Saint-Laurent-sur-Mer : front de mer, phot., du 6 au 29 janvier (O. Zucchet et al.) ; Manche – Saint-Pair-sur-Mer : plage du Thar, et Donville-les-Bains, ad., phot., 26 août, 10 septembre et du 22 octobre au 17 novembre (S. Provost, V. Vautrain, P. Desgué, G. Caucau).
5. **Fauvette épervière** - *Sylvia nisoria* (Bechstein, 1792) : Manche – Vains : Pointe du Grouin du Sud, juv./1^{er} hiver, phot., 22 et 23 août (K. Le Rest, S. Provost).

Sterne de Forster



Victor Leray

Remerciements : Les membres du CHR Normandie remercient vivement tous les ornithologues qui transmettent leurs fiches descriptives et photographies, permettant ainsi d’assurer une « traçabilité » des observations d’oiseaux rares en Normandie. Merci également au bureau du GONm de nous avoir accueillis au siège régional de Caen pour la réunion annuelle.

Comité d’Homologation Régional de Normandie (GONm) : oiseaux rares
chr.normandie@gmail.com

Bibliographie :

Crochet, P-A., Dubois, P. J., Jiguet, F., Le Maréchal, P., Pons, J-M. & Yésou, P. (2015). Décision prises par la Commission de l’Avifaune Française (2014-2016) – 14^{ème} rapport de la CAF. *Ornithos* 23-5 : 238-253 (2016).

Gadeau de Kerville H. (1890). FAUNE DE LA NORMANDIE F ASC. II OISEAUX (CARNIVORES, OMNIVORES, INSECTIVORES ET GRANIVORES) - EXTRAIT du Bulletin de la Société des Amis des Sciences naturelles de Rouen, 1^{er} semestre. PARIS, *Librairie J.-B. Baillière et fils*.

Provost, S. & le CHR Normandie (2016). Les oiseaux rares en Normandie en 2015 (22^{ème} circulaire). Rapport du Comité d’Homologation Régional.

Reeber, S. & Kayser, Y. (2016). Les oiseaux rares en France en 2015. 33^{ème} rapport du Comité d’Homologation National. *Ornithos* 23-6 : 300-329 (2016).

LISTE DES ESPECES SOUMISES A HOMOLOGATION EN NORMANDIE (GONm)

D'après la « Liste officielle des Oiseaux de France », édition 2016 (catégories A, B et C) - Commission de l'Avifaune Française (CAF)

Notez que toutes les autres espèces plus rares ne figurant pas encore sur la liste des oiseaux de Normandie sont aussi à soumettre au CHR

Nom vernaculaire	Nom scientifique	Descripteur	Anciens noms	Catégories de la CAF
Cygne de Bewick	<i>Cygnus columbianus</i>	(Ord, 1815)		A
Cygne chanteur	<i>Cygnus cygnus</i>	(Linnaeus, 1758)	Cygne sauvage	A
Oie à bec court	<i>Anser brachyrhynchus</i>	Baillon, 1833		A
Oie naine	<i>Anser erythropus</i>	(Linnaeus, 1758)		A
Oie des neiges	<i>Anser caerulescens</i>	(Linnaeus, 1758)	Oie blanche, Grande oie des neiges	BD
Bernache cravant du Pacifique	<i>Branta bernicla nigricans</i>	(Lawrence, 1846)	Bernache du Pacifique	A
Bernache à cou roux	<i>Branta ruficollis</i>	(Pallas, 1769)		A
Canard à front blanc	<i>Anas americana</i>	J.F. Gmelin, 1789	Canard d'Amérique	A
Sarcelle à ailes vertes	<i>Anas carolinensis</i>	J.F. Gmelin, 1789	Sarcelle de la Caroline	A
Canard noir	<i>Anas rubripes</i>	Brewster, 1902		A
Sarcelle à ailes bleues	<i>Anas discors</i>	Linnaeus, 1766		A
Sarcelle marbrée	<i>Marmaronetta angustirostris</i>	(Ménétries, 1832)		A
Fuligule à bec cerclé	<i>Aythya collaris</i>	(Donovan, 1809)		A
Fuligule nyroca	<i>Aythya nyroca</i>	(Güldenstädt, 1770)		A
Eider à tête grise	<i>Somateria spectabilis</i>	(Linnaeus, 1758)		A
Harelde boréale	<i>Clangula hyemalis</i>	(Linnaeus, 1758)	Harelde de Miquelon, Harelde kakawi	A
Macreuse à bec jaune	<i>Melanitta americana</i>	(Swainson, 1832)	Macreuse d'Amérique	A
Garrot d'islande	<i>Bucephala islandica</i>	(J.F. Gmelin, 1789)		A
Erismature rousse	<i>Oxyura jamaicensis</i>	(J.F. Gmelin, 1789)		A
Erismature à tête blanche	<i>Oxyura leucocephala</i>	(Scopoli, 1769)		A
Plongeon à bec blanc	<i>Gavia adamsii</i>	(Gray, 1859)		A
Albatros à sourcils noirs	<i>Thalassarche melanophris</i>	Temminck, 1828		A
Puffin cendré	<i>Calonectris borealis</i>	(Cory, 1881)		A
Puffin majeur	<i>Puffinus gravis</i>	(O'Reilly, 1818)		A
Océanite culblanc	<i>Oceanodroma leucorhoa</i>	(Vieillot, 1818)	Pétrel tempête à culblanc	A
Cormoran pygmée	<i>Phalacrocorax pygmaeus</i>	(Pallas, 1773)		A
Pélican blanc	<i>Pelecanus onocrotalus</i>	Linnaeus, 1758		A
Blongios nain	<i>Ixobrychus minutus</i>	(Linnaeus, 1766)		A
Crabier chevelu	<i>Ardeola ralloides</i>	(Scopoli, 1769)	Héron crabier	A
Ibis falcinelle	<i>Plegadis falcinellus</i>	(Linnaeus, 1766)		A
Flamant rose	<i>Phoenicopterus roseus</i>	Pallas, 1811		A
Grèbe à bec bigarré	<i>Podilymbus podiceps</i>	(Linnaeus, 1758)		A
Elanion blanc	<i>Elanus caeruleus</i>	(Desfontaines, 1789)	Elanion blanc	A
Pygargue à queue blanche	<i>Haliaeetus albicilla</i>	(Linnaeus, 1758)		A
Gypaète barbu	<i>Gypaetus barbatus</i>	(Linnaeus, 1758)		A
Vautour fauve	<i>Gyps fulvus</i>	(Habliz, 1783)		A
Vautour moine	<i>Aegypius monachus</i>	(Linnaeus, 1766)		A
Circaète Jean-le-Blanc	<i>Circaetus gallicus</i>	(J.F. Gmelin, 1788)		A
Busard pâle	<i>Circus macrourus</i>	(S.G. Gmelin, 1770)		A
Buse féroce	<i>Buteo rufinus</i>	(Cretzschmar, 1829)		A
Buse pattue	<i>Buteo lagopus</i>	(Pontoppidan, 1763)		A
Aigle criard	<i>Aquila clanga</i>	(Pallas, 1811)		A
Aigle pomarin	<i>Aquila pomarina</i>	(Brehm, 1831)		A
Aigle botté	<i>Aquila pennata</i>	(J.F. Gmelin, 1788)		A
Aigle royal	<i>Aquila chrysaetos</i>	(Linnaeus, 1758)		A
Marouette poussin	<i>Zapornia parva</i>	(Scopoli, 1769)		A
Marouette de baillon	<i>Zapornia pusilla</i>	(Pallas, 1776)		A
Talève sultane	<i>Porphyrio porphyrio</i>	(Linnaeus, 1758)		AC
Grue demoiselle	<i>Grus virgo</i>	(Linnaeus, 1758)		A
Outarde canepetière	<i>Tetrax tetrax</i>	(Linnaeus, 1758)		A
Outarde Barbue	<i>Otis tarda</i>	Linnaeus, 1758	Grande outarde	A
Guignard d'Eurasie	<i>Charadrius morinellus</i>	Linnaeus, 1758	Pluvier guignard	A
Gravelot kildir	<i>Charadrius vociferus</i>	Linnaeus, 1758		A
Vanneau sociable	<i>Vanellus gregarius</i>	(Pallas, 1777)		A
Gravelot mongol	<i>Charadrius mongolus</i>	Pallas, 1776		A

Bécasseau falcinelle	<i>Calidris falcinellus</i>	(Pontoppidan, 1763)		A
Bécasseau à cou roux	<i>Calidris ruficollis</i>	(Pallas, 1776)	Bécasseau à col roux	A
Bécasseau de Temminck	<i>Calidris temminckii</i>	(Leisler, 1812)		A
Bécasseau de Baird	<i>Calidris bairdii</i>	(Coues, 1861)		A
Bécasseau de Bonaparte	<i>Calidris fuscicollis</i>	(Vieillot, 1819)		A
Bécasseau rousset	<i>Calidris subruficollis</i>	(Vieillot, 1819)		A
Bécasseau tacheté	<i>Calidris melanotos</i>	(Vieillot, 1819)		A
Bécasseau semipalmé	<i>Calidris pusilla</i>	(Linnaeus, 1766)		A
Phalarope de Wilson	<i>Phalaropus tricolor</i>	(Vieillot, 1819)		A
Phalarope à bec étroit	<i>Phalaropus lobatus</i>	(Linnaeus, 1758)		A
Phalarope à bec large	<i>Phalaropus fulicarius</i>	(Linnaeus, 1758)		A
Chevalier bargette	<i>Xenus cinereus</i>	(Guldenstädt, 1775)		A
Chevalier grivelé	<i>Actitis macularius</i>	(Linnaeus, 1766)		A
Chevalier criard	<i>Tringa melanoleuca</i>	(J.F. Gmelin, 1789)	Grand chevalier à pattes jaunes	A
Chevalier à pattes jaunes	<i>Tringa flavipes</i>	(J.F. Gmelin, 1789)	Petit chevalier à pattes jaunes	A
Chevalier stagnatile	<i>Tringa stagnatilis</i>	(Bechstein, 1803)		A
Bécassin à long bec	<i>Limnodromus scolopaceus</i>	(Say, 1823)		A
Bécassine double	<i>Gallinago media</i>	(Latham, 1787)		A
Glaréole à collier	<i>Glareola pratincola</i>	(Linnaeus, 1766)		A
Labbe à longue queue	<i>Stercorarius longicaudus</i>	Vieillot, 1819		A
Macareux moine	<i>Fratercula arctica</i>	(Linnaeus, 1758)		A
Guillemot à miroir	<i>Cephus grylle</i>	(Linnaeus, 1758)		A
Mergule nain	<i>Alle alle</i>	(Linnaeus, 1758)		A
Sterne fuligineuse	<i>Onychoprion fuscatus</i>	(Linnaeus, 1766)		A
Sterne hansel	<i>Gelochelidon nilotica</i>	(J.F. Gmelin, 1789)		A
Sterne caspienne	<i>Hydroprogne caspia</i>	(Pallas, 1770)		A
Guifette moustac	<i>Chlidonias hybrida</i>	(Pallas, 1811)		A
Guifette leucoptère	<i>Chlidonias leucopterus</i>	(Temminck, 1815)		A
Sterne élégante	<i>Sterna elegans</i>	Gambel, 1849)		A
Sterne voyageuse	<i>Sterna bengalensis</i>	(Lesson, 1831)		A
Sterne de Forster	<i>Sterna forsteri</i>	Nuttall, 1834		A
Sterne de Dougall	<i>Sterna dougallii</i>	Montagu, 1813		A
Mouette blanche	<i>Pagophila eburnea</i>	(Phipps, 1774)		A
Mouette atricille	<i>Larus atricilla</i>	(Linnaeus, 1758)		A
Mouette de Franklin	<i>Larus pipixcan</i>	(Wagler, 1831)		A
Goéland d'Audouin	<i>Larus audouinii</i>	(Payraudeau, 1826)		A
Goéland à bec cerclé	<i>Larus delawarensis</i>	Ord, 1815		A
Goéland pontique	<i>Larus cachinnans</i>	Pallas, 1811		A
Goéland à ailes blanches	<i>Larus glaucooides</i>	Meyer, 1822	Goéland arctique	A
Goéland bourgmestre	<i>Larus hyperboreus</i>	Gunnerus, 1767		A
Coucou-geai	<i>Clamator glandarius</i>	(Linnaeus, 1758)		A
Coulicou à bec jaune	<i>Coccyzus americanus</i>	(Linnaeus, 1758)		A
Petit-duc scops	<i>Otus scops</i>	(Linnaeus, 1758)	Hibou petit-duc	A
Harfang des neiges	<i>Bubo scandiacus</i>	(Linnaeus, 1758)		A
Grand-Duc d'Europe	<i>Bubo bubo</i>	(Linnaeus, 1758)	Hibou grand-duc	A
Martinet à ventre blanc	<i>Apus melba</i>	(Linnaeus, 1758)	Martinet alpin	A
Rollier d'Europe	<i>Coracias garrulus</i>	Linnaeus, 1758		A
Faucon kobez	<i>Falco vespertinus</i>	Linnaeus, 1766		A
Faucon lanier	<i>Falco biarmicus</i>	Temminck, 1825		A
Faucon sacre	<i>Falco cherrug</i>	Gray, 1834		A
Faucon gerfaut	<i>Falco rusticolus</i>	Linnaeus, 1758		A
Pie-grièche à poitrine rose	<i>Lanius minor</i>	J.F. Gmelin, 1788		A
Pie-grièche grise	<i>Lanius excubitor</i>	Linnaeus, 1758		A
Pie-grièche à tête rousse	<i>Lanius senator</i>	Linnaeus, 1758		A
Crave à bec rouge	<i>Pyrhocorax pyrrhocorax</i>	(Linnaeus, 1758)		A
Cassenoix moucheté	<i>Nucifraga caryocatactes</i>	(Linnaeus, 1758)		A
Corneille mantelée	<i>Corvus cornix</i>	Linnaeus, 1758		A
Rémiz penduline (2)	<i>Remiz pendulinus</i>	(Linnaeus, 1758)		A
Alouette haussecol	<i>Eremophila alpestris</i>	(Linnaeus, 1758)		A
Alouette calandrelle	<i>Calandrella brachydactyla</i>	Leisler, 1814		A
Hirondelle de rochers	<i>Ptyonoprogne rupestris</i>	(Scopoli, 1769)		A
Hirondelle rousseline	<i>Cecropis daurica</i>	(Laxmann, 1769)		A
Pouillot de Pallas	<i>Phylloscopus proregulus</i>	(Pallas, 1811)		A

Pouillot à grands sourcils	<i>Phylloscopus inornatus</i>	(Blyth, 1842)		A
Pouillot de Hume	<i>Phylloscopus humei</i>	(Brooks, 1878)		A
Pouillot brun	<i>Phylloscopus fuscatus</i>	(Blyth, 1842)		A
Pouillot de Bonelli	<i>Phylloscopus bonelli</i>	(Vieillot, 1819)		A
Pouillot de Sibérie (4)	<i>Phylloscopus collybita tristis</i>	Blyth, 1843	Pouillot véloce de Sibérie	A
Pouillot ibérique	<i>Phylloscopus ibericus</i>	Ticehurst, 1937		A
Fauvette épervière	<i>Sylvia nisoria</i>	(Bechstein, 1792)		A
Fauvette mélanocéphale	<i>Sylvia melanocephala</i>	(J.F. Gmelin, 1789)		A
Fauvette passerinette	<i>Sylvia cantillans</i>	(Pallas, 1764)		A
Hypolaïs icterine	<i>Hippolais icterina</i>	(Vieillot, 1817)		A
Phragmite aquatique (5)	<i>Acrocephalus paludicola</i>	(Vieillot, 1817)		A
Rousserolle isabelle	<i>Acrocephalus agricola</i>	(Jerdon, 1845)		A
Rousserolle des buissons	<i>Acrocephalus dumetorum</i>	Blyth, 1849		A
Rousserolle turdoïde	<i>Acrocephalus arundinaceus</i>	(Linnaeus, 1758)		A
Jaseur boréal	<i>Bombycilla garrulus</i>	(Linnaeus, 1758)		A
Tichodrome échelette	<i>Tichodroma muraria</i>	(Linnaeus, 1766)		A
Etourneau unicolore	<i>Sturnus unicolor</i>	Temminck 1820		A
Etourneau rosein	<i>Pastor roseus</i>	(Linnaeus, 1758)		A
Cingle plongeur	<i>Cinclus cinclus</i>	(Linnaeus, 1758)		A
Grive dorée	<i>Zoothera dauma</i>	(Latham, 1790)		A
Robin à flancs roux	<i>Tarsiger cyanurus</i>	(Pallas, 1773)		A
Gobemouche nain	<i>Ficedula parva</i>	(Bechstein, 1794)		A
Gobemouche à collier	<i>Ficedula albicollis</i>	(Temminck, 1815)		A
Monticole de roche	<i>Monticola saxatilis</i>	(Linnaeus, 1766)	Merle de roche	A
Tarier de Sibérie	<i>Saxicola maurus</i>	(Pallas, 1773)		A
Traquet oreillard	<i>Oenanthe hispanica</i>	(Linnaeus, 1758)		A
Traquet du désert	<i>Oenanthe deserti</i>	(Temminck, 1825)		A
Accenteur alpin	<i>Prunella collaris</i>	(Scopoli, 1769)		A
Moineau espagnol	<i>Passer hispaniolensis</i>	(Temminck, 1820)		A
Bergeronnette nordique	<i>Motacilla flava thunbergi</i>	Billberg, 1828	Bergeronnette printanière nordique	A
Bergeronnette d'Italie	<i>Motacilla flava cinereocapilla</i>	Savi, 1831	Bergeronnette printanière d'Italie	A
Bergeronnette citrine	<i>Motacilla citreola</i>	Pallas, 1776		A
Pipit de Richard (3)	<i>Anthus richardi</i>	Vieillot, 1818		A
Pipit de Godlewski	<i>Anthus godlewskii</i>	Taczanowski, 1876		A
Pipit rousseline (1)	<i>Anthus campestris</i>	(Linnaeus, 1758)		A
Pipit à dos olive	<i>Anthus hodgsoni</i>	Richmond, 1907		A
Pipit à gorge rousse	<i>Anthus cervinus</i>	(Pallas, 1811)		A
Roselin cramoisi	<i>Erythrina erythrina</i>	(Pallas, 1770)		A
Roselin githagine	<i>Bucanetes githagineus</i>	(Lichtenstein, 1823)		A
Linotte à bec jaune	<i>Carduelis flavirostris</i>	(Linnaeus, 1758)		A
Sizerin flammé	<i>Acanthis flammea</i>	(Linnaeus, 1758)	Sizerin flammé boréal	A
Sizerin blanchâtre	<i>Acanthis hornemanni</i>	(Holboell, 1843)		A
Bruant à couronne blanche	<i>Zonotrichia leucophrys</i>	(Forster, 1772)		A
Bruant mélanocéphale	<i>Emberiza melanocephala</i>	Scopoli, 1769		A
Bruant fou	<i>Emberiza cia</i>	Linnaeus, 1766		A
Bruant ortolan (3)	<i>Emberiza hortulana</i>	Linnaeus, 1758		A
Bruant à calotte blanche	<i>Emberiza leucocephalos</i>	S.G. Gmelin, 1771		A
Bruant nain	<i>Emberiza pusilla</i>	Pallas, 1776		A

Mise à Jour : 12/2017*en gras, les espèces soumises au CHN et en gris les sous-espèces)*

(1) sauf pour les falaises de Carolles et le cap de la Hève.

(2) sauf les départements de Seine-Maritime (76) et Eure (27) depuis le 1er janvier 2013.

(3) une fiche globale saisonnière pour les sites de Carolles et du cap de la Hève.

(4) avec enregistrement du cris et/ou chant

(5) uniquement les données hors capture/baguage

Catégorie A = Espèces présentes à l'état sauvage en France métropolitaine y compris la frange maritime (Zone Économique Exclusive), observées au moins une fois depuis 1950 et dont l'origine naturelle est considérée comme la plus probable au moins pour un individu**Catégorie B** = Espèces observées à l'état sauvage sur la même aire géographique, mais qui n'ont pas été revues depuis 1950.**Catégorie C** = Espèces introduites ou échappées de captivité en France métropolitaine depuis plusieurs années, qui ont fait souche et dont au moins une population se maintient par reproduction en milieu naturel, indépendamment d'éventuels apports supplémentaires d'origine humaine**LISTE DES ESPÈCES SOUMISES À HOMOLOGATION EN NORMANDIE (GONm)***D'après la « Liste officielle des Oiseaux de France », édition 2016 (catégories D et E) - Commission de l'Avifaune Française (CAF)**Notez que toutes les autres espèces plus rares ne figurant pas encore sur la liste des oiseaux de Normandie sont aussi à soumettre au CHR*

Nom vernaculaire	Nom scientifique	Descripteur	Anciens noms	Catégories de la CAF
Canard à faucilles	<i>Anas falcata</i>	Georgi, 1775		D
Arlequin plongeur	<i>Histrionicus histrionicus</i>	(Linnaeus, 1758)	Canard arlequin, Garrot Arlequin	D
Pélican frisé	<i>Pelecanus crispus</i>	Bruch, 1832		D
Flamant nain	<i>Phoenicopterus minor</i>	G.R. Gray, 1869		D
Vanneau éperonné	<i>Vanellus spinosus</i>	(Linnaeus, 1758)		D
Tourterelle maillée	<i>Streptopelia senegalensis</i>	(Linnaeus 1766)		D
Corbeau familier	<i>Corvus splendens</i>	Vieillot, 1817		D
Carouge à tête jaune	<i>Xanthocephalus xanthocephalus</i>	(Bonaparte, 1826)		D
Bernache de Hutchins	<i>Branta hutchinsii</i>	(Richardson, 1832)		E
Sarcelle cannelle	<i>Anas cyanoptera</i>	Vieillot, 1816		E
Fuligule à dos blanc	<i>Aythya valisineria</i>	(Wilson, 1814)		E
Harle couronné	<i>Lophodytes cucullatus</i>	(Linnaeus, 1758)		E
Albatros hurleur	<i>Diomedea exulans</i>	Linnaeus, 1758		E
Damier du Cap	<i>Daption capense</i>	(Linnaeus, 1758)		E
Pélican gris	<i>Pelecanus rufescens</i>	Gmelin, 1789		E
Spatule d'Afrique	<i>Platalea alba</i>	Scopoli, 1786		E
Buse de Swainson	<i>Buteo swainsoni</i>	Bonaparte, 1838		E
Vautour de Rüppell	<i>Gyps rueppelli</i>	(Brehm, 1852)		E
Talève à tête grise	<i>Porphyrio porphyrio poliocephalus</i>	(Latham, 1801)	Talève sultane à tête grise	E
Pluvier fluviatile	<i>Pluvianus aegyptius</i>	(Linnaeus 1758)		E
Faucon de l'Amour	<i>Falco amurensis</i>	Radde, 1863		E
Faucon de Barbarie	<i>Falco pelegrinoides</i>	Temminck, 1829		E
Corbeau familier	<i>Corvus splendens</i>	Vieillot, 1817		E
Calliope sibérienne	<i>Luscinia calliope</i>	(Pallas, 1776)		E
Gobemouche narcisse	<i>Ficedula narcissina</i>	Temminck, 1836		E
Etourneau soyeux	<i>Sturnus sericeus</i>	J.F. Gmelin, 1789	<i>Spodiopsar sericeus</i>	E
Roselin de Lichtenstein	<i>Rhodopechys obsoleta</i>	(Lichtenstein, 1823)	<i>Rhodospiza obsoleta</i>	E
Roselin pourpre	<i>Carpodacus purpureus</i>	(Gmelin, 1789)	<i>Haemorhous purpureus</i>	E
Bruant élégant	<i>Emberiza elegans</i>	Temminck, 1836		E

*en gras, les espèces soumises au CHN (toutes celles des catégories D et E)***Catégorie D** = Espèces pour lesquelles il existe au moins une mention dont l'origine naturelle est possible, mais cependant pas la plus probable compte tenu des informations disponibles. L'arrivée de ces espèces en France métropolitaine a pu être aidée volontairement par l'Homme ou bien il s'agit d'échappés de captivité.**Catégorie E** = Espèces supposées d'origine captive, mentionnées dans la littérature comme ayant été vues dans la nature en France métropolitaine

Comité d'Homologation Régional

Fiche descriptive pour l'observation d'une espèce occasionnelle en Normandie
à retourner à : chr.normandie@gmail.com

Espèce proposée

Nom français :

Nom scientifique :

Nombre d'oiseaux :

Sexe :

Age :

Date(s) d'observation(s) :

Localité (Commune (département) / Lieu-dit) :

Rédacteur de la fiche (Prénom NOM / adresse courriel ou postale) :

Autres observateurs :

Durée des observations :

Qui l'a trouvé :

Qui l'a identifié :

Matériel optique utilisé :

Distance d'observation :

L'oiseau a-t-il été photographié :

Par qui :

L'oiseau a-t-il été capturé :

Par qui :

L'oiseau a-t-il été conservé :

Où :

Conditions météorologiques :

Connaissances antérieures de l'espèce :

Connaissances d'espèces voisines :

Description de l'observation et de l'oiseau (avant recours aux guides d'identification) :

indiquer les conditions dans lesquelles l'oiseau a été observé, puis établir une description détaillée de celui-ci (silhouette, coloration du plumage partie par partie, comportement, voix...). Joindre éventuellement une copie des notes prises sur le terrain, ainsi que tout autre document utile : dessin, photo, vidéo, enregistrement...