



# Les oiseaux rares en Normandie en 2018

## Rapport du Comité d'Homologation Régional

*Alexandre CORBEAU, Martin BILLARD & le CHR Normandie*

(Novembre 2019)

Le CHR rappelle que son objectif est d'authentifier et de publier les observations d'oiseaux rares à l'échelle régionale, sur la base de descriptions (et/ou photos). Réuni le 6 juillet 2019 à Caen (14), le **CHR Normandie** a terminé l'examen de la 25e circulaire, couvrant pour l'essentiel l'année 2018. Le nombre de fiches reçues est de 114 pour 34 espèces différentes.

D'autres observations régionales ne font pas l'objet de fiche CHR, des erreurs d'identification ne sont pas exclues dans certains cas.

La dernière réunion s'est déroulée en présence des membres suivants : Martin Billard, Alexandre Corbeau (secrétaire), Yvon Créau (vérificateur auprès du GONm), Jocelyn Desmares, Benoît Lecaplain et David Vigour. Jean-Pierre Marie, Gunter de Smet et Sébastien Provost n'ont pas pu être présent.

Yvon quitte le CHR normand pour le CHR breton, Alexandre quitte le secrétariat du CHR (tout en restant membre) et Martin Billard le reprend, nous les remercions vivement tous pour leur travail effectué.

Avec l'arrivée du portail régional de [Faune France](#) (et l'arrêt de Clicnat), le fonctionnement du CHR a été revu. Les CHR GONm et LPO vont fusionner en un seul CHR Normand et la validation des fiches se fera maintenant directement sur le portail Faune France. Il sera maintenant inutile de remplir une fiche de validation, un formulaire vous sera demandé directement sur le portail lorsque vous signalerez une espèce à homologation. Pour les personnes qui souhaitent garder l'ancien système, nous recevrons bien évidemment les données et les examinerons. Cependant nous essayerons à terme de passer uniquement par le portail Faune France et inviterons les observateurs à rentrer leurs données sur Faune France ou proposerons de le faire à leur place (avec saisie seconde main et avec le nom de l'observateur en commentaire).

Avec ce changement la liste des espèces CHR a été mise à jour : en la fusionnant avec la liste du CHR LPO, en vérifiant la base donnée validée du CHN en en la conformisant avec la nouvelle liste de CAF sortie en 2018. Cette liste est à retrouver en fin de ce document et avec les rapports annuels, téléchargeables sur le lien (<http://www.gonm.org/index.php?post/CHR-%28Comit%C3%A9-d-Homologation-R%C3%A9gional%29>) ou sur demande au secrétariat du CHR : [chr.normandie@gmail.fr](mailto:chr.normandie@gmail.fr)

Enfin, nous rappelons que dans les fiches transmises, il faut nécessairement une description, même succincte (elle vous sera demandée lors de la saisie sur Faune France), qui permet d'éliminer les autres espèces similaires à celle décrite.

À noter que cette année moins de fiches ont été reçues du fait de la mise en place du portail faune France, ces données seront donc évaluées dans le futur.

Notez aussi que les données saisies sur l'application « [Naturalist](#) » seront transmises au portail régional normand de Faune France. Donc, n'hésitez pas à aussi utiliser cet outil.

## Liste des espèces homologuées lors de l'année 2018

### **1. Cygne de Bewick - *Cygnus columbianus* (Ord, 1815)**

6 individus au marais vernier/27 (F. Prevost) le 2 janvier.

Cygne rare en Normandie, avec 1 données en 2015 et 2014, record en 2010 avec 4 données pour 13 individus.

### **2. Cygne chanteur - *Cygnus cygnus* (Linnaeus, 1758)**

6 individus adultes du 27 janvier au 2 février à Saint Vigor d'Ymonville/76 (J. Jean-Baptiste, M. Billard, G. De Smet et al.).

Effectif stable et classique avec toujours un groupe à Saint Vigor d'Ymonville.



Martin billard

### **3. Bernache cravant du Pacifique - *Branta bernicla nigricans* (Lawrence, 1846)**

2 individus du 8 janvier au 4 mars à Saint Vaast la Hougue/50 (S. Crestey) et 1 individu le 24 février à Brévands/50 (M. Billard, J. Jean-Baptiste, J. Girard).

Espèce annuelle depuis 2008.



Martin Billard

**4. Fuligule à bec cerclé - *Aythya collaris* (Donovan, 1809)**

1 mâle adulte le 25 novembre à Poses/27 (S. Wroza).

Espèce occasionnelle en Normandie, 1 individu observé depuis les deux dernières années sur le même secteur.

**5. Harelde boréale - *Clangula hyemalis* (Linnaeus, 1758)**

1 femelle de 2 ans présente à Réthoville du 20 au 22 avril (A. Verneau).

Après l'année record de 2017 (25), il s'agit cette année d'un effectif plus classique.



Alain Verneau

**6. Puffin cendré - *Calonectris borealis* (Cory, 1881)**

2 individus lors de séance de seawatch au phare de Gatteville-le-Phare/50 : 1 le 29 septembre (A. Verneau, S. Crestey, L. Delpit, L. Legrand) et 1 le 27 octobre (S. Crestey, et al.). Année record comme en 2017, dernières observations antérieures en 2014, 2013, 1990 et 1988.

**7. Océanite culblanc - *Oceanodroma leucorhoa* (Vieillot, 1818)**

10 oiseaux. Toutes les observations ont une nouvelle fois été faites à Gatteville-le-Phare/50 lors de séances de seawatch : 1 le 7 octobre (A. Verneau), 9 entre le 27 et 29 octobre (A. Verneau) et 1 le 10 décembre (S. Crestey, J-P. Marie, A. Verneau).

Océanite toujours rare, mais observée annuellement depuis 2016, 7 individus en 2017.

**8. Blongios nain - *Ixobrychus minutus* (Linnaeus, 1766)**

Toujours un individu observé dans le même secteur de Val de Reuil/27 (C. Gérard) le 21 août.

**9. Ibis falcinelle - *Plegadis falcinellus* (Linnaeus, 1766)**

22 individus. 5 le 29 janvier à Sainte-Marie-du-Mont/50 (G. Vimard), 4 le 1<sup>er</sup> février à Monfreville/14 (G. Vimard), 3 le 24 février à Saint-Fromond/50 (M. Billard, J. Jean-Baptiste, J. Girard), 1 du 12 au 19 mars à Hotot-en-Auge/14 (M. Deflandre, T. Pitrey & D. Avondes), 2 du 16 au 18 mars à Dragey-Ronthon/50 (M. Leroux), 3 le 1 juillet à Sandouville/76 (X. Vergon), 3 le 9 septembre à Réthoville/50 (A. Verneau, S. Crestey, A. Guérard), 1 individus le 29 septembre à Merville Franceville-Plage/14 (D. Hamel, JP. Marie).

Espèce régulière et annuelle depuis 2011, de plus en plus d'observations chaque année.



Denis Hamel

**10. Pygargue à queue blanche - *Haliaeetus albicilla* (Linnaeus, 1758)**

1 juvénile le 8 novembre à Vauville/50 (M-L Travert, D. Rungette, A. Doucet, G. Texier), 1 adulte le 2 janvier au Marais Vernier/27 (F. Prevost), 1 immature le 9 janvier à Saint-Mards-de-Blacarville/27 (G. Debout, A. Cazin).

Après un individu retrouvé mort en 2015 (données précédentes de 2001), il y a eu 2 observations de cette espèce en 2016 et 2 en 2017.

**11. Circaète Jean-le-Blanc - *Circaetus gallicus* (J.F. Gmelin, 1788)**

1 individu le 18 juillet à Heurteauville/76 (X. Vergon).

Observation quasi annuelle d'un ou deux individus de ce rapace depuis 2009.



Xavier Vergon

**12. Guignard d'Eurasie - *Charadrius morinellus* Linnaeus, 1758**

1 individu hivernal exceptionnel (peut-être hivernant dans la région) le 10 février à Fierville-Bray/14 (J.P. Moulin) et 1 les 27 octobre à Réthoville/50 (S. Crestey, L. Legrand).

Espèce régulière avec quelques individus observés chaque année.

**13. Phalarope à bec large - *Phalaropus fulicarius* (Linnaeus, 1758)**

2 individus le 23 (JP. Marie) et 1 le 28 septembre à Colleville-Montgomery/14 (JP. Marie, M. Billard), 2 le 21 septembre à Auderville/50 A. Verneau), 1 le 28 octobre à Gatteville-le-Phare/50 (JP. Marie, S. Crestey) et 1 le 4 décembre au Val-de-Reuil/27 (T. Domalain).

Bonne année avec 8 individus de cette espèce annuelle.



Alain Verneau

**14. Labbe à longue queue - *Stercorarius longicaudus* Vieillot, 1819**

1 individu le 28 octobre à Gatteville-le-Phare/50 (A. Verneau, J.P. Marie).

Effectif classique après les années record de 2013 (6 individus) et 2016 (4 individus).

**15. Macareux moine - *Fratercula arctica* (Linnaeus, 1758)**

2 individus observés lors d'un seawatch à Gatteville-le-Phare/50 1 le 28 octobre et 1 le 10 décembre (J.P. Marie, S. Crestey, A. Verneau).

Espèce qui est régulière maintenant avec un record de 15 en 2016, mais aucun en 2017.

**16. Mergule nain - *Alle alle* (Linnaeus, 1758)**

9 individus observés cette année en seawatch à Gatteville-le-Phare/50 : 1 le 29 octobre (S. Crestey, A. Verneau, G. Guillou) et 8 le 10 décembre (A. Verneau, S. Crestey, J-P. Marie).

Espèce observée régulièrement et chaque année depuis 2014 avec un record de 24 individus en 2015.

**17. Sterne caspienne- *Hydroprogne caspia* (Pallas, 1770)**

1 adulte le 29 juin à Saint-Pair-sur-Mer/50 (P. Desgué & S. Provost).

L'espèce est annuelle, mais toujours rare.



Sébastien Provost

**18. Guifette leucoptère - *Chlidonias leucopterus* (Temminck, 1815)**

Une juvénile le 26 août sur la prairie de Caen/14 (F. Leclerc).

Espèce très rare, avec 8 données jusqu'à maintenant validées au CHR.



François Leclerc

**19. Guifette moustac - *Chlidonias hybrida* (Pallas, 1811)**

Une adulte le 13 mai à Saint-Vigor-d'Ymonville/76 (A. Hugues, C. Wilkins) et 2 adultes le 30 mai à Saint-Pair-sur-Mer/50 (P. Desgué).

Une espèce toujours régulière et annuelle.



Patrick Desgué

**20. Goéland pontique - *Larus cachinnans* Pallas, 1811**

Encore une année avec beaucoup d'observation (30 individus).

6 individus observés à Cuves/50 (S. Provost) entre le 12 janvier et le 9 avril, tous dans leurs premiers hivers. 7 individus à Dives-sur-Mer (T. le Huu Nghia) entre le 16 septembre et le 20 octobre et un le 20 janvier, 7 individus à Quiberville et 3 à Saint-Aubin-sur-Mer/76 (Y. Carasco) observé en mars, avril, mai et novembre, 3<sup>ème</sup> année à Billy/14 le 5 janvier (JP. Marie) et le 8 juillet et 25 avril (F. Leclerc). 1 deuxième année le 23 février à Bretteville le Rabet (J. Jean-Baptiste), 1 deuxième année le 10 mars à Ommoy (J. Jean-Baptiste) et 2 individus le 8 décembre à Poses/27 (R. Malignat).



Tony Le Huu Nghia

## 21. Goéland à ailes blanches - *Larus glaucoides* Meyer, 1822

Très bonne année avec 11 individus observés dont certains ont stationné près de 2 mois.

1 première année à Billy/14 du 17 février au 3 avril rejoint par un autre le 21 mars jusqu'au 3 avril (F. Lerclerc), 1 deuxième hiver à Cuves (S. Provost) le 9 février, 2 du 4 avril au 2 mai à Bretteville-le-Rabet/14 (F. Leclerc), 2 individus de deuxième année à Merville-Franceville-Plage/14 et Colleville-Montgomery/14 (JP. Marie) le 10 et 18 avril, 1 à Quiberville/76 le 6 mai (Y. Carasco), 1 deuxième année le 6 janvier à Réthoville (A. et V. Verneau, S. Crestey), 1 individu le 13 mars à Saint Aubin sur Mer/76 (Y. Carasco) et 1 immature du 10 au 19 février à Saint Vaast la Hougue (A.Verneau, L. Delpit, S. Crestey).



Alain Verneau

## 22. Goéland bourgmestre - *Larus hyperboreus* Gunnerus, 1767

2 première hiver à Cuves/50 (S. Provost) le 30 janvier (H1) et le 15 mars (H1), 1 première année du 25 janvier au 16 février à Fermanville/50 (J-L. Reuzé, S. Crestey) et 1 autre première année le 25 janvier à Saint Jean le Thomas (M. Leroux).

Espèce devenant régulière avec ces observations de ces trois dernières années.



Jean Luc Reuzé

**23. Martinet pâle** – *Apus pallidus* (Shelley, 1870)

2 observations exceptionnelles cette année, 1 le 12 novembre à Grandcamp-Maisy/14 (A. Chartier, B. Lericque) et 1 le 15 novembre à Carolles/50 (S. Provost). Seule 1 donnée en 2007, 1 en 2010 et 3 en 2014 ont été validées au CHR.



Bernard Lericque

**24. Faucon kobez** - *Falco vespertinus* Linnaeus, 1766

1 mâle adulte le 2 septembre à Bayeux/14 (J. Barbe, M. Lhopitallier).  
L'espèce est annuelle depuis 2012, mais reste très rare.

**25. Pie-grièche grise** - *Lanius excubitor* Linnaeus, 1758

1 adulte le 26 septembre à Genêts (M. Pailley via S. Provost). Espèce peu commune, mais annuelle en période post-nuptiale.



Michel Pailley

**26. Pie-grièche à tête rousse** - *Lanius senator* Linnaeus, 1758

1 oiseau le 2 juillet à Saint Marguerite sur Mer/76 (C. Pirmez). Observation annuelle depuis 2013 sauf en 2015.

**27. Pouillot à grands sourcils - *Phylloscopus inornatus* (Blyth, 1842)**

1 individu le 14 octobre à Agon-Coutainville/50 (M. Billard, Z. Godey, N. Klatka), 3 à Carolles/50 (S. Provost) le 12 et 17 octobre, 2 à Chausey/50 le 25 octobre (S. Provost, M. Gautier) et 1 du 18 au 28 novembre à Saint-Marie-du-Mont/50 (A. Verneau, S. Crestey, S. Reeber, et al.).

Une prospection attentive sur le littoral en postnuptiale permet de détecter cette espèce rare, mais régulière en Normandie.



Sébastien Provost

**28. Pouillot de Bonelli - *Phylloscopus bonelli* (Vieillot, 1819)**

1 individu le 24 avril à Saint-Etienne-du-Rouvray/76 (Y. carasco), c'est la 3<sup>e</sup> mention régionale pour cette espèce (1 en 2012 et 1 en 2017).

**29. Phragmite aquatique - *Acrocephalus paludicola* (Vieillot, 1817)**

Les captures dans le cadre des opérations de baguage ne sont plus soumises à homologation. Seules les observations sur le terrain sont à soumettre. En 2017, 3 individus ont été observés sur un site classique pour l'espèce à Genêts/50 le 9 août 2017 (JM. Chartendrault).

En dehors du baguage, les données sont rares.

**30. Tichodrome échelette - *Tichodroma muraria* (Linnaeus, 1766)**

1 individu sur la cathédrale de Coutances/50 du 25 janvier au 17 février (J-P. Marie, M. Billard, et al.).



James Jean-Baptiste

**31. Accenteur alpin - *Prunella collaris* (Scopoli, 1769)**

Étonnant stationnement d'un puis deux individus au Mont Saint Michel/50 du 28 décembre au 13 janvier 2019 (G. Mainguy, S. Provost, et al.). L'espèce est rarissime en Normandie, c'est la 3<sup>e</sup> donnée validée en Normandie.



Sébastien Provost

**32. Bergeronnette printanière nordique - *Motacilla flava thunbergi* Billberg, 1828**

1 mâle le 20 mai à Quiberville (Y. Carasco). Sous-espèce rare avec 3 oiseaux en 2015, 4 en 2016 aucune en 2017.

**33. Pipit de Richard - *Anthus richardi* Vieillot, 1818**

2 individus en migration à Carolles le 9 et 21 octobre (S. Provost), 1 le 18 octobre à Vrasville/50 (A. Verneau) et 1 le 11 décembre à Tracy-sur-Mer/14 (JP. Marie).

5 oiseaux en 2017, comme en 2016 et 2015 (7 en 2014), l'espèce devient annuelle et l'hivernage est de plus en plus régulier.

**34. Sizerin flammé (boréal) – *Acanthis flammea* (Linnaeus, 1758)**

9 individus ont été observés cette année 5 (3 mâles et 2 femelles) le 11 février à Léry-Poses/27 (J. Piolain, E. Grosso), 2 mâles du 13 au 15 février à Lonlay-le-Tesson/61 (J. Rivière) et 2 femelles probables le 6 janvier à Val-de-Reuil/27 (M. Billard, J-P. Marie). C'est la deuxième année que cette espèce est soumise à homologation au CHR depuis sa séparation du sizerin cabaret – *Acanthis cabaret* (observé classiquement dans notre région).



Jacques Rivière

**Fiches non homologuées :** principalement dû à des descriptions trop courtes (même après rappel) qui n'ont pas permis d'exclure des espèces voisines ou des erreurs d'identification ou bien à cause d'absence de critères fondamentaux.

1. **Blongios Nain** - *Ixobrychus minutus* (Linnaeus, 1766)  
1 le 23 août à Val de Reuil/27. La description trop succincte ne permet pas de confirmer cette espèce occasionnelle.
2. **Erismature rousse** - *Oxyura jamaicensis* (J.F. Gmelin, 1789)  
1 le 21 octobre au Val-de-Reuil/27. La description trop succincte ne permet pas de confirmer cette espèce occasionnelle.
3. **Goéland à bec cerclé** - *Larus delawarensis* Ord, 1815  
2 le 14 janvier à Saint Jouin Bruneval/76. Goélands décrits avec une tête toute blanche à cette date ne permet pas d'exclure une autre espèce.
4. **Goéland pontique** - *Larus cachinnans* Pallas, 1811  
1 à dives sur mer/14 le 13 octobre, 1 le 26 février à Val de Reuil/27 et 1 le 2 mai à Bretteville le Rabet/14. Absence de description, ou ne permettant pas d'exclure avec certitude d'autres espèces plus communes.
5. **Bruant fou** - *Emberiza cia* Linnaeus, 1766  
1 le 16 octobre à Gandelin/61. La description bien trop succincte ne permet pas de confirmer cette espèce très rare en Normandie.

**Espèces occasionnelles signalées en Normandie en 2018, homologuées par le CHN** (Reeber, S. & le CHN, à paraître) :

1. **Oie à bec court** - *Anser brachyrhynchus* Baillon, 1833 : 5 le 5 décembre à Merville Franceville/14 (JP. Marie).
2. **Canard à front blanc** - *Anas americana* J.F. Gmelin, 1789 : 1 du 18 au 28 mars à Dragey-Ronthon/50 (M. Leroux et al.) et 1 le 20 avril à Vains/50 (S. Provost).
3. **Macreuse à front blanc** - *Melanitta perspicillata* (Linnaeus, 1758) : 1 le 17 février à Granville/50 (F. Gallien via S. Provost)
4. **Bécassin à long bec** - *Limnodromus scolopaceus* (Say, 1823) : 1 adulte du 5 au 9 mai à Pontorson/50 (A. Hemon et al.).
5. **Pouillot brun** - *Phylloscopus fuscatus* (Linnaeus, 1758) : 1 le 16 octobre à Carolles/50 (S. Provost et al.).



Pouillot Brun (Carolles) - Sébastien Provost

### Données de 2017 homologuées par le CHN : (Reeber, S. & le CHN, 2017)

1. **Oie à bec court** - *Anser brachyrhynchus* Baillon, 1833 : Manche – Saint-Pair-Sur-Mer, 1 indiv., phot., du 13 novembre au 28 décembre (M. Leroux).
2. **Bécasseau à cou roux** - *Calidris ruficollis* (Pallas, 1776) : Manche – Dragey-Rothon/Genêts, 1 indiv., phot., le 6 et 7 août (S. Provost et al.)
3. **Bécassine double** - *Gallinago media* (Latham, 1787) : Calvados - Saint-Arnoult, 1A capt., phot., le 28 août (D. Vigour et al.).
4. **Sterne élégante** - *Thalasseus elegans* (Gambel, 1849) : Calvados - Merville-Franceville-Plage, 1Mâle +1A, phot., le 25 juillet (W. Duvernoy).
5. **Sterne royale** - *Thalasseus maxima* Boddaert, 1783 : Manche – Saint-Pair-sur-Mer/Genêts, 2A ssp maxima, phot., même oiseau que les Côtes-d’Armor, du 10 au 17 juillet (X. Corteel, S. Provost, A. Tremion et al).
6. **Pie-grièche isabelle** - *Lanius isabellinus* Hemprich & Ehrenberg, 1833 : Calvados - Merville-Franceville-Plage, 1A ssp isabellinus, phot., 5 septembre (JA. Lenègre via J. Jean-Baptiste).
7. **Rousserolle isabelle** - *Acrocephalus agricola* (Jerdon, 1845) : Seine-Maritime – Sandouville, 1A, capt., phot., 5 septembre (Y. Jacob et al.).
8. **Linotte à bec jaune** - *Carduelis flavirostris* (Linnaeus, 1758) : Manche – Vrasville/mer, 1 au Marais de Vrasville, phot., du 24 décembre 2016 au 11 février 2017 (A. Verneau, A. Guérard, JP Marie et al).
9. **Bernache à cou roux** - *Branta ruficollis* (Pallas, 1769) : Manche – Querqueville, +2A phot., individu bague couleur, du 21 mars au 4 avril (S. Cestey) – ORIGINE CAPTIVE.



*Bécasseau à cou roux (Dragey-Rothon/Genêts) - Sébastien Provost*

**Remerciements** : Les membres du CHR Normandie remercient vivement tous les ornithologues qui transmettent leurs fiches descriptives et photographies, permettant ainsi d’assurer une « traçabilité » des observations d’oiseaux rares en Normandie. Merci également au bureau du GONm de nous avoir accueillis au siège régional de Caen pour la réunion annuelle.

**Comité d’Homologation Régional de Normandie (GONm) : oiseaux rares**  
[chr.normandie@gmail.com](mailto:chr.normandie@gmail.com)

## LISTE DES ESPECES SOUMISES A HOMOLOGATION EN NORMANDIE (GONm)

D'après la « Liste officielle des Oiseaux de France », édition 2018 (catégories A, B &amp; C) - Commission de l'Avifaune Française (CAF) &amp; la liste officielle du CHR

Notez que toutes les autres espèces plus rares ne figurant pas encore sur la liste des oiseaux de Normandie sont aussi à soumettre au CHR

N°	Nom vernaculaire	Nom scientifique	Descripteur	Anciens noms	Catégories de la CAF	Statut CHN	Commentaire
1	Cygne de Bewick	<i>Cygnus columbianus</i>	(Ord, 1815)		A		
2	Cygne chanteur	<i>Cygnus cygnus</i>	(Linnaeus, 1758)	Cygne sauvage	A		
3	Oie des moissons	<i>Anser fabalis</i>	(Latham, 1787)		A		
4	Oie de la taïga	<i>Anser fabalis fabalis</i>	(Latham, 1787)	Oie de taïga			
5	Oie de la toundra	<i>Anser fabalis rossicus</i>	Buturlin, 1933	Oie de toundra		CHN	
6	<b>Oie à bec court</b>	<b><i>Anser brachyrhynchus</i></b>	<b>Baillon, 1833</b>		<b>A</b>	<b>CHN</b>	
7	Oie rieuse du Groenland	<i>Anser albifrons flavirostris</i>	Dalgety & Scott, 1948			CHN	
8	<b>Oie naine</b>	<b><i>Anser erythropus</i></b>	<b>(Linnaeus, 1758)</b>		<b>A</b>	<b>CHN</b>	
9	<b>Oie des neiges</b>	<b><i>Anser caerulescens</i></b>	<b>(Linnaeus, 1758)</b>	<b>Oie blanche</b>	<b>BD</b>	<b>CHN</b>	
10	Bernache cravant du Pacifique	<i>Branta bernicla nigricans</i>	(Lawrence, 1846)	Bernache du Pacifique			
11	<b>Bernache à cou roux</b>	<b><i>Branta ruficollis</i></b>	<b>(Pallas, 1769)</b>		<b>A</b>	<b>CHN</b>	
12	<b>Canard à front blanc</b>	<b><i>Anas americana</i></b>	<b>J.F. Gmelin, 1789</b>	<b>Canard d'Amérique</b>	<b>A</b>	<b>CHN</b>	
13	<b>Sarcelle élégante</b>	<b><i>Anas formosa</i></b>	<b>Georgi, 1775</b>		<b>BD</b>	<b>CHN</b>	
14	<b>Sarcelle à ailes vertes</b>	<b><i>Anas carolinensis</i></b>	<b>J.F. Gmelin, 1789</b>	<b>Sarcelle de la Caroline</b>	<b>A</b>	<b>CHN</b>	
15	<b>Sarcelle à ailes bleues</b>	<b><i>Anas discors</i></b>	<b>Linné, 1766</b>		<b>A</b>	<b>CHN</b>	
16	<b>Sarcelle marbrée</b>	<b><i>Marmaronetta angustirostris</i></b>	<b>(Ménétries, 1832)</b>		<b>A</b>	<b>CHN</b>	
17	Fuligule à bec cerclé	<i>Aythya collaris</i>	(Donovan, 1809)		A		
18	Fuligule nyroca	<i>Aythya nyroca</i>	(Güldenstädt, 1770)		A		
19	<b>Fuligule à tête noire</b>	<b><i>Aythya affinis</i></b>	<b>(Eyton, 1838)</b>	<b>Petit fuligule</b>	<b>A</b>	<b>CHN</b>	
20	<b>Eider à tête grise</b>	<b><i>Somateria spectabilis</i></b>	<b>(Linnaeus, 1758)</b>		<b>A</b>	<b>CHN</b>	
21	Harelde boréale	<i>Clangula hyemalis</i>	(Linnaeus, 1758)	Harelde de Miquelon, Harelde kakawi	A		
22	<b>Macreuse à bec jaune</b>	<b><i>Melanitta americana</i></b>	<b>(Swainson, 1832)</b>	<b>Macreuse d'Amérique</b>	<b>A</b>	<b>CHN</b>	
23	<b>Macreuse à front blanc</b>	<b><i>Melanitta perspicillata</i></b>	<b>(Linnaeus, 1758)</b>	<b>Macreuse à lunette</b>	<b>A</b>	<b>CHN</b>	
24	<b>Garrot d'islande</b>	<b><i>Bucephala islandica</i></b>	<b>(J.F. Gmelin, 1789)</b>		<b>A</b>	<b>CHN</b>	
25	Erismature rousse	<i>Oxyura jamaicensis</i>	(J.F. Gmelin, 1789)		A		
26	<b>Erismature à tête blanche</b>	<b><i>Oxyura leucocephala</i></b>	<b>(Scopoli, 1769)</b>		<b>A</b>	<b>CHN</b>	
27	<b>Plongeon à bec blanc</b>	<b><i>Gavia adamsii</i></b>	<b>(Gray, 1859)</b>		<b>A</b>	<b>CHN</b>	
28	<b>Albatros à sourcils noirs</b>	<b><i>Thalassarche melanophris</i></b>	<b>Temminck, 1828</b>		<b>A</b>	<b>CHN</b>	
29	Puffin cendré	<i>Calonectris borealis</i>	(Cory, 1881)		A		
30	Puffin majeur	<i>Puffinus gravis</i>	(O'Reilly, 1818)		A		
31	<b>Puffin de macaronésie</b>	<b><i>Puffinus baroli</i></b>	<b>(Bonaparte, 1857)</b>		<b>A</b>	<b>CHN</b>	
32	Océanite culblanc	<i>Oceanodroma leucorhoa</i>	(Vieillot, 1818)	Pétrel tempête à culblanc, Pétrel culblanc	A		
33	<b>Cormoran pygmée</b>	<b><i>Phalacrocorax pygmaeus</i></b>	<b>(Pallas, 1773)</b>		<b>A</b>	<b>CHN</b>	
34	<b>Pélican blanc</b>	<b><i>Pelecanus onocrotalus</i></b>	<b>Linnaeus, 1758</b>		<b>A</b>	<b>CHN</b>	
35	Blongios nain	<i>Ixobrychus minutus</i>	(Linnaeus, 1766)		A		
36	Crabier chevelu	<i>Ardeola ralloides</i>	(Scopoli, 1769)	Héron crabier	A		
37	<b>Aigrette des récifs</b>	<b><i>Egretta gularis</i></b>	<b>(Bosc, 1792)</b>		<b>A</b>	<b>CHN</b>	
38	Ibis falcinelle	<i>Plegadis falcinellus</i>	(Linnaeus, 1766)		A		
39	Flamant rose	<i>Phoenicopterus roseus</i>	Pallas, 1811		A		
40	<b>Grèbe à bec bigarré</b>	<b><i>Podilymbus podiceps</i></b>	<b>(Linnaeus, 1758)</b>		<b>A</b>	<b>CHN</b>	
41	Elanion blanc	<i>Elanus caeruleus</i>	(Desfontaines, 1789)	Elanion blanc	A		
42	Pygargue à queue blanche	<i>Haliaeetus albicilla</i>	(Linnaeus, 1758)		A		
43	Gypaète barbu	<i>Gypaetus barbatus</i>	(Linnaeus, 1758)		C		
44	Vautour fauve	<i>Gyps fulvus</i>	(Habliz, 1783)		A		14
45	Vautour moine	<i>Aegypius monachus</i>	(Linnaeus, 1766)		A		
46	Circaète Jean-le-Blanc	<i>Circaetus gallicus</i>	(J.F. Gmelin, 1788)		A		

47	Busard pâle	<i>Circus macrourus</i>	(S.G. Gmelin, 1770)		A		
48	<b>Buse féroce</b>	<b><i>Buteo rufinus</i></b>	<b>(Cretzschmar, 1829)</b>		<b>A</b>	<b>CHN</b>	
49	Buse pattue	<i>Buteo lagopus</i>	(Pontoppidan, 1763)		A		
50	<b>Aigle criard</b>	<b><i>Aquila clanga</i></b>	<b>Pallas, 1811</b>		<b>B</b>	<b>CHN</b>	
51	<b>Aigle pomarin</b>	<b><i>Aquila pomarina</i></b>	<b>C. L. Brehm, 1831</b>		<b>A</b>	<b>CHN</b>	
52	Aigle botté	<i>Aquila pennata</i>	(J.F. Gmelin, 1788)		A		
53	Aigle royal	<i>Aquila chrysaetos</i>	(Linnaeus, 1758)		A		
54	Aigle de Bonelli	<i>Aquila fasciata</i>	(Vieillot, 1822)		B		
55	Marouette poussin	<i>Zapornia parva</i>	(Scopoli, 1769)		A		
56	<b>Marouette de baillon</b>	<b><i>Zapornia pusilla</i></b>	<b>(Pallas, 1776)</b>		<b>A</b>	<b>CHN</b>	
57	Talève sultane	<i>Porphyrio porphyrio</i>	(Linnaeus, 1758)	Poule sultane	AC		
58	<b>Grue demoiselle</b>	<b><i>Grus virgo</i></b>	<b>(Linnaeus, 1758)</b>		<b>A</b>	<b>CHN</b>	
59	Outarde canepetière	<i>Tetrax tetrax</i>	(Linnaeus, 1758)		A		
60	Outarde barbue	<i>Otis tarda</i>	Linné, 1758		AE		E pour la Normandie ? (pas de données valides au CHN)
61	Guignard d'Eurasie	<i>Charadrius morinellus</i>	Linnaeus, 1758	Pluvier guignard	A		
62	<b>Gravelot kildir</b>	<b><i>Charadrius vociferus</i></b>	<b>Linnaeus, 1758</b>	Pluvier kildir	<b>A</b>	<b>CHN</b>	
63	<b>Vanneau sociable</b>	<b><i>Vanellus gregarius</i></b>	<b>(Pallas, 1771)</b>		<b>A</b>	<b>CHN</b>	
64	<b>Gravelot mongol</b>	<b><i>Charadrius mongolus</i></b>	<b>(Pallas, 1776)</b>	Pluvier mongol	<b>A</b>	<b>CHN</b>	
65	<b>Bécasseau falcinelle</b>	<b><i>Calidris falcinellus</i></b>	<b>(Pontoppidan, 1763)</b>		<b>A</b>	<b>CHN</b>	
66	<b>Bécasseau à cou roux</b>	<b><i>Calidris ruficollis</i></b>	<b>(Pallas, 1776)</b>	Bécasseau à col roux	<b>A</b>	<b>CHN</b>	
67	Bécasseau de Temminck	<i>Calidris temminckii</i>	(Leisler, 1812)		A		
68	<b>Bécasseau de Baird</b>	<b><i>Calidris bairdii</i></b>	<b>(Coes, 1861)</b>		<b>A</b>	<b>CHN</b>	
69	<b>Bécasseau de Bonaparte</b>	<b><i>Calidris fuscicollis</i></b>	<b>(Vieillot, 1819)</b>		<b>A</b>	<b>CHN</b>	
70	<b>Bécasseau rousset</b>	<b><i>Calidris subruficollis</i></b>	<b>(Vieillot, 1819)</b>		<b>A</b>	<b>CHN</b>	
71	Bécasseau tacheté	<i>Calidris melanotos</i>	(Vieillot, 1819)		A		
72	<b>Bécasseau semipalmé</b>	<b><i>Calidris pusilla</i></b>	<b>(Linné, 1766)</b>		<b>A</b>	<b>CHN</b>	
73	<b>Phalarope de Wilson</b>	<b><i>Phalaropus tricolor</i></b>	<b>(Vieillot, 1819)</b>		<b>A</b>	<b>CHN</b>	
74	Phalarope à bec étroit	<i>Phalaropus lobatus</i>	(Linnaeus, 1758)		A		
75	Phalarope à bec large	<i>Phalaropus fulicarius</i>	(Linnaeus, 1758)		A		
76	<b>Chevalier bargette</b>	<b><i>Xenus cinereus</i></b>	<b>(Guldenstädt, 1775)</b>	Bargette de Terek	<b>A</b>	<b>CHN</b>	
77	<b>Chevalier grivelé</b>	<b><i>Actitis macularius</i></b>	<b>(Linnaeus, 1766)</b>		<b>A</b>	<b>CHN</b>	
78	<b>Chevalier criard</b>	<b><i>Tringa melanoleuca</i></b>	<b>(J.F. Gmelin, 1789)</b>	Grand chevalier	<b>A</b>	<b>CHN</b>	
79	<b>Chevalier à pattes jaunes</b>	<b><i>Tringa flavipes</i></b>	<b>(J.F. Gmelin, 1789)</b>	Petit chevalier	<b>A</b>	<b>CHN</b>	
80	Chevalier stagnatile	<i>Tringa stagnatilis</i>	(Bechstein, 1803)		A		
81	<b>Bécassin à long bec</b>	<b><i>Limnodromus scolopaceus</i></b>	<b>(Say, 1823)</b>		<b>A</b>	<b>CHN</b>	
82	<b>Bécassine double</b>	<b><i>Gallinago media</i></b>	<b>(Latham, 1787)</b>		<b>A</b>	<b>CHN</b>	
83	Glaréole à collier	<i>Glareola pratincola</i>	(Linnaeus, 1766)		A		
84	<b>Courvite Isabelle</b>	<b><i>Cursorius cursor</i></b>	<b>(Latham, 1787)</b>		<b>A</b>	<b>CHN</b>	
85	Labbe à longue queue	<i>Stercorarius longicaudus</i>	Vieillot, 1819		A		
86	Macareux moine	<i>Fratercula arctica</i>	(Linnaeus, 1758)		A		
87	<b>Guillemot à miroir</b>	<b><i>Cepphus grylle</i></b>	<b>(Linnaeus, 1758)</b>		<b>A</b>	<b>CHN</b>	
88	Mergule nain	<i>Alle alle</i>	(Linnaeus, 1758)		A		
89	<b>Sterne fuligineuse</b>	<b><i>Onychoprion fuscatus</i></b>	<b>(Linnaeus, 1766)</b>		<b>A</b>	<b>CHN</b>	
90	Sterne hansel	<i>Gelochelidon nilotica</i>	(J.F. Gmelin, 1789)		A		
91	Sterne caspienne	<i>Hydroprogne caspia</i>	(Pallas, 1770)		A		
92	Guifette moustac	<i>Chlidonias hybrida</i>	(Pallas, 1811)		A		
93	Guifette leucoptère	<i>Chlidonias leucopterus</i>	(Temminck, 1815)		A		
94	<b>Sterne élégante</b>	<b><i>Thalasseus elegans</i></b>	<b>(Gambel, 1849)</b>		<b>A</b>	<b>CHN</b>	
95	<b>Sterne royale</b>	<b><i>Thalasseus maxima</i></b>	<b>Boddaert, 1783</b>		<b>A</b>	<b>CHN</b>	
96	<b>Sterne voyageuse</b>	<b><i>Sterna bengalensis</i></b>	<b>Lesson, 1831</b>		<b>A</b>	<b>CHN</b>	

97	Sterne de Forster	<i>Sterna forsteri</i>	Nuttall, 1834		A	CHN	
98	Sterne de Dougall	<i>Sterna dougallii</i>	Montagu, 1813		A		
99	Mouette blanche	<i>Pagophila eburnea</i>	(Phipps, 1774)	Mouette ivoire , goéland sénateur	A	CHN	
100	Mouette atricille	<i>Larus atricilla</i>	Linnaeus, 1758		A	CHN	
101	Mouette de Franklin	<i>Larus pipixcan</i>	Wagler, 1831		A	CHN	
102	Goéland d'Audouin	<i>Larus audouinii</i>	Payraudeau, 1826		A		
103	Goéland à bec cerclé	<i>Larus delawarensis</i>	Ord, 1815		A		
104	Goéland pontique	<i>Larus cachinnans</i>	Pallas, 1811		A		
105	Goéland à ailes blanches	<i>Larus glaucooides</i>	Meyer, 1822	Goéland arctique	A		
106	Goéland bourgmestre	<i>Larus hyperboreus</i>	Gunnerus, 1767		A		
107	Syrhapte paradoxal	<i>Syrhaptus paradoxus</i>	(Pallas, 1773)		A	CHN	Donnée du 14 mai 1888 à Alençon
108	Coucou geai	<i>Clamator glandarius</i>	(Linnaeus, 1758)		A		
109	Coulicou à bec jaune	<i>Coccyzus americanus</i>	(Linnaeus, 1758)		A	CHN	
110	Petit-duc scops	<i>Otus scops</i>	(Linnaeus, 1758)	Hibou petit-duc	A		
111	Harfang des neiges	<i>Bubo scandiacus</i>	(Linnaeus, 1758)		A	CHN	
112	Grand-Duc d'Europe	<i>Bubo bubo</i>	(Linnaeus, 1758)	Hibou grand-duc	A		
113	Chouette de Tengmalm	<i>Aegolius funereus</i>	(Linné, 1758)		BD		
114	Martinet pâle	<i>Apus pallidus</i>	(Shelley, 1870)		A		
115	Martinet à ventre blanc	<i>Apus melba</i>	(Linnaeus, 1758)	Martinet alpin	A		
116	Rollier d'Europe	<i>Coracias garrulus</i>	Linnaeus, 1758		A		
117	Pic cendré	<i>Picus canus</i>	J. F. Gmelin, 1788		A		
118	Faucon crécerellette	<i>Falco naumanni</i>	Fleischer, 1818		B		
119	Faucon kobez	<i>Falco vespertinus</i>	Linnaeus, 1766		A		
120	Pie-grièche isabelle	<i>Lanius isabellinus</i>	Hemprich & Ehrenberg, 1833		A	CHN	
121	Pie-grièche à poitrine rose	<i>Lanius minor</i>	J.F. Gmelin, 1788		A		
122	Pie-grièche à tête rousse	<i>Lanius senator</i>	Linnaeus, 1758		A		
123	Pie-grièche grise	<i>Lanius excubitor</i>	Linnaeus, 1758		A		
124	Pie-grièche des steppes	<i>Lanius meridionalis pallidirostris</i>	Cassin 1851		A	CHN	
125	Crave à bec rouge	<i>Pyrrhocorax pyrrhocorax</i>	(Linnaeus, 1758)		A		
126	Cassenoix moucheté	<i>Nucifraga caryocatactes</i>	(Linnaeus, 1758)		A		
127	Corneille mantelée	<i>Corvus cornix</i>	Linnaeus, 1758		A		
128	Rémiz penduline (1)	<i>Remiz pendulinus</i>	(Linnaeus, 1758)		A		Sauf les départements de Seine-Maritime (76) et Eure (27) depuis le 1er janvier 2013.
129	Mésange boréale	<i>Poecile montanus</i>	(Conrad von Baldenstein, 1827)		A		
130	Alouette haussecol	<i>Eremophila alpestris</i>	(Linnaeus, 1758)		A		
131	Alouette calandrelle	<i>Calandrella brachydactyla</i>	(Leisler, 1814)		A		
132	Hirondelle de rochers	<i>Ptyonoprogne rupestris</i>	(Scopoli, 1769)		A		
133	Hirondelle rousseline	<i>Cecropis daurica</i>	(Linné, 1771)		A		
134	Mésange à longue queue Nordique (2)	<i>Aegithalos caudatus caudatus</i>	(Linné, 1758)		A		Avec description rigoureuse (et photo si possible) n'incluant pas uniquement la tête
135	Pouillot de Pallas	<i>Phylloscopus proregulus</i>	(Pallas, 1811)		A	CHN	
136	Pouillot à grands sourcils	<i>Phylloscopus inornatus</i>	(Blyth, 1842)		A		
137	Pouillot de Hume	<i>Phylloscopus humei</i>	(Brooks, 1878)		A	CHN	
138	Pouillot brun	<i>Phylloscopus fuscatus</i>	(Blyth, 1842)		A	CHN	
139	Pouillot de Bonelli	<i>Phylloscopus bonelli</i>	(Vieillot, 1819)		A		
140	Pouillot de Sibérie (3)	<i>Phylloscopus collybita tristis</i>	(Vieillot, 1817)	Pouillot véloce de Sibérie			Avec enregistrement du cris et/ou chant
141	Pouillot ibérique	<i>Phylloscopus ibericus</i>	Ticehurst, 1937		A		
142	Fauvette épervière	<i>Sylvia nisoria</i>	(Bechstein, 1795)		A	CHN	
143	Fauvette mélanocéphale	<i>Sylvia melanocephala</i>	(J.F. Gmelin, 1789)		A		
144	Fauvette passerinette	<i>Sylvia cantillans</i>	(Pallas, 1764)		A		
145	Hypolaïs icterine	<i>Hippolaïs icterina</i>	(Vieillot, 1817)		A		
146	Phragmite aquatique (4)	<i>Acrocephalus paludicola</i>	(Vieillot, 1817)		A		Uniquement les données hors capture/baguage

147	Rousserolle des buissons	<i>Acrocephalus dumetorum</i>	Blyth, 1849		A	CHN	
148	Rousserolle isabelle	<i>Acrocephalus agricola</i>	(Jerdon, 1845)		A	CHN	
149	Rousserolle turdoïde	<i>Acrocephalus arundinaceus</i>	(Linnaeus, 1758)		A		
150	Jaseur boréal	<i>Bombycilla garrulus</i>	(Linnaeus, 1758)		A		
151	Tichodrome échelette	<i>Tichodroma muraria</i>	(Linnaeus, 1766)		A		
152	Etourneau unicolore	<i>Sturnus unicolor</i>	Temminck 1820		A		
153	Etourneau roselin	<i>Pastor roseus</i>	(Linnaeus, 1758)		A		
154	Cinle plongeur	<i>Cinclus cinclus</i>	(Linnaeus, 1758)		A		
155	Grive dorée	<i>Zoothera dauma</i>	(Latham, 1790)		A	CHN	
156	Robin à flancs roux	<i>Tarsiger cyanurus</i>	(Pallas, 1773)		A	CHN	
157	Gobemouche nain	<i>Ficedula parva</i>	(Bechstein, 1794)		A		
158	Gobemouche à collier	<i>Ficedula albicollis</i>	(Temminck, 1815)		A		
159	Monticole de roche	<i>Monticola saxatilis</i>	(Linnaeus, 1766)	Merle de roche	A		
160	Tarier de Sibérie	<i>Saxicola maurus</i>	(Pallas, 1773)	Traquet pâtre oriental	A	CHN	
161	Traquet isabelle	<i>Oenanthe isabellina</i>	(Temminck, 1829)		A	CHN	
162	Traquet pie	<i>Oenanthe pleschanka</i>	(Lepechin, 1770)		A	CHN	
163	Traquet oreillard	<i>Oenanthe hispanica</i>	(Linnaeus, 1758)		A		
164	Traquet du désert	<i>Oenanthe deserti</i>	(Temminck, 1825)		A	CHN	
165	Accenteur alpin	<i>Prunella collaris</i>	(Scopoli, 1769)		A		
166	Moineau espagnol	<i>Passer hispaniolensis</i>	(Temminck, 1820)		A	CHN	
167	Moineau friquet (5)	<i>Passer montanus</i>	(Linnaeus, 1758)		A		Sauf colonie de Pontorson
168	Bergeronnette nordique	<i>Motacilla flava thunbergi</i>	Billberg, 1828	Bergeronnette printanière nordique			
169	Bergeronnette d'Italie	<i>Motacilla flava cinereocapilla</i>	Savi, 1831	Bergeronnette printanière d'Italie			
170	Pipit de Richard (6)	<i>Anthus richardi</i>	Viellot, 1818		A		Une fiche globale saisonnière pour les sites de Carolles et du cap de la Hève.
171	Pipit de Godlewski	<i>Anthus godlewskii</i>	Taczanowski, 1876		A	CHN	
172	Pipit rousseline (7)	<i>Anthus campestris</i>	(Linnaeus, 1758)		A		Sauf pour les falaises de Carolles et le cap de la Hève.
173	Pipit à dos olive	<i>Anthus hodgsoni</i>	Richmond, 1907		A	CHN	
174	Pipit à gorge rousse	<i>Anthus cervinus</i>	(Pallas, 1811)		A		
175	Roselin cramoiisi	<i>Erythrura erythrura</i>	(Pallas, 1770)		A	CHN	
176	Roselin githagine	<i>Bucanetes githagineus</i>	(Lichtenstein, 1823)		A	CHN	
177	Linotte à bec jaune	<i>Carduelis flavirostris</i>	(Linnaeus, 1758)		A	CHN	
178	Sizerin flammé	<i>Acanthis flammea</i>	(Linnaeus, 1758)		A		
179	Bec-croisé bifascié	<i>Loxia leucoptera</i>	J. F. Gmelin, 1789		B ?	CHN	
180	Bec-croisé perroquet	<i>Loxia pytyopsittacus</i>	Borkhausen, 1793		B ?	CHN	
181	Bruant à couronne blanche	<i>Zonotrichia leucophrys</i>	(Forster, 1772)		A	CHN	
182	Bruant mélanocéphale	<i>Emberiza melanocephala</i>	Scopoli, 1769		A	CHN	
183	Bruant fou	<i>Emberiza cia</i>	Linnaeus, 1766		A		
184	Bruant ortolan (4)	<i>Emberiza hortulana</i>	Linnaeus, 1758		A		Uniquement les données hors capture/baguage
185	Bruant à calotte blanche	<i>Emberiza leucocephalos</i>	S.G. Gmelin, 1771		A	CHN	
186	Bruant nain	<i>Emberiza pusilla</i>	Pallas, 1776		A	CHN	

**LISTE DES ESPECES SOUMISES A HOMOLOGATION EN NORMANDIE (GONm)**

*D'après la « Liste officielle des Oiseaux de France », édition 2018 (catégories D & E) - Commission de l'Avifaune Française (CAF) & la liste officielle du CHR*

*<https://cdnfiles1.biolovision.net/www.faune-france.org/userfiles/LOFCAF20180829.pdf>*

*[http://www.chn-france.org/upload\\_content/Liste\\_taxons\\_CHN\\_4.pdf](http://www.chn-france.org/upload_content/Liste_taxons_CHN_4.pdf)*

*Notez que toutes les autres espèces plus rares ne figurant pas encore sur la liste des oiseaux de Normandie sont aussi à soumettre au CHR*

N°	Nom vernaculaire	Nom scientifique	Descripteur	Anciens noms	Catégories de la CAF	Statut CHN	Commentaire
1	Bernache de Hutchins	<i>Branta hutchinsii</i>	(Richardson, 1832)		E	CHN	
2	Canard à faucilles	<i>Anas falcata</i>	Georgi, 1775		D	CHN	
3	Damier du Cap	<i>Daption capense</i>	(Linnaeus, 1758)		E	CHN	
4	Flamant nain	<i>Phoenicopus minor</i>	G.R. Gray, 1869		D	CHN	
5	Harle couronné	<i>Lophodytes cucullatus</i>	(Linnaeus, 1758)		E	CHN	
6	Roselin pourpré	<i>Carpodacus purpureus</i>	(Gmelin, 1789)	<i>Haemorhous purpureus</i>	E	CHN	
7	Spatule d'Afrique	<i>Platalea alba</i>	Scopoli, 1786		E	CHN	
8	Martin triste	<i>Acridotheres tristis</i>	(Linnaeus, 1766)		E		

**LISTE DES HYBRIDES & TAXONS AUTRES SOUMIS A HOMOLOGATION EN NORMANDIE**

N°	Nom vernaculaire	Nom scientifique	Descripteur	Anciens noms	Catégories de la CAF	Statut CHN	Commentaire
1	Goéland pontique x argenté	<i>Larus argentatus / cachinnans</i>					
2	Pouillot de type sibérien	<i>Phylloscopus collybita tristis / "fulvescens"</i>					

## Mise à Jour : 22/10/2019

### Ressources

Liste CAF 2018	<a href="https://cdnfiles1.biolovision.net/www.faune-france.org/userfiles/LOFCAF20180829.pdf">https://cdnfiles1.biolovision.net/www.faune-france.org/userfiles/LOFCAF20180829.pdf</a>
Liste des oiseaux soumis au CHN	<a href="http://www.chn-france.org/upload_content/Liste_taxons_CHN_4.pdf">http://www.chn-france.org/upload_content/Liste_taxons_CHN_4.pdf</a>

### Spécificités de la liste

*en gras, les espèces soumises au CHN et en gris les sous-espèces)*

(1) *sauf les départements de Seine-Maritime (76) et Eure (27) depuis le 1er janvier 2013.*

(2) *avec description rigoureuse (et photo si possible) n'incluant pas uniquement la tête*

(3) *avec enregistrement du cris et/ou chant*

(4) *uniquement les données hors capture/baguage*

(5) *sauf colonie de Pontorson*

(6) *une fiche globale saisonnière pour les sites de Carolles et du cap de la Hève.*

(7) *sauf pour les falaises de Carolles et le cap de la Hève.*

### Catégories

**Catégorie A** = Espèces présentes à l'état sauvage en France métropolitaine y compris la frange maritime (Zone Économique Exclusive), observées au moins une fois depuis 1950 et dont l'origine naturelle est considérée comme la plus probable au moins pour un individu.

**Catégorie B** = Espèces observées à l'état sauvage sur la même aire géographique, mais qui n'ont pas été revues depuis 1950.

**Catégorie C** = Espèces introduites ou échappées de captivité en France métropolitaine depuis plusieurs années, qui ont fait souche et dont au moins une population se maintient par reproduction en milieu naturel, indépendamment d'éventuels apports supplémentaires d'origine humaine.

**Catégorie D** = Espèces pour lesquelles il existe au moins une mention dont l'origine naturelle est possible mais cependant pas la plus probable compte tenu des informations disponibles. L'arrivée de ces espèces en France métropolitaine a pu être aidée volontairement par l'Homme ou bien il s'agit d'échappés de captivité.

**Catégorie E** = Espèces supposées d'origine captive, mentionnées dans la littérature comme ayant été vues dans la nature en France métropolitaine.