



OBSERVATOIRES GONm DE L'AVI- FAUNE NORMANDE : NEUVIEME BILAN SYNTHETIQUE ANNEE 2022


GRUPE ORNITHOLOGIQUE NORMAND
ASSOCIATION RECONNUE D'UTILITE PUBLIQUE
Téléphone 02 31 43 52 56
Mail secretariat@gonm.org
Site Internet <http://www.gonm.org>
181 rue d'Auge 14000 Caen

Six observatoires ont été mis en place par le GONm depuis 1967 afin de suivre au mieux l'évolution des populations d'oiseaux de Normandie. Le présent document est le neuvième bilan annuel des observatoires du GONm. Il présente quelques exemples d'informations obtenues par ces observatoires au cours de l'année 2022.

Nos remerciements vont aux observateurs et aux organismes qui nous aident dans notre action d'utilité publique.

Gérard Debout (textes et photos sauf indication contraire)

Observatoire des réserves du GONm



Pour découvrir l'activité de l'observatoire des réserves du GONm, nous vous proposons de découvrir notre revue numérique « Réseau des réserves normandes n°13 » accessible avec le lien suivant : <https://www.gonm.org/index.php?post/653> ; 88 pages pour découvrir un an de fonctionnement des 24 réserves du GONm.

Observatoire des oiseaux marins

G rard Debout



Nombre de participants : plus de 50

2022 a  t  la troisi me ann e de l'enqu te visant   recenser les oiseaux marins nicheurs. L'essentiel du travail de terrain avait  t  conduit en 2020 et 2021, l'ann e 2022 a  t  consacr e   combler les rares trous demeurant dans la couverture du littoral et, surtout,   achever les recensements des go lands nicheurs urbains. 13 esp ces d'oiseaux marins se reproduisent sur les  les ou les falaises du littoral normand ou sur les  tangs ou ballastiaires en milieu continental.

En milieu urbain, quatre esp ces de grands go lands se reproduisent, le plus commun  tant le go land argent . La proportion des go lands argent s nicheurs en milieu urbain par rapport au milieu naturel augmente (premi re figure ci-dessous) sans, pour autant, que l'effectif global normand n'augmente bien au contraire (seconde figure ci-dessous).



Go land argent 




Observatoire des oiseaux d'eau

Bruno Chevalier

Oiseaux d'eau hivernants (WI) janvier 2022

Nombre de participants : plus de 100

Nous avons recens  334 842 oiseaux en janvier 2022



Bernaches – avocettes 2021-2022

Nombre de participants : environ 20


- Bernache nonnette : 99,7 % des effectifs de bernache nonnette recens s lors du pic d'hivernage en novembre 2021 (1 355 oiseaux) stationnaient sur la r serve naturelle de Beauguillot.

- Bernache cravant   ventre p le : la c te ouest de la Manche a accueilli 92 % des effectifs hivernant en France et   Jersey lors du pic d'abondance intervenu en f vrier ; 1 075 individus, contre 1 435 en 2021, soit 2,7 % de la population du haut arctique de l'Est canadien dont l'essentiel hiverne en Irlande.



Bernache   ventre p le (  gauche) et   ventre sombre (  droite).

- Bernache cravant   ventre sombre : la Normandie accueille 3 % de la population pr sente en France en d cembre mais, comme les ann es pr c dentes, elle a jou  un r le plus significatif d s le mois de janvier, retenant jusqu'  41 % des hivernants en avril



Avocette   nuque noire : depuis la cr ation de Port 2000, la Normandie joue d sormais un r le modeste en p riode d'hivernage, 171 oiseaux lors du pic en janvier, soit 0,8 % de l'effectif national.

Limat

Objectif : actualiser les estimations nationales des effectifs de limicoles et d'anatid s nicheurs, ainsi que les quatre esp ces de gr bes et la foulque macroule. Pour cela, trois protocoles ont  t  mis en  uvre :

- une estimation probabiliste portant sur un maillage de 500 m x 500 m de c t  pour les esp ces relativement communes ;
- le recensement exhaustif des esp ces plus rares et les allochtones ;
- le recensement de l' dici ne sur les lieux de rassemblements en septembre/octobre.

Nombre de participants : environ 50

Nombre de donn es : plus de 1 500

R seau limicoles c tiers 2021-2022

Nombre de participants : plus de 50

Le GONm a int gr  l'Observatoire « Littoral, limicoles et macrofaune benthique » en novembre 2008, initi  par RNF, bas  sur le d nombrement mensuel des limicoles c tiers sur les principaux sites estuariens et c tiers fran ais.


Strat gie d'actions : Limicoles nicheurs des hauts de plages 2021 – 2022 Manche Est – Mer du Nord

30 personnes et 2015 lignes de donn es

35 couples de grand gravelot, 267 couples de GCI, 14 couples de petit gravelot, 17 couples de HP (sans Chausey). 191 nids suivis pour un taux d' cllosion   0,39, soit le meilleur depuis 2014.

Etude des courlis cendr s par t l m trie



Courlis cendr  suivis par GPS (encore fonctionnels durant une partie de l'ann e) : 5 adultes  quip s en 2022 (3 de 2021 et 2 nouveaux) ; 5 jeunes (le survivant de 2021) et 4 nouveaux (1 pr dat  rapidement et 3 d'une m me fratrie), partis en migration vers les rivages du Portugal.




Observatoire des oiseaux communs Claire Debout

Tendances

Depuis la parution du Nouvel atlas des oiseaux de Normandie, trois campagnes de l'enqu te Tendances se sont succ d es. Apr s les al as de la Covid 19, un renouveau se fait sentir cette ann e avec 87 observateurs et 174 parcours. Voici six exemples de r sultats pris en hivernage : trois progressions et trois d clins.




Des fluctuations interannuelles n'emp chent pas l'augmentation significative de ce bel oiseau en p riode hivernale, que ce soit en ville ou dans les campagnes. Un certain nombre d'hivernants  trangers vient gonfler les effectifs. L'augmentation de l'indice en hiver (mi-d cembre   mi-janvier) est de 41 % ; elle est statistiquement significative.




Le moineau domestique est une esp ce en fort d clin en p riode de reproduction ; elle montre   l'inverse une augmentation assez remarquable pendant l'hivernage : l'oiseau profite sans doute des ambiances urbaines : pr s des mangeoires, des parcs urbains, des jardins. Il profite peut- tre du d veloppement des cultures « bio » et des zones d' cop turage p riurbaines.

L'augmentation de l'indice est de 50,3 % ; elle est statistiquement significative




Le geai des ch nes, largement r parti sur toute la r gion, est stable en hiver, observable dans toutes les zones de bocage un peu dense mais aussi de plus en plus familier des jardins et des parcs urbains.

L'augmentation de l'indice est de 24,6 % ; elle n'est pas statistiquement significative.




En hiver, cet oiseau est pr sent sur toute la Normandie : des millions d'oiseaux mais dans un contexte de d clin de 30 % en un peu plus de vingt ans. Malgr  tout, le monde agricole le consid re toujours comme un « envahisseur » mais, apr s avoir constat  que les op rations d'effarouchement ou de destruction massive (empoisonnement, dynamitage et tirs) sont vaines et c teuses, il faut plut t convaincre les agriculteurs de se prot ger des oiseaux en diff rant l'heure de mise   disposition de la nourriture, en mettant en place des b ches de protection du front des silos, des effaroucheurs sonores etc.

Le d clin de l'indice en hiver (mi-d cembre   mi-janvier) est de 33 % ; il est statistiquement significatif.



Le bruant jaune est une esp ce en fort d clin comme ailleurs en Europe. Ce d clin a d but  dans les ann es 1950. En hiver, en Normandie, le nombre de cartes occup es a diminu  d'un quart en moins de 20 ans.

Le d clin de l'indice en hiver (mi-d cembre   mi-janvier) est extraordinaire ; il est statistiquement significatif.



En hiver, l'accenteur mouchet est pr sent dans toute la Normandie mais cette vaste r partition n'emp che pas un d clin prononc  de l'indice en hiver (mi-d cembre   mi-janvier) qui baisse de 57 % en 26 ans ; cette baisse est statistiquement significative.

Observatoire des esp ces patrimoniales

G rard Debout

Cigogne blanche

Alain Chartier

En 2022, environ 595 couples ont nich  en Normandie : 290 dans le p rim tre du Parc naturel r gional des Marais du Cotentin et du Bessin, 155 dans les marais de la Dives et le Pays d'Auge et environ 150 dans les vall es de la Seine et de la Risle. L'hivernage a concern  380 individus : 175 dans les marais du Cotentin et du Bessin, 200 dans les marais de la Dives et le Pays d'Auge et 5 dans les vall es de la Seine et de la Risle.

Cigogne noire

Christophe Girard et St phane Lecocq

L'ann e 2022 a  t  marqu e par la d couverte de nouveaux nids, occup s et abandonn s. L'Orne reste le d partement le plus occup  ; trois nids y ont  t  suivis donnant 9 poussins   l'envol. Le Calvados n'est pas en reste avec 6 poussins sur 2 nich es. Des recherches effectu es en Seine-Maritime sont encourageantes et le nombre d'observations d'adultes est prometteur. La Manche est  galement bien pourvue en observations, mais le myst re persiste. Quant au d partement de l'Eure, si l'esp ce est observ e, une recherche plus approfondie permettrait de confirmer la probabilit  d'une nidification. Nous tenons   remercier les b n voles du GONm, de la LPO Normandie ainsi que les agents de l'ONF qui se sont investis dans cette qu te ainsi que ceux qui nous font remonter ces informations.

Dortoir de busards

S bastien Crase

L'enqu te sur les dortoirs de busard des roseaux, des busard Saint Martin et des faucon  merillon a eu lieu en d cembre 2021 ainsi que pendant le comptage Wetlands de janvier 2022. Le but  tait de se mettre dans des lieux avec un potentiel pour avoir des dortoirs de ces trois esp ces. Le comptage a mobilis  35 personnes (salari s, b n voles, les salari s du Parc du Cotentin et les amis des marais de la Dives) sur toute la Normandie. Pendant la dur e du comptage, pour chaque esp ce, voici les observations faites. Au minimum 58 busards Saint Martin. Au minimum 137 busards des roseaux, 7 faucons  merillons. Les r gions ayant le plus de busards observ s sont dans les marais du Cotentin et l'estuaire de Seine. Les faucons  merillons ont  t  observ s dans l'estuaire de Seine, les marais du Cotentin et en Baie du Mont-Saint-Michel.



Oiseaux nicheurs des landes

Jocelyn Desmares

22 personnes sur 17 sites (1/61, 3/14, 13/50) ; 1 088 donn es, dont 32 de fauvette pitchou, 69 % des donn es proviennent de la Hague. Esp ce discr te, la fauvette pitchou ne semble pas avoir reconstitu  ses effectifs des ann es 2000. Une  tude plus approfondie permettra sans doute de mieux appr hender les effectifs nicheurs actuels.




Observatoire des ZPS de Normandie G rard Debout

Nous vous proposons, pour commencer, un zoom sur le cormoran hupp  des  les Saint-Marcouf puisque, pour certains, la protection de l' le du Large serait inutile.

Un d calage dans la reproduction d'une partie des oiseaux cantonn s   l' le du Large, peut- tre li  au report d'oiseaux issus de l' le de Terre vers l' le du Large, a conduit de nombreux adultes   encore couvrir (ponte ou jeunes poussins) le 4 juillet, nids vou s   l' chec avec les chantiers d butant le 1^{er} ao t. Des pontes  taient encore actives sur les deux  les mi-juin indiquant des envols possibles fin ao t-d but septembre en cas de r ussite.

Cette ann e 2022, il y avait au moins 570 couples nicheurs dans l'archipel r partis  galement sur les deux  les.

Encore une fois, cela confirme que les deux  les sont compl mentaires et fonctionnent ensemble.



 volution du nombre de couples nicheurs de cormoran hupp  sur les deux  les Saint-Marcouf

Nous poursuivons par un bilan de la reproduction de la mouette tridactyle dans le Bessin.

Les effectifs nicheurs continuent   baisser m me si un ralentissement est observ  sur le seul site de nidification qui demeure,   savoir l'ancienne r serve du GONm   Saint-Pierre-du-Mont. Fait rassurant, la production est bonne avec   0,75 jeune par couple, m me si, seul le noyau de la colonie a  t  productif, les deux derniers sous-secteurs  loign s de ce noyau ont  chou . Les trois derni res saisons ont connu une nette progression de l'indicateur et une moyenne de 0,72 jeune/couple.

