



LES QUATRE OBSERVATOIRES GONm DE L'AVIFAUNE NORMANDE : DIXIEME BILAN SYNTHETIQUE ANNEE 2023

GROUPE ORNITHOLOGIQUE NORMAND
ASSOCIATION RECONNUE D'UTILITE PUBLIQUE
Téléphone 02 31 43 52 56
Mail secretariat@gonm.org
Site Internet <http://www.gonm.org>
181 rue d'Auge 14000 Caen

Six observatoires ont été mis en place par le GONm depuis 1967 afin de suivre au mieux l'évolution des populations d'oiseaux de Normandie : quatre d'entre eux sont directement destinés aux suivis de l'avifaune.

Deux autres sont destinés aux suivis de sites : l'observatoire des réserves du GONm dont le bilan est présenté dans « Réseau des réserves normandes », consultable en ligne (<https://www.gonm.org/index.php?post/706>) et l'observatoire des ZPS qui fait l'objet d'un rapport interne.

Le présent document est le dixième bilan annuel des observatoires du GONm. Il présente quelques exemples d'informations obtenues par ces observatoires au cours de l'année 2023.

Nos remerciements vont aux observateurs et aux organismes qui nous aident dans notre action d'utilité publique.

Gérard Debout (textes et photos sauf indication contraire)

Enquêtes permanentes

- Tendances : suivi des oiseaux communs
- Oiseaux échoués : suivi des oiseaux échoués fin février (débuté en 1972)
- WI : recensement international des oiseaux d'eau en janvier
- Bernaches, avocettes : suivi mensuel de septembre à avril
- Suivi nicheurs rares ou patrimoniaux




Enquêtes 2023 dans le cadre du septième programme d'enquêtes du GONm 2020-2025

- Grèbes-plongeurs en mer
- Colonies d'hirondelles de rivage
- Limicoles nicheurs côtiers
- Dortoirs de cormorans
- Dortoirs de laridés



Photographie : Luc Loison



Observatoire des oiseaux marins

G rard Debout

Apr s le travail de terrain essentiellement conduit en 2020 et 2021 et, pour certains sites, encore en 2022, 2023 a  t  consacr e au nettoyage de la base de donn es oiseaux marins du GONm et   la synth se des r sultats qui a fait l'objet de deux articles : un consacr  aux go lands nicheurs urbains paru dans la revue nationale Alauda et un autre   para tre dans une des deux revues scientifiques du GONm, le Cormoran.

13 esp ces d'oiseaux marins se reproduisent sur les  les ou les falaises du littoral normand, sur les  tangs ou ballast res en milieu continental ou en milieu urbain.

Les populations nicheuses normandes ont des effectifs tr s diff rents et connaissent des  volutions vari es :

- Avec 17 500 couples, la plus commune demeure le go land argent , malgr  un d clin important de 20,6 % depuis 1998. Ce d clin est particuli rement sensible sur les colonies les plus anciennes qui comptaient autrefois le plus de couples : Chausey, Saint-Marcouf, Cap Fagnet.
- La plus rare est le go land leucoph e : 7 couples nicheurs. C'est un nicheur assez r cent d'origine m diterran enne surtout pr sent en milieu urbain en Normandie.



Go land leucoph e

- Le grand cormoran est globalement stable   environ 2 000 couples, m me si des signes de d clin commencent   se manifester   Chausey, sur les falaises cauchoises et   la Grande No .
- Le go land marin compte plus de 1700 couples, mais une baisse s'amorce par rapport   2010 sur les principales colonies.
- La mouette m lanoc phale fluctue autour de 400   500 couples ; elle ne niche en 2023 qu'  la r serve de la Grande No .
- Deux esp ces de sternes sont des nicheurs irr guliers : la sterne de Dougall et la sterne caugek (toutes deux ne nichant qu'  la r serve GONm de Chausey).
- Trois esp ces se portent bien et sont en augmentation : le cormoran hupp  avec presque 1 700 couples repr sente presque 2 % de l'effectif nicheur mondial de la sous-esp ce : c'est dire la reponsabilit  r gionale qu'  la r gion par rapport   cette esp ce.
- La mouette rieuse atteint un effectif record avec plus de 1000 couples.
- De m me, la sterne pierregarin avec plus de 200 couples.



Cormoran hupp 

- Enfin, trois esp ces connaissent des d clins catastrophiques :
- Le go land brun : 430 couples, soit une baisse de 59 % par rapport   l'effectif maximal connu de 2010.
- Le fulmar glacial : 311 sites, mais une baisse de 59 % par rapport   l'effectif maximal connu de 1988.
- La mouette tridactyle qui compte un peu plus de 1200 couples, effectif en baisse de 62 % par rapport au maximum de 1998.



Go land brun


Observatoire des oiseaux d'eau

Bruno Chevalier


Oiseaux d'eau hivernants (WI) janvier 2023

Nombre de participants : plus de 100

Nous avons recens  380 560 oiseaux en janvier 2023



Nombre d'oiseaux par site  l mentaire en janvier 2023




R partition par site fonctionnel des plongeurs et gr bes en janvier 2023

Les tendances observ es au cours de la p riode 1994-2023 pour les deux groupes les mieux document s, anatid s et foulques d'une part, et limicoles d'autre part, sont de l'ordre de +1,6 % par an pour les premiers, alors que les seconds pr sentent des effectifs jug s stables. Bien s r, ceci recouvre des r alit s sp cifiques diverses : le b casseau sanderling (bon  tat de conservation des populations

du N.O de l'Atlantique) ou le canard souchet (d placement d'aire d'hivernage) ont nettement progress , alors que l'avocette  l gante (perte d'habitat/Port 2000) ou le fuligule milouin (mauvais  tat de conservation   l' chelle de l'Europe) enregistrent un d clin mod r .

Bernaches – avocettes 2022-2023

Bernache cravant   ventre sombre




 volution des effectifs de bernache cravant   ventre sombre recens s en janvier en Normandie (2007-2023)

Bernache cravant   ventre p le

Bernache � ventre p�le	Sept	Oct	Nov	D�c	Janv	F�vr	Mars	Avr
France	1	28	345	604	709	939	1040	605
Normandie	1	24	315	545	642	890	943	605
% Normandie/France	0	86	91	90	91	95	91	100

Avocette  l gante



 volution des effectifs d'avocette  l gante recens s en janvier en Normandie (2007-2023)

Observatoire des oiseaux communs

Claire Debout

Tendances : résultats de la campagne 2022-2023

Depuis la parution du Nouvel atlas des oiseaux de Normandie, quatre campagnes de l'enquête Tendances se sont succédé. Après les aléas de la Covid 19, les participations à l'enquête restent chancelantes mais, malgré tout, un léger sursaut se fait sentir avec une dizaine de parcours supplémentaires ; malheureusement, le nombre de participants n'augmente pas :

Campagne	Nombre de parcours	Nombre d'observateurs
2019-20	165	84
2020-21	164	87
2021-22	174	87
2022-2023	170	87

La répartition départementale des nombres de parcours et d'observateurs est la suivante :

Départements	14	27	50	61	76	Total
N parcours	53	22	51	16	28	170
N observateurs	27	7	27	9	17	87

A la fin de la campagne 2022-2023, le nombre **total** de lignes par session est le suivant :

Session	P1	P2	P3	P4	P5	P6	Total
N données	58689	61978	61835	68216	78707	74101	403 526

Pour la 27^{ème} année de l'enquête, 403 526 données constituent donc le fichier concernant les oiseaux communs de Normandie. Les deux sessions d'avril jusqu'à juillet sont les plus riches ; la session hivernale de décembre à janvier est moins riche mais un biais peut être suspecté relatif à la météo et à l'assiduité des observateurs à cette période. Le record faible de la session à la sortie de l'été, août - septembre, peut être lié à une période de discrétion des oiseaux, moins faciles à contacter.

Environ 45 espèces d'oiseaux communs sont analysées chaque année. Cette enquête qualitative basée sur la présence / absence des oiseaux tout au long de l'année permet de définir les tendances évolutives des populations sur le long terme. C'est ainsi que nous pouvons détecter des populations en croissance (choucas des tours, pigeon ramier) ou des espèces nicheuses en déclin comme le bruant jaune, ou le moineau domestique. Ci-dessous sont présentés quelques résultats de la période de reproduction actualisés à la dernière campagne 2022-2023 ; nous avons choisi trois espèces avec une croissance significative, trois avec un déclin significatif et trois autres stables.

Fauvette à tête noire




La population a augmenté de 26,5 % ; augmentation significative.

Pic vert

La population a augmenté de 76,9 % ; augmentation significative.

Choucas des tours

La population a augmenté de 180,6 % ; augmentation significative.



Bruant jaune




D croissance continue et significative : -75,4 %

Verdier d'Europe

D croissance continue et significative : -42,5 %


Moineau domestique

D croissance continue et significative : -24,9 %




Enfin, trois esp ces dont les populations ne varient pas sur le long terme :


Pinson des arbres



Rougegorge familier



Pie bavarde



Pour la p riode hivernale, trois esp ces avec des variations diff rentes :

Pigeon ramier




La population a augment  de 44,6 % ; augmentation significative.

Accenteur mouchet

D croissance continue et significative :
-54,1 %

Rougegorge familier

Aucune variation (+0,1 %)




Observatoire des esp ces patrimoniales

G rard Debout

Grand corbeau

R gis Purenne



Grand corbeau : nombre maximum de couples nicheurs

Sur 195 nids suivis entre 2005 et 2023 : 80 % ont connu un succ s ; au total, 43 jeunes   l'envol. La production moyenne de 2,3 jeunes/couple, est bonne



Rapaces : deux nouvelles esp ces nicheuses et une troisi me qui confirme son implantation

G rard Debout

L'ann e 2023 a  t  marqu e par la d couverte de nouveaux couples de **hibou grand-duc** sur les falaises cauchoises.

La premi re observation (cadavre) remonte   2015.

La premi re nidification a  t  d couverte en 2021.

En 2023, quatre sites au moins sont occup s.

Toujours en Seine-Maritime, mais dans le Pays de Bray, la premi re nidification normande du **milan royal** a  t  prouv e avec la d couverte d'un nid contenant trois poussins.



Enfin, l'** lanion blanc** (ou blac) fait une arriv e en fanfare en Normandie ! apr s une premi re tentative de reproduction en 1994 au Marais Vernier, puis des observations d'oiseaux stationnant plus ou moins longuement, parfois en couple mais sans indices probants de nidification. Tout a chang  en 2023 avec peut- tre une douzaine de couples nicheurs dans les cinq d partements normands. L'installation de cette esp ce d'origine tropicale (qui a conserv  des traits de vie typiquement tropicaux comme la possibilit  de se reproduire   l' ge de quelques mois, et l'absence de saisonnalit  de la reproduction), est un indice suppl mentaire, s'il en fallait un, des effets du r chauffement climatique.

