


Bernaches et avocettes hivernant en Normandie : 2024-2025 (49^{ème} et 32^{ème} édition)

Bernache cravant à ventre sombre

L'hivernage en France a culminé en décembre 2024 avec 110 003 oiseaux recensés, contre 113 228 en décembre 2023. A cette date, la France accueillait 51 % de la population biogéographique (215 000 ind.), mais les valeurs observées étaient en recul de 14 % par rapport à la moyenne des dix dernières années.

Les principaux sites, situés entre le Bassin d'Arcachon et le Golfe du Morbihan, ont accueilli classiquement 74 % de la population présente lors du pic d'hivernage (*Carte 1*). Des déplacements vers le nord sont observés dès le début du mois de décembre, 58 % des oiseaux hivernant dans le bassin d'Arcachon avaient quitté ce site à cette date.



Carte 1 : Répartition de la bernache cravant en France (2024-2025)

Les bernaches à ventre sombre hivernant dans les baies et estuaires du littoral métropolitain s'alimentent majoritairement sur les herbiers de zostère (façade atlantique),

mais également, selon les localités et/ou l'état des herbiers, sur les champs d'algues vertes et les prés-salés. Par ailleurs, la fréquentation du milieu terrestre adjacent au littoral (prairies naturelles ou artificielles, céréales d'hiver) retient des effectifs extrêmement réduits.

Le succès de reproduction en 2024 est de 1 % (**Figure 1**), contre 7 % en moyenne au cours de la dernière décennie, ce qui est à l'évidence insuffisant pour maintenir cette population qui a décliné de 34 % en 30 ans (Bilan 2020-2021, S. Dalloyau).

La Normandie accueillait 6 % de la population hivernant en France lors du pic d'abondance, mais comme les années précédentes, elle a joué un rôle plus significatif dès le mois de janvier, retenant jusque 14 % des hivernants en mars, le temps d'une halte ou d'un séjour prolongé (**Tableau 1**). Les effectifs observés en janvier dernier sont de 12 % supérieurs à la moyenne de ces dix-neuf dernières années (9 013), et nous enregistrons une forte croissance de 5 % ± 0,1 % par an au cours de cette même période.

| Mois | Sept. | Oct | Nov | Déc | Janv | Févr | Mars | Avr |
|-------------|-------|-------|--------|--------|-------|-------|-------|------|
| France | 439 | 67997 | 109570 | 110003 | 92798 | 68105 | 35865 | 4125 |
| Normandie | 113 | 993 | 4151 | 6970 | 10064 | 7258 | 5140 | 529 |
| % Normandie | 26 | 1 | 4 | 6 | 11 | 11 | 14 | 13 |

Tableau 1 : Bilan quantitatif mensuel (2024-2025)





Figure 1 : Evolution des effectifs de bernache cravant recensés en janvier en Normandie (2007-2025)

Bernache cravant à ventre pâle

Le pic d'abondance est intervenu en mars (plus probablement fin février) avec 1 447 oiseaux (**Tableau 2**), contre 1 506 en janvier 2024. Lors de l'enquête Wetlands international, la côte ouest de la Manche accueillait 98 % des effectifs hivernant en France, et 3,8 % de la population du haut arctique de l'Est canadien en mars, dont l'essentiel hiverne en Irlande. En dehors de la côte ouest du département de la Manche, six sites seulement ont accueilli de 1 à 21 individus, au moins temporairement, pour un effectif cumulé de 27 oiseaux (**Carte 2**).

| Bernache à ventre pâle | Oct | Nov | Déc | Janv | Févr | Mars | Avr |
|------------------------|-----|-----|-----|------|------|------|-----|
| France | 48 | 591 | 895 | 915 | 1032 | 1447 | 424 |
| Normandie | 35 | 579 | 871 | 895 | 1024 | 1443 | 424 |
| % Normandie | 73 | 98 | 97 | 98 | 99 | 100 | 100 |

Tableau 2 : Bilan quantitatif mensuel (2024-2025)



Carte 2 : Répartition de la bernache à ventre pâle en France (2024-2025)

Les effectifs comptés cet hiver en Normandie sont de 20 % supérieurs à la moyenne observée ces dix-neuf dernières années (1 203), période au cours de laquelle cette population présente des effectifs en augmentation modérée, $0,8 \% \pm 0,1 \%$ par an (**Figure 2**), comme la population biogéographique.

Le succès de reproduction en 2024 est de 3,2 %, contre 10 % en moyenne au cours de la dernière décennie. Il est donc un peu supérieur à celui de l'espèce nominale mais il présente des variations interannuelles beaucoup plus importantes.




Figure 2 : Evolution des effectifs de bernache à ventre pâle recensés en février en Normandie (2007-2025)

Autres bernaches


Le littoral métropolitain a accueilli 1 584 bernaches nonnettes lors du pic d'abondance en novembre, contre 1 271 en 2024. En dehors de la RN de Beauguillot, un seul individu a été observé en France lors de ce dernier hiver, à l'Île de Ré. L'hivernage a été particulièrement bref puisqu'il ne restait que 246 oiseaux en décembre et 18 en janvier (**Tableau 3**). Rappelons qu'avant les hivers rigoureux de 2010 et 2011, la France accueillait ordinairement quelques individus seulement, dont une partie d'origine férale. Par ailleurs, ces oiseaux n'étant pas bagués, nous ignorons toujours à quelle population ils appartiennent.

Les côtes françaises n'auraient accueilli que 2 bernaches du Pacifique cet hiver, en baie du Mont-Saint-Michel et dans le havre de la Sienne. Cet effectif est nettement en deçà de l'intervalle de valeurs observé ces vingt dernières années, de 10 à 20, période au cours de laquelle elle est devenue plus régulière après une première mention datant de 1981.

Enfin, une bernache à cou roux a séjourné en baie du Mont-Saint-Michel de novembre à février.

Avocette à nuque noire

Le nombre d'hivernants recensés en France lors du pic d'abondance en janvier 2025 est de 22 887 oiseaux, contre 20 639 en 2024. Le littoral Atlantique accueillait 81 % des effectifs à cette date, dont 32 % en baie d'Aiguillon, le littoral méditerranéen 18 %, (**Carte 5**). La tendance numérique, calculée à partir des comptages WI de janvier, présente une augmentation modérée depuis 1980 (+1 %) pour se stabiliser depuis 2010 (+0,2%). Par ailleurs, le littoral Manche-Atlantique a retenu 20 % de la population « Atlantique » estimée à 94000 ind, et le littoral méditerranéen a accueilli 10 % de la population « méditerranéenne » qui elle est estimée à 39000 ind.



Carte 5 : Répartition de l'avocette élégante en France (2023-2024)

La Normandie a joué un rôle particulièrement modeste lors de cette dernière édition avec 130 oiseaux seulement lors du pic intervenu en janvier 2024, soit 0,6 % des hivernants. Les stationnements en période de migration sont un peu plus importants, 2,5 % des oiseaux recensés en France au mois de mars 2025, quand ceux du mois d'avril correspondent en partie à l'arrivée des nicheurs (**Tableau 5**). Par ailleurs, les effectifs observés en janvier sur la période 2007-2025 (298 ind en moyenne) sont jugés en déclin modéré, -1,6 % ± 0,3 % par an (**Figure 3**).

| Avocette à nuque noire | Juil | Août | Sept | Oct | Nov | Déc | Janv | Févr | Mars | Avr |
|------------------------|------|------|-------|-------|------|------|------|------|------|------|
| France | 3260 | 9039 | 12139 | 20789 | 1875 | 1506 | 2288 | 2076 | 1043 | 6306 |
| Normandie | 69 | 184 | 87 | 74 | 278 | 76 | 130 | 114 | 262 | 333 |
| % Normandie | 2,1 | 2,0 | 0,7 | 0,4 | 1,5 | 0,5 | 0,6 | 0,5 | 2,5 | 5,3 |

Tableau 3 : Bilan quantitatif mensuel (2024-2025)




Figure 3 : Evolution des effectifs d'avocette élégante recensés en janvier en Normandie (2007-2025)

Remerciements : Corentin Rivière en baie du Mont-Saint-Michel, Fabrice Gallien et les adhérents ayant participé aux stages de Chausey, Hugo Leclerc pour le havre de Portbail, Éric Gruet pour la rade de Cherbourg, Alain Barrier, Jocelyn Desmares, Daphné Lapie et Régis Purenne sur la côte Est du Cotentin, Thierry Galloo et les partenaires de la RN de Beauguillot en baie des Veys, Jean-Pierre Marie et les membres du réseau intervenant en baie d'Orne, Franck Morel et la RN de la baie de Seine, et plus ponctuellement, Claire & Gérard Debout sur la partie nord de la côte des havres lors de l'enquête Wetlands international en janvier 2025.

Bruno Chevalier