


Bernaches et avocettes hivernant en Normandie : 2025-2026 (50^{ème} et 33^{ème} édition)

Bernache cravant à ventre sombre

L'hivernage en France a culminé en novembre 2025 avec 114 640 oiseaux recensés, contre 110 003 en décembre 2024. A cette date, la France accueillait 46 % de la population biogéographique (250 000 ind.), mais les valeurs observées étaient en recul de 9 % par rapport à la moyenne des dix dernières années.

Les principaux sites, situés entre le Bassin d'Arcachon et le Golfe du Morbihan, ont accueilli 83 % de la population présente lors du pic d'hivernage (**Carte 1**). Des déplacements vers le nord sont observés dès le mois de décembre, 70 % des oiseaux hivernant dans le bassin d'Arcachon avaient quitté ce site à cette date.



Carte 1 : Répartition de la bernache cravant en France (2025-2026)

Les bernaches à ventre sombre hivernant dans les baies et estuaires du littoral métropolitain s'alimentent majoritairement sur les herbiers de zostère (façade atlantique), mais également, selon les localités et/ou l'état des herbiers, sur les champs d'algues vertes et les prés-salés. Par ailleurs, la fréquentation du milieu terrestre adjacent au littoral (prairies naturelles ou artificielles, céréales d'hiver) retient des effectifs extrêmement réduits.

Le succès de reproduction en 2025 est de 4 % (**Figure 1**), contre 7 % en moyenne au cours de la dernière décennie, ce qui est insuffisant pour maintenir cette population qui a décliné de 34 % en 30 ans (Bilan 2020-2021, S. Dalloyau).

La Normandie accueillait 4 % de la population hivernant en France lors du pic d'abondance, mais comme les années précédentes, elle a joué un rôle plus significatif dès le mois de janvier (11 %), retenant jusque 14 % des hivernants en mars, le temps d'une halte ou

d'un séjour prolongé (**Tableau 1**). Les effectifs observés en janvier dernier sont dans la moyenne des vingt dernières années (9 014), et nous enregistrons une croissance de 4 % par an au cours de cette même période.

Bernache cravant	Sept.	Oct	Nov	Déc	Janv	Févr	Mars	Avr
France	757	75731	114640	94423	97134	52468	14075	1904
Normandie	256	2049	4973	5774	9040	9389	2265	208
% Normandie	34	3	4	6	9	18	16	11

Tableau 1 : Nombre de bernache cravant par mois (2025-2026)




Figure 1 : Evolution des effectifs normands de bernache cravant en janvier (2007-2026)


Bernache cravant à ventre pâle

Le pic d'abondance est intervenu en février avec 981 oiseaux (**Tableau 2**), contre 1 447 en février 2025. Lors de l'enquête Wetlands international, la côte ouest de la Manche accueillait 98 % des effectifs hivernant en France, et 2,6 % de la population du haut arctique de l'Est canadien en février, dont l'essentiel hiverne en Irlande. En dehors de la côte ouest du département de la Manche, huit sites seulement ont accueilli de 1 à 18 individus, au moins temporairement, pour un effectif cumulé de 35 oiseaux (**Carte 2**).

Bernache à ventre pâle	Sept	Oct	Nov	Déc	Janv	Févr	Mars	Avr
France	5	19	455	609	725	997	936	274
Normandie	5	7	442	586	715	981	925	274
% Normandie	100	37	97	96	99	98	99	100

Tableau 2 : Nombre de bernache à ventre pâle par mois (2025-2026)

Les effectifs comptés cet hiver en Normandie sont de 18 % inférieurs à la moyenne observée ces vingt dernières années (1 192), période au cours de laquelle cette population présente des effectifs en augmentation très modérée, 0,4 % ± 0,1 % par an (Figure 2), comme la population biogéographique.



Carte 2 : Répartition des effectifs de bernache à ventre pâle en France (2025-2026)

Le succès de reproduction en 2025 est de 0,5 %, contre 10 % en moyenne au cours de la dernière décennie. Il est donc un peu supérieur à celui de l'espèce nominale, mais il présente des variations interannuelles beaucoup plus importantes.




Figure 2 : Evolution des effectifs normands de bernache à ventre pâle en février (2007-2026)


Autres bernaches

Le littoral métropolitain a accueilli 766 bernaches nonnettes lors du pic d'abondance en novembre, contre 1 584 en 2025. En dehors de la RN de Beauguillot, deux oiseaux ont été observés en France lors de ce dernier hiver, en baie du Mont-Saint-Michel et en baie de Goulven (*Carte 3*). L'hivernage a été particulièrement bref puisqu'il ne restait que 46 oiseaux en décembre, et 57 en janvier (*Tableau 3*). Rappelons qu'avant les hivers rigoureux de 2010 et 2011, la France accueillait ordinairement quelques individus seulement, dont une partie d'origine férale. Par ailleurs, ces oiseaux n'étant pas bagués, nous ignorons toujours à quelle population ils appartiennent.

Les côtes françaises n'auraient accueilli que 2 bernaches du Pacifique cet hiver, en baie de Morlaix et sur la RN de Moëze-Oléron. Cet effectif est pour la seconde année consécutive, nettement en deçà de l'intervalle de valeurs observé ces vingt dernières années, de 10 à 20, période au cours de laquelle elle est devenue plus régulière après une première mention datant de 1981.

Hiver 2025-2026		Sept	Oct	Nov	Déc	Janv	Févr	Mars	Avr
Bernache cravant du Pacifique	France	0	0	2	1	1	0	0	0
Bernache nonnette	France	0	755	766	46	57	17	1	4
	Normandie	0	754	765	46	56	16	1	4


Tableau 3 : Nombre de bernache du Pacifique et de bernache nonnette par mois (2025-2026)



Carte 3 : Répartition des effectifs de bernache du Pacifique et de nonnette en France (2025-2026)

Avocette à nuque noire

Le nombre d'hivernants recensés en France lors du pic d'abondance en janvier 2026 est de 21 660 oiseaux, contre 22 887 en 2025. Le littoral Atlantique accueillait 93 % des effectifs à cette date, dont 34 % en baie d'Aiguillon, le littoral méditerranéen 6 %, les côtes de la mer de la Manche 1 % (**Carte 5**). La tendance numérique calculée à partir des comptages WI de janvier, présente une augmentation modérée depuis 1980 (+1 %) pour se stabiliser depuis 2010 (+0,2%). Par ailleurs, le littoral Manche-Atlantique a retenu 22 % de la population « Atlantique » estimée à 94000 ind, et le littoral méditerranéen a accueilli 3,5 % de la population « méditerranéenne » qui elle est estimée à 39000 ind.



Carte 5 : Répartition des effectifs d'avocette à nuque noire en France (2025-2026)

Avec 234 oiseaux recensés en janvier, la Normandie a accueilli 1,1 % des effectifs à cette date. Les stationnements en période de migration sont un peu plus importants, 2,2 % des oiseaux recensés en France au mois de mars 2026, quand ceux du mois d'avril correspondent en partie à l'arrivée des nicheurs (**Tableau 5**). Par ailleurs, les effectifs observés en janvier sur la période 2007-2026 (295 en moyenne) sont jugés en déclin modéré, -1,7 % par an (**Figure 3**).

Avocette à nuque noire	Juil	Août	Sept	Oct	Nov	Déc	Janv	Févr	Mars	Avr
France	3079	11796	11523	10533	17637	14838	21660	15131	9305	3936
Normandie	29	73	143	26	256	25	234	72	205	205
% Normandie	0,9	0,6	1,2	0,2	1,5	0,2	1,1	0,5	2,2	5,2

Tableau 4 : Nombre d'avocette à nuque noire par mois (2025-2026)




Figure 3 : Evolution des effectifs normands d'avocette à nuque noire en janvier (2007-2026)

Remerciements : Corentin Rivière et Quentin Benet-Cibois en baie du Mont-Saint-Michel, Fabrice Gallien et les adhérents ayant participé aux stages de Chausey, Hugo Leclerc pour le havre de Portbail, Alain Barrier, Rémi Chassereau, Jocelyn Desmares, Laurent Legrand et Régis Purenne sur la côte Est du Cotentin, Thierry Galloo et les partenaires de la RN de Beauguillot en baie des Veys, Jean-Pierre Marie et les membres du réseau intervenant en baie d'Orne, Franck Morel et la RN de la baie de Seine, et plus ponctuellement, Claire & Gérard Debout sur la partie nord de la côte des havres lors de l'enquête Wetlands international en janvier 2026.

Bruno Chevalier