



# Résultats de l'enquête Tendances 1995 – 2015 : espèces constantes

Claire Debout, Groupe ornithologique normand

L'enquête Tendances débutée en 1995 a fait l'objet d'une synthèse parue dans la revue ALAUDA (Vol 86(3), 2018, pages 161-177) ; cette synthèse couvre 20 ans, jusqu'à 2015.

Ici est présentée une analyse des résultats par espèce en lien direct avec l'article de la revue LE CORMORAN : BILAN DE 20 ANNÉES DE L'ENQUÊTE « TENDANCES » EN NORMANDIE. ÉVOLUTION DES POPULATIONS D'OISEAUX COMMUNS (2020) 22(90) 99-114.

Vous trouverez, dans les pages qui suivent, les résultats sous forme graphique pour les **17 espèces constantes** de Normandie, c'est-à-dire contactées dans au moins 50 % des trajets ( $F \geq 50\%$ ), et à au moins une des six sessions.

Pour chacune d'elles, 6 graphes sont présentés, un par session pour les espèces présentes toute l'année et, pour les autres, des graphes correspondant à la période de présence.

La mention « non présent(e) » signifie que l'espèce est non échantillonnée avec l'enquête Tendances en raison de sa réelle absence ou de son extrême rareté.

Pour chaque espèce et chaque session, le pourcentage des variations est indiqué : il est calculé à partir de la droite de régression et non à partir des dates extrêmes de comptage ; ainsi toutes les années comptent dans ce calcul et pas seulement les années 1995 et 2015.

La significativité statistique n'est pas indiquée ici mais est présentée dans l'article du Cormoran.

# Pigeon ramier *Columba palumbus* : Résultats de l'enquête Tendances 1995 – 2015



Normandie / Groupe ornithologique normand



## Période postnuptiale

Variations des indices :


+ 2 % ; + 47 %



## Hivernage

Variation de l'indice :




+ 52 %



## Période nuptiale

Variations des indices :

+ 21 % ; + 3 % ; + 14 %



# Tourterelle turque *Streptopelia decaocto* : Résultats de l'enquête Tendances 1995 – 2015

Normandie / Groupe ornithologique normand



## Période postnuptiale

Variations des indices :

+ 41 % ; - 16 %

## Hivernage







Variation de l'indice :

- 6 %

## Période nuptiale

Variations des indices :

+ 11 % ; + 29 % ; + 11 %






# Hirondelle de cheminée *Hirundo rustica* : Résultats de l'enquête Tendances 1995 – 2015



Normandie / Groupe ornithologique normand

Période postnuptiale  
Variation de l'indice :  
+ 15 % ; non présente



Hivernage  
non présente

Période nuptiale  
Variations des indices :  
non présente ; + 23 % ; + 21 %



# Troglodyte mignon *Troglodytes troglodytes* : Résultats de l'enquête Tendances 1995 – 2015



Normandie / Groupe ornithologique normand



## Période postnuptiale

Variations des indices :


+ 3 % ; + 16 %



## Hivernage

Variation de l'indice :




+ 9 %



## Période nuptiale

Variations des indices :

+ 19 % ; + 20 % ; - 1 %







# Accenteur mouchet *Prunelle modularis* : Résultats de l'enquête Tendances 1995 – 2015

Normandie / Groupe ornithologique normand

## Période postnuptiale

Variations des indices :


- 21 % ; + 18 %



## Hivernage

Variation de l'indice :




- 49 %



## Période nuptiale

Variations des indices :

+ 4 % ; + 10 % ; + 2 %







# Rouge-gorge *Erithacus rubecula* : Résultats de l'enquête Tendances 1995 – 2015

Normandie / Groupe ornithologique normand

## Période postnuptiale

Variations des indices :


- 18 % ; + 7 %



## Hivernage

Variation de l'indice :




+ 1 %



## Période nuptiale

Variations des indices :

+ 12 % ; + 6 % ; + 1 %







# Merle noir *Turdus merula* : Résultats de l'enquête Tendances 1995 – 2015

## Normandie / Groupe ornithologique normand

### Période postnuptiale

Variations des indices :


- 25 % ; + 13 %



### Hivernage

Variation de l'indice :




+ 27 %



### Période nuptiale

Variations des indices :

+ 15 % ; - 8 % ; - 6 %



# Grive musicienne *Turdus philomelos* : Résultats de l'enquête Tendances 1995 – 2015



Normandie / Groupe ornithologique normand



## Période postnuptiale

Variations des indices :


- 29 % ; + 33 %



## Hivernage

Variation de l'indice :




- 17 %



## Période nuptiale

Variations des indices :

- 17 % ; + 19 % ; + 7 %



# Fauvette à tête noire *Sylvia atricapilla* : Résultats de l'enquête Tendances 1995 – 2015



Normandie / Groupe ornithologique normand



## Période postnuptiale

Variations des indices :


- 4 % ; + 5 %



## Hivernage

Variation de l'indice :




+ 92 %



## Période nuptiale

Variations des indices :

+ 6 % ; + 41 % ; + 30 %



# Pouillot véloce *Phylloscopus collybita* : Résultats de l'enquête Tendances 1995 – 2015



Normandie / Groupe ornithologique normand



## Période postnuptiale

Variations des indices :


- 32 % ; + 2 %



## Hivernage

Variation de l'indice :




- 7 %



## Période nuptiale

Variations des indices :

+ 91 % ; + 11 % ; - 10 %







# Mésange bleue *Cyanistes caeruleus* : Résultats de l'enquête Tendances 1995 – 2015

Normandie / Groupe ornithologique normand

## Période postnuptiale

Variations des indices :


0 % ; + 2 %



## Hivernage

Variation de l'indice :




+ 16 %



## Période nuptiale

Variations des indices :

+ 4 % ; + 11 % ; - 18 %








# Mésange charbonnière *Parus major* : Résultats de l'enquête Tendances 1995 – 2015

Normandie / Groupe ornithologique normand




**Période postnuptiale**  
Variations des indices :  
+ 15 % ; + 44 %



**Hivernage**  
Variation de l'indice :  
+ 17 %



**Période nuptiale**  
Variations des indices :  
+ 12 % ; + 13 % ; + 11 %







# Pinson des arbres *Fringilla coelebs* : Résultats de l'enquête Tendances 1995 – 2015

Normandie / Groupe ornithologique normand

## Période postnuptiale

Variations des indices :


+ 20 % ; - 2 %



## Hivernage

Variation de l'indice :




- 10 %



## Période nuptiale

Variations des indices :

+ 21 % ; + 8 % ; + 10 %



# Moineau domestique *Passer domesticus* : Résultats de l'enquête Tendances 1995 – 2015



Normandie / Groupe ornithologique normand



## Période postnuptiale

Variations des indices :


- 40 % ; + 7 %



## Hivernage

Variation de l'indice :




+ 27 %



## Période nuptiale

Variations des indices :

+ 12 % ; - 23 % ; - 5 %



# Etourneau sansonnet *Sturnus vulgaris* : Résultats de l'enquête Tendances 1995 – 2015



Normandie / Groupe ornithologique normand



## Période postnuptiale

Variations des indices :


- 17 % ; + 14 %



## Hivernage

Variation de l'indice :




- 21 %



## Période nuptiale

Variations des indices :

+ 18 % ; - 25 % ; - 18 %







# Geai des chênes *Garrulus glandarius* : Résultats de l'enquête Tendances 1995 – 2015

Normandie / Groupe ornithologique normand

## Période postnuptiale

Variations des indices :


+ 76 % ; + 38 %



## Hivernage

Variation de l'indice :



+ 37 %



## Période nuptiale

Variations des indices :

+ 33 % ; - 9 % ; - 6 %



# Corneille noire *Corvus corone* : Résultats de l'enquête Tendances 1995 – 2015



Normandie / Groupe ornithologique normand



## Période postnuptiale

Variations des indices :


+ 12 % ; - 10 %



## Hivernage

Variation de l'indice :

+ 48 %



## Période nuptiale

Variations des indices :

+ 28 % ; + 12 % ; - 8 %

